



FARMA - CHEM SA

Τ.Θ. 1026 ΒΙ.ΠΕ.Θ. - Τ.Κ. 570 22 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 - 569 630 έως 33 FAX: 2310 - 797 047
http://www.farmachem.gr, e-mail: info@farmachem.gr

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΠΡΟΪΟΝ: EXCITE

Σκεύασμα για την ενίσχυση του χρώματος και της περιεκτικότητας των καρπών σε σάκχαρα. Ενισχύει επίσης τη φωτεινότητα των ανθέων.

Σύνθεση	% w/w	% w/v
Μονο-δι-τρι-πολυσακχαρίτες, ουρονικά οξέα	18	25
Κάλιο (K ₂ O) (πλήρως υδατοδιαλυτό)	4,5	6
Ασβέστιο (CaO)	8	11
Μαγνήσιο (MgO)	0,7	1
Ψευδάργυρος (Zn) (EDTA μορφή)	0,007	0,01
Βόριο (B)	0,007	0,01
Μολυβδένιο	0,001	0,0013

pH 6, Αγωγιμότητα 3,3 mS/cm

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Το EXCITE:

- Επιταχύνει και προωθεί την ωρίμανση των καρπών
- Προωθεί την ομοιόμορφη αλλαγή του χρωματισμού των καρπών.
- Αυξάνει την περιεκτικότητα των καρπών σε σάκχαρα.
- Ενισχύει τη συνεκτικότητα και τη μετασυλλεκτική διάρκεια ζωής των καρπών.
- Βελτιώνει τη λάμψη των κομμένων ανθέων.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Εσπεριδοειδή (Πορτοκάλια, Λεμόνια, Μανταρίνια, Γκρέιπ φρουτ): Συστήνονται 2 εφαρμογές στην αλλαγή του χρώματος των καρπών και 20 ημέρες πριν την ωρίμανση. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. **Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά), Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Κερασιά, Δαμασκηλιά, Βερικοκιά, Νεκταρινιά):** Συστήνονται 2 εφαρμογές από την αλλαγή του χρώματος των καρπών μέχρι 15 ημέρες πριν τη συγκομιδή Δόση: 250-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. **Αμπέλι (Οινοποιήσιμο, Επιτραπέζιο):** Συστήνονται 2-3 εφαρμογές από το γυάλισμα των καρπών και μετά. Δόση: 200-250 κ.εκ./100 λίτρα νερό. **Ελιά (Καλαμών):** Συστήνονται 2 εφαρμογές, στη σκλήρυνση πυρήνα και 20-30 ημέρες πριν τη συγκομιδή.: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. **Ακτινίδια:** Συστήνεται μία εφαρμογή τέλη Αυγούστου. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. **Φράουλα:** Συστήνονται τακτικές εφαρμογές στη σεζόν, κατά την αύξηση του καρπού ανά 10-14 μέρες. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. **Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Αγγούρι, Κολοκύθι:** Συστήνονται εφαρμογές 7-10 ημέρες πριν από κάθε κοπή. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. **Καρπούζι-πεπόνι:** Συστήνονται 2-3 εφαρμογές κατά την αύξηση του καρπού. Δόση: 200-250 κ.εκ./100 λίτρα νερό. **Σακχαρότευτλα:** Συστήνονται 2-3 εφαρμογές από τα 8-10 φύλλα και μετά. Δόση: 250-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. **Ανθοκομικά:** Συστήνονται εφαρμογές στο

EXCITE

άνοιγμα των λουλουδιών και ανά 10-14 ημέρες. Δόση: 200-250 κ.εκ./100 λίτρα νερό.
Υδρολίπανση: 2-3 λίτρα/στρ.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Επικοινωνήστε με τους κατά τόπους γεωπόνους.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Εφαρμόζεται νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα και συνιστάται ψεκασμός μέχρι απορροής. Οι προτεινόμενες δόσεις είναι καθαρά ενδεικτικές και μεταβάλλονται ανάλογα με τη θερμοκρασία, την ηλιοφάνεια καθώς και από το εδαφικό pH, την επάρκεια νερού κ.τ.λ. Να αποφεύγεται η χρήση σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Προτείνεται πριν την εφαρμογή σε μια καλλιέργεια ή περιοχή για πρώτη φορά ή σε συνδυασμό με άλλα σκευάσματα, να δοκιμάζεται αρχικά σε μια μικρή περιοχή. Μην υπερβαίνεται τις συνιστώμενες δοσολογίες. Συστήνεται η εφαρμογή του μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της ετικέτας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση είναι ευθύνη του αγοραστή.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Διατηρείστε το σε μέρος ξηρό και δροσερό.

Προφυλάξτε το προϊόν από πιθανές χαμηλές θερμοκρασίες (παγετό).