



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 11-09-2025  
Αριθ. πρωτ.: 246504**

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
Τηλέφωνο: 210 928 7241, 7169,  
7170  
email: [biocides@minagric.gr](mailto:biocides@minagric.gr)

**ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση άδειας διάθεσης στην αγορά του βιοκτόνου σκευάσματος (ΤΠ18, εντομοκτόνο) SOMI ως προς τον παρασκευαστή του σκευάσματος, τον παρασκευαστή της δραστικής ουσίας, το εργοστάσιο παρασκευής της δραστικής ουσίας, τους οργανισμούς στόχους, τις εγκεκριμένες χρήσεις καθώς και τις οδηγίες χρήσης του σκευάσματος».**

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και συγκεκριμένα τα άρθρα 50 και 52.
2. Το άρθ. 2 του ν. 721/1977 (Α' 298) «Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».
3. Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 354/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Απριλίου 2013 σχετικά με αλλαγές βιοκτόνων για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και συγκεκριμένα τα άρθρα 4 (2), 7 και 8.
4. Τη με αριθ. 4616/52519/16-05-2016 (Β' 1367) κ.υ.α. με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
5. Τη με αριθ. πρωτ. **7508/180159 ΠΕ /28-01-2020** απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία χορηγήθηκε άδεια διάθεσης για το βιοκτόνο (εντομοκτόνο) **SOMI**, όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α'133) με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.
7. Το άρθ. 87 του ν. 3528/ 2007 (Α'26) με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ», όπως ισχύει.

8. Τη με αριθ. 108414/28-04-2025 υ.α. “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β’2339).
9. Το με αρ. πρωτ. 53913/26-02-2025 σημείωμα του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.
10. Την αριθ. **BC-ΤΤ091109-03** αίτηση στο μητρώο των βιοκτόνων (R4BP3) καθώς και τις με αρ. πρωτ. 143870/30-05-2025 και 184128/09-07-2025 συμπληρωματικές αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

### Αποφασίζουμε

- I. Τροποποιούμε την άδεια διάθεσης στην αγορά με αριθμό **ΤΠ18-0386 (R4BP3: ASSET No: GR-0022120-0000)** που χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. **7508/180159 ΠΕ /28-01-2020** απόφασή μας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για το βιοκτόνο (εντομοκτόνο) **SOMI** ως προς τον **παρασκευαστή του σκευάσματος (διεύθυνση), τον παρασκευαστή της δραστικής ουσίας, το εργοστάσιο παρασκευής της δραστικής ουσίας (διεύθυνση), τους οργανισμούς στόχους (Χρήση 1, Χρήση 2), τις εγκεκριμένες χρήσεις (προστίθενται οι Χρήσεις 5 και 6) καθώς και τις οδηγίες χρήσης του σκευάσματος**. Ειδικότερα τα σημεία **5 και 7** της άδειας και τα σημεία **1.3, 1.4, 4.1, 4.1.1., 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.5, 4.6, 5 και 6** της Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος ως παρακάτω:

Σημεία της άδειας που τροποποιούνται:

**5. Παρασκευαστής της δ.ο.: Sharda Europe B.V.B.A (Acting for Sharda Cropchem Limited (India))**

**7. Παρασκευαστής του σκευάσματος:** Sharda Europe B.V.B.A., **Heedstraat 58**, 1730 Asse, Βέλγιο.

Σημεία της Περίληψης Χαρακτηριστικών Προϊόντος που τροποποιούνται:

#### 1. Διοικητικές πληροφορίες

##### 1.3 Παρασκευαστής του προϊόντος

Όνομα παρασκευαστή	Sharda Europe B.V.B.A.
Διεύθυνση παρασκευαστή	<b>Heedstraat 58</b> , 1730 Asse, Βέλγιο

##### 1.4 Παρασκευαστής (ές) της (των) δραστικής (ών) ουσίας (ιών)

Δραστική ουσία	Deltamethrin (δελταμεθρίνη)
Όνομα παρασκευαστή	<b>Sharda Europe B.V.B.A (Acting for Sharda Cropchem Limited (India)) Heedstraat 58, 1730 Asse, Βέλγιο</b>
Διεύθυνση παρασκευαστή	<b>Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West), 400056 Mumbai, Ινδία.</b>
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Heranba Industries Ltd. <b>Plot No 1503/1504/1505/1506/1, GIDC, Phase III, Vapi, District - Valsad , Gujarat - 396 195, Ινδία</b>

**4. Εγκεκριμένες χρήσεις****Πίνακας 1. Χρήση # 1 – Χρήση από το ευρύ κοινό**

Τύπος προϊόντος	PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	<p>Εντομοκτόνο σε μορφή σκόνης επίπασης εναντίον βαδιστικών εντόμων (συμπεριλαμβανομένων των κατσαρίδων, μυρμηγκιών, κοριών) και αραχνών με εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους σε ρωγμές και εσοχές.</p> <p><b>Για χρήση σε εσωτερικούς χώρους με τοπική εφαρμογή κατά των σφηκών σε μέρη όπου τα έντομα κάθονται ή ξεκουράζονται. Μην εφαρμόζετε σε περιοχές που υπόκεινται τακτικά σε διαδικασίες υγρού καθαρισμού.</b></p> <p>Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικούς χώρους πάνω ή γύρω από μυρμηγκοφωλιές και σφηκοφωλιές.</p>
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	<p>Αράχνες</p> <p>Κατσαρίδες (ακμαία)</p> <p>Μυρμήγκια (ακμαία)</p> <p>Κοριοί (ακμαία <i>Cimex lectularius</i>)</p> <p><b>Σφήκες (<i>Vespula vulgaris</i>) (ακμαία)</b></p>
Πεδίο χρήσης	<p>Εσωτερικοί χώροι</p> <p>Εξωτερικοί χώροι (μόνο σε φωλιές μυρμηγκιών και σφηκών)</p>
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	<p>Απευθείας εφαρμογή με επίπαση μέσω:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Φιαλιδίου τύπου αλατιέρας,</li> <li>• Φιαλιδίου με λεπτό στόμιο,</li> <li>• Φυσητήρα σκόνης</li> <li>• Πιστολιού σκόνης με μακρύ ακροφύσιο</li> </ul> <p>Εφαρμογή σε ρωγμές και εσοχές (εσωτερικοί χώροι) για την καταπολέμηση των <b>βαδιστικών εντόμων</b>:</p> <p>Απευθείας εφαρμογή με επίπαση. Το προϊόν εφαρμόζεται σε λεπτές λωρίδες σε ρωγμές και εσοχές (κάτω από έπιπλα, σε γωνίες και άλλες κρυψώνες).</p> <p>Εφαρμογή σε φωλιές μυρμηγκιών (εξωτερικοί χώροι): Το προϊόν εφαρμόζεται σε λεπτές λωρίδες γύρω και πάνω στις εισόδους της φωλιάς ή απευθείας μέσα στη φωλιά από όλες τις εισόδους.</p> <p><b>Τοπική εφαρμογή (σε εσωτερικούς χώρους) κατά των σφηκών:</b></p> <p>Απευθείας εφαρμογή με επίπαση τοπικά. Εφαρμόστε σε λεπτές λωρίδες στις οριζόντιες επιφάνειες (ράφια, δοκάρια, περβάζια παραθύρων, αγωγοί εξαερισμού, εναέριες εγκαταστάσεις κάτω από τις οροφές και δομικά στοιχεία π.χ.: δοκοί).</p> <p>Εφαρμογή σε σφηκοφωλιές (εξωτερικοί χώροι): Σε περίπτωση ορατών φωλιών, εφαρμόστε το προϊόν στη φωλιά και σε περίπτωση κρυμμένων φωλιών στην είσοδο της φωλιάς.</p>

Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	<p><u>Δοσολογία:</u> Εφαρμογή σε ρωγμές και εσοχές για την <b>καταπολέμηση βαδιστικών εντόμων</b> : 20 γρ. ανά τ.μ.</p> <p>Εφαρμογή σε μυρμηγκοφωλιές: 2 γρ ανά φωλιά.</p> <p><b>Τοπική εφαρμογή κατά των σφηκών: 20 γρ. ανά τ.μ.</b></p> <p><b>Εφαρμογή σε σφηκοφωλιές: 2 γρ ανά φωλιά.</b></p> <p>Για φιαλίδια που φέρουν δοσομετρικό πώμα: Το δοσομετρικό πώμα φέρει 3 είδη οπών (μεγάλες, μεσαίες, μικρές). Από το δοσομετρικό πώμα απελευθερώνεται ποσότητα προϊόντος σύμφωνα με το παρακάτω:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 μεγάλη έξοδος απελευθερώνει 1 γρ. προϊόντος κάθε 2 δευτερόλεπτα</li> <li>• 1 μεσαία έξοδος απελευθερώνει 1 γρ. προϊόντος κάθε 6 δευτερόλεπτα</li> <li>• 7 μικρές έξοδοι απελευθερώνουν 0.5 γρ. προϊόντος με κάθε κίνηση</li> </ul> <p><u>Συχνότητα εφαρμογής:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Εσοχές και ρωγμές για την <b>καταπολέμηση βαδιστικών εντόμων</b>: Μέχρι 2 εφαρμογές ανά έτος με ελάχιστο διάστημα 6 εβδομάδων μεταξύ εφαρμογών. <b>Το προϊόν δεν έχει υπολειμματική δράση κατά των βαδιστικών εντόμων.</b></li> <li>• Φωλιές μυρμηγκιών: Μέγιστο 1 εφαρμογή ανά φωλιά, μέχρι 5 φωλιές γύρω από το σπίτι.</li> <li>• <b>Σφήκες. Η εφαρμογή μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και 2 φορές το χρόνο με ελάχιστο διάστημα 8 εβδομάδων μεταξύ των εφαρμογών. Το προϊόν δεν έχει υπολειμματική δράση κατά των σφηκών.</b></li> <li>• <b>Σφηκοφωλιές. Μέγιστο 1 εφαρμογή ανά φωλιά.</b></li> </ul>
Κατηγορία/-ες χρηστών	Ευρύ κοινό
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	<p>Φιάλη που φέρει διάτρητο πώμα (Φιάλη από HDPE ή PP με διάτρητο πώμα από HDPE) : <b>5 – 1000 γρ.</b></p> <p>Σακούλες από σύνθετο υλικό (LDPE/aluminium εσωτερικό με Polyester ή PP εξωτερικό), θερμοκολλημένες και εντός κάδου: <b>5 – 1000 γρ.</b></p>

#### 4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

##### Εφαρμογή σε ρωγμές και σχισμές για την καταπολέμηση των βαδιστικών εντόμων:

- Εφαρμόστε 20 γρ προϊόντος σε λεπτές στρώσεις σε ρωγμές και σχισμές όπου κρύβονται έντομα (κάτω από έπιπλα, γωνίες κ.λπ.).

- Η εφαρμογή μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και 2 φορές το χρόνο με ελάχιστο διάστημα 6 εβδομάδων μεταξύ των εφαρμογών.

Για εφαρμογή σε φωλιές μυρμηγκιών:

- Εφαρμόστε σε λεπτές στρώσεις στην περιοχή γύρω από τις εισόδους της φωλιάς ή/και στις εισόδους της φωλιάς με μέγιστη δόση 2 γραμμαρίων προϊόντος ανά φωλιά.
- Η εφαρμογή μπορεί να πραγματοποιηθεί μία φορά ανά φωλιά, έως και για 5 φωλιές γύρω από ένα σπίτι.

Για τοπική εφαρμογή κατά των σφηκών:

- Προσδιορίστε πού συνήθως εγκαθίστανται τα έντομα και απλώστε το προϊόν μόνο ως τοπική εφαρμογή σε σημεία που δεν καθαρίζονται τακτικά σε υγρό καθαρισμό (οριζόντιες επιφάνειες, π.χ. ράφια, δοκάρια, περβάζια παραθύρων, αγωγό εξαερισμού, εναέριες εγκαταστάσεις κάτω από τις οροφές και δομικά στοιχεία, π.χ.: δοκοί). Εφαρμόστε τοπικά 20 γρ προϊόντος/τ.μ. σε λεπτές στρώσεις ως τοπική εφαρμογή.
- Η εφαρμογή μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και 2 φορές το χρόνο με ελάχιστο διάστημα 8 εβδομάδων μεταξύ των εφαρμογών.
- Μην εφαρμόζετε σε περιοχές που υπόκεινται τακτικά σε διαδικασίες υγρού καθαρισμού.
- Καλύψτε το δάπεδο κατά την διάρκεια γεμίσματος των εργαλείων εφαρμογής με το προϊόν και απορρίψτε το υλικό στα στερεά απόβλητα, προκειμένου να αποφύγετε τυχόν διαρροές στο δάπεδο.
- Για την εφαρμογή, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ρούχα μιας χρήσης (π.χ. χάρτινες ρόμπες, ποδιές, ολόσωμη φόρμα) ώστε να αποφευχθούν τυχόν τις διαρροές στο αποχετευτικό σύστημα μέσω του πλυσίματος των μολυσμένων ρούχων.
- Όταν απαιτείται καθαρισμός μετά τη χρήση σε εσωτερικούς χώρους, να χρησιμοποιούνται **μέθοδοι στεγνού καθαρισμού** (π.χ. ηλεκτρική σκούπα).

Για την εφαρμογή σε σφηκοφωλιές:

- Εφαρμογή σε φωλιά σφηκών (εξωτερικοί χώροι):
- Σε περίπτωση ορατών φωλιών, εφαρμόστε το προϊόν στη φωλιά και σε περίπτωση κρυφών φωλιών στην είσοδο της φωλιάς με τη μέγιστη δόση 2 g/φωλιά.

Η εφαρμογή μπορεί να πραγματοποιηθεί μία φορά ανά φωλιά, μέχρι το πολύ 5 φωλιές γύρω από ένα σπίτι.

**4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση**

Για να βελτιστοποιήσετε την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής, μην εφαρμόζετε σε περίπτωση βροχής ή ανέμου.

Για να φτάσετε σε φωλιές που βρίσκονται κάτω από βεράντες, εφαρμόστε προσεκτικά το προϊόν σε ρωγμές και σχισμές ή ανάμεσα σε αρμούς πλακιδίων και αποφύγετε τη διαρροή του προϊόντος.

Εφαρμόστε μόνο σε περιοχές που δεν είναι επιρρεπείς σε βύθιση ή υγρασία, δηλαδή προστατευμένες από βροχή, πλημμύρες και νερό καθαρισμού.

Ελέγχετε τις περιοχές που έχει εφαρμοστεί το προϊόν μία φορά την εβδομάδα.

Λάβετε υπόψη τον κύκλο ζωής και τα χαρακτηριστικά των εντόμων-στόχων για να προσαρμόσετε τις επεμβάσεις. Συγκεκριμένα, στοχεύστε το πιο ευάλωτο στάδιο των εχθρών / στόχων, τον χρόνο εφαρμογής και τις περιοχές που θα εφαρμοστεί.

Υιοθετήστε ολοκληρωμένες μεθόδους διαχείρισης εχθρών / στόχων, όπως ο συνδυασμός χημικών, φυσικών μεθόδων ελέγχου και άλλων μέτρων δημόσιας υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες (κλιματικές συνθήκες, είδη-στόχοι, συνθήκες χρήσης κ.λπ.).

Να γίνεται εναλλαγή προϊόντων που περιέχουν δραστικές ουσίες με διαφορετικό τρόπο δράσης, με σκοπό την απομάκρυνση ανθεκτικών ατόμων από τον πληθυσμό.

Ενημερώστε τον υπεύθυνο για τη διανομή του προϊόντος εάν η θεραπεία είναι αναποτελεσματική.

Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να αναφέρει τυχόν παρατηρούμενα περιστατικά ανθεκτικότητας στις Αρμόδιες Αρχές (ΑΑ) ή σε άλλους αρμόδιους φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση της ανθεκτικότητας (αυτό δεν αφορά την ετικέτα του προϊόντος).

Καθορίστε μια βασική γραμμή παρακολούθησης των επιπέδων αποτελεσματικότητας σε πληθυσμούς σε βασικές περιοχές (τουλάχιστον μία έρευνα ανά έτος) προκειμένου να εντοπίσετε τυχόν σημαντικές αλλαγές στην ευαισθησία στη δραστική ουσία. Οι πληροφορίες από τα προγράμματα παρακολούθησης αντοχής επιτρέπουν την έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων και παρέχουν πληροφορίες για τη λήψη σωστών αποφάσεων. Εάν η προσβολή επιμένει παρά την τήρηση των οδηγιών της ετικέτας, επικοινωνήστε με αδειοδοτημένο συνεργείο απεντομώσεων μυοκτονιών.

#### **4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών** Δείτε τις Γενικές Οδηγίες Χρήσης

#### **4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του σκευάσματος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση** Δείτε τις Γενικές Οδηγίες Χρήσης

#### **4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του σκευάσματος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση** Δείτε τις Γενικές Οδηγίες Χρήσης

#### **Πίνακας 2. Χρήση # 2 – Χρήση από επαγγελματίες Χρήστες**

Τύπος προϊόντος	PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Εντομοκτόνο σε μορφή σκόνης επίπασης εναντίον βαδιστικών εντόμων (συμπεριλαμβανομένων των κατσαρίδων, και μυρμηγκιών) και αραχνών με εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους σε ρωγμές και εσοχές κενά και κοιλάτητες. <b>Για χρήση κατά των σφηκών σε μέρη όπου τα έντομα κάθονται ή ξεκουράζονται, με τοπική εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους. Μην εφαρμόζετε σε περιοχές που υπόκεινται τακτικά σε διαδικασίες υγρού καθαρισμού.</b> Επίσης, για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, πάνω και γύρω από

	φωλιές μυρμηγκιών και <b>φωλιές σφηκών</b> .
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Αράχνες Κατσαρίδες (ακμαία) Μυρμήγκια (ακμαία) <b>Σφήκες (<i>Vespuula vulgaris</i>) (ακμαία)</b>
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί χώροι Εξωτερικοί χώροι (μόνο σε φωλιές μυρμηγκιών και σφηκών)
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	<p>Απευθείας εφαρμογή με επίπαση μέσω:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Φιαλιδίου τύπου αλατιέρας,</li> <li>• Φιαλιδίου με λεπτό στόμιο,</li> <li>• Φυσητήρα σκόνης</li> <li>• Πιστολιού σκόνης με μακρύ ακροφύσιο</li> </ul> <p>Εφαρμογή σε ρωγμές και εσοχές (εσωτερικοί χώροι) <b>για την καταπολέμηση βαδιστικών εντόμων:</b> Απευθείας εφαρμογή με επίπαση. Το προϊόν εφαρμόζεται σε λεπτές λωρίδες σε ρωγμές και εσοχές (κάτω από έπιπλα, σε γωνίες και άλλες κρυψώνες).</p> <p>Εφαρμογή σε κενά και κοιλότητες (εσωτερικοί χώροι) <b>για την καταπολέμηση βαδιστικών εντόμων:</b> Απευθείας εφαρμογή με επίπαση. Το προϊόν εφαρμόζεται σε λεπτές λωρίδες σε κενά και κοιλότητες (μεταξύ διαχωριστικών τοιχωμάτων, οπές, κτλ).</p> <p>Εφαρμογή σε φωλιές μυρμηγκιών (εξωτερικοί χώροι): Το προϊόν εφαρμόζεται σε λεπτές λωρίδες γύρω και πάνω στις εισόδους της φωλιάς ή απευθείας μέσα στη φωλιά από όλες τις εισόδους.</p> <p><b>Εντοπισμένη εφαρμογή (σε εσωτερικούς χώρους) κατά των σφηκών:</b> Απευθείας εφαρμογή με επίπαση τοπικά. Εφαρμόστε σε λεπτές λωρίδες στις οριζόντιες επιφάνειες (ράφια, δοκάρια, περβάζια παραθύρων, αγωγοί εξαερισμού, εναέριες εγκαταστάσεις κάτω από τις οροφές και δομικά στοιχεία π.χ.: δοκοί).</p> <p><b>Εφαρμογή σε σφηκοφωλιές (εξωτερικοί χώροι):</b> Σε περίπτωση ορατών φωλιών, εφαρμόστε το προϊόν στη φωλιά και σε περίπτωση κρυφών φωλιών στην είσοδο της φωλιάς.</p>
Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	<p><u>Δοσολογία:</u> Εφαρμογή σε ρωγμές, εσοχές, κενά και κοιλότητες <b>για την καταπολέμηση βαδιστικών εντόμων:</b> 20 γρ. ανά τ.μ.</p> <p>Εφαρμογή σε μυρμηγκοφωλιές: 2 γρ ανά φωλιά.</p> <p><b>Εντοπισμένη εφαρμογή κατά των σφηκών: 20 γρ. ανά τ.μ.</b></p>

	<p><b>Εφαρμογή σε σφηκοφωλιές: 2 γρ ανά φωλιά.</b></p> <p><u>Συχνότητα εφαρμογής:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ρωγμές, εσοχές, κενά και κοιλότητες <b>για την καταπολέμηση βαδιστικών εντόμων:</b> Μέχρι 6 εφαρμογές ανά έτος με ελάχιστο διάστημα 6 εβδομάδων μεταξύ εφαρμογών. <b>Το προϊόν δεν έχει υπολειμματική δράση κατά των βαδιστικών εντόμων.</b></li> <li>• Φωλιές μυρμηγκιών: έως 1 εφαρμογή ανά φωλιά, μέχρι 5 φωλιές γύρω από το σπίτι και μέχρι 7 εφαρμογές γύρω από μεγάλα κτίρια.</li> <li>• <b>Σφήκες. Η εφαρμογή μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και 2 φορές το χρόνο με ελάχιστο διάστημα 8 εβδομάδων μεταξύ των εφαρμογών. Το προϊόν δεν έχει υπολειμματική δράση κατά των σφηκών.</b></li> <li>• <b>Σφηκοφωλιές. Έως 1 εφαρμογή ανά φωλιά</b></li> </ul>
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	<p>Φιάλη που φέρει διάτρητο πώμα (Φιάλη από HDPE ή PP με διάτρητο πώμα από HDPE): 5-1000 γρ.</p> <p>Σακούλες από σύνθετο υλικό (LDPE/aluminium εσωτερικό με Polyester ή PP εξωτερικό), θερμοκολλημένες και εντός κάδου: 1000-7000 γρ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (χύδην) Σακούλα φιλμ από σύνθετο υλικό (LDPE εντός, αλουμίνιο στο κέντρο, πολυεστέρας ή πολυπροπυλένιο (PP) εξωτερικά) κλειστή με θερμοσφράγιση. Εξωτερική συσκευασία: χαρτοκιβώτιο - 25kg</li> <li>- (χύδην) Ελασματοποιημένοι σάκοι (Φύλλο από σύνθετο υλικό από LDPE και πολυπροπυλένιο ή πολυεστέρα ή χαρτί). Εξωτερική συσκευασία: κουτί από χαρτόνι ή κάδοι. - 25 κιλά</li> <li>- Μεγάλοι σάκοι πολυπροπυλενίου, έως 1000 κιλά</li> </ul>

#### 4.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Το προϊόν θα πρέπει να εφαρμόζεται κατάλληλα ώστε τα παιδιά και τα κατοικίδια να μην έρχονται σε επαφή με αυτό.

Απομακρύνετε οποιοδήποτε εργαλείο που μπορεί να έρθει σε επαφή με τρόφιμα/ζωοτροφές κατά την εφαρμογή.

Απομακρύνετε όλα τα τρόφιμα, τις ζωοτροφές και τα ποτά πριν από την επεξεργασία.

Μην (χρησιμοποιείτε/ εφαρμόζετε) απευθείας πάνω ή κοντά σε τρόφιμα, ζωοτροφές ή ποτά, ή σε επιφάνειες ή σκεύη που είναι πιθανό να έρθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά και ζώα/κατοικίδια ζώα.

Μην εφαρμόζετε απευθείας σε επιφάνειες στις οποίες αποθηκεύονται, παρασκευάζονται ή καταναλώνονται τρόφιμα ή ζωοτροφές.

Εφαρμόστε μόνο σε περιοχές που δεν είναι επιρρεπείς σε βύθιση ή υγρασία, δηλαδή προστατευμένες από βροχή, πλημμύρες και νερό καθαρισμού.

Για εφαρμογή σε κενά και κοιλότητες εναντίον των βαδιστικών εντόμων:

- Εφαρμόστε 20 γρ. σκευάσματος σε λεπτές λωρίδες σε κενά/κοιλότητες όπου τα έντομα κρύβονται (για παράδειγμα κενά διαχωριστικών τοιχωμάτων)
- Μέχρι 6 εφαρμογές ανά έτος με ελάχιστο διάστημα 6 εβδομάδων μεταξύ εφαρμογών.

Για εφαρμογή σε ρωγμές και εσοχές εναντίον των βαδιστικών εντόμων:

- Εφαρμόστε 20 γρ. σκευάσματος σε λεπτές λωρίδες σε ρωγμές και εσοχές όπου τα έντομα κρύβονται (κάτω από έπιπλα, γωνίες, κτλ.)
- Μέχρι 6 εφαρμογές ανά έτος με ελάχιστο διάστημα 6 εβδομάδων μεταξύ εφαρμογών.

Για εφαρμογή σε φωλιές μυρμηγκιών:

- Εφαρμόστε σε λεπτές λωρίδες στην περιοχή γύρω από την μυρμηγκοφωλιά και/ή μέσα στις εισόδους της φωλιάς με μέγιστη δόση 2 γρ. σκευάσματος ανά φωλιά.
- Μέγιστο 1 εφαρμογή ανά φωλιά, μέχρι 5 φωλιές γύρω από σπίτι και μέχρι 7 εφαρμογές γύρω από μεγάλα κτίρια.

Για τοπική εφαρμογή κατά των σφηκών:

- Προσδιορίστε πού συνήθως εγκαθίστανται τα έντομα και εφαρμόστε το προϊόν μόνο ως τοπική εφαρμογή σε σημεία που δεν υπόκεινται τακτικά σε διαδικασίες υγρού καθαρισμού (οριζόντιες επιφάνειες π.χ. ράφια, δοκάρια, περβάζια παραθύρων, αγωγοί εξαερισμού, εγκαταστάσεις που αιωρούνται κάτω από την οροφή και δομικά στοιχεία π.χ.: δοκοί). Εφαρμόστε 20 γρ προϊόντος/τ.μ. σε λεπτές στρώσεις ως τοπική εφαρμογή.
- Μην εφαρμόζετε σε περιοχές που υποβάλλονται τακτικά σε υγρό καθαρισμό.
- Καλύψτε το δάπεδο κατά την διάρκεια γεμίματος των εργαλείων εφαρμογής με το προϊόν και απορρίψτε το υλικό στα στερεά απόβλητα, προκειμένου να αποφύγετε διαρροές στο δάπεδο.
- Για την εφαρμογή, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ρούχα μιας χρήσης (π.χ. χάρτινες ρόμπες, ποδιές, ολόσωμη φόρμα) ώστε να αποφευχθούν τυχόν διαρροές στο αποχετευτικό σύστημα μέσω του πλυσίματος των μολυσμένων ρούχων.
- Όταν απαιτείται καθαρισμός μετά τη χρήση σε εσωτερικούς χώρους, να χρησιμοποιούνται μέθοδοι στεγνού καθαρισμού(π.χ. ηλεκτρική σκούπα).

Για εφαρμογή σε σφηκοφωλιές (σε εξωτερικό χώρο):

- Σε περίπτωση ορατών φωλιών, εφαρμόστε το προϊόν στη φωλιά και σε περίπτωση κρυφών φωλιών στην είσοδο της φωλιάς με τη μέγιστη δόση 2 g/φωλιά.
- Μέγιστο 1 εφαρμογή ανά φωλιά, με εφαρμογή έως 5 φωλιών ανά κατοικία και 7 φωλιών γύρω από μεγαλύτερα κτίρια.

**4.2.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση**

Εφαρμόστε μόνο σε περιοχές που δεν είναι επιρρεπείς σε βύθιση ή υγρασία, δηλαδή προστατευμένες από βροχή, πλημμύρες και νερό καθαρισμού.

Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται έτσι ώστε τα παιδιά και τα κατοικίδια να μην έρχονται σε επαφή με το προϊόν.

Αφαιρέστε οποιοδήποτε εργαλείο που μπορεί να έρθει σε επαφή με τρόφιμα/ζωοτροφές κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα, τις ζωοτροφές και τα ποτά πριν από την εφαρμογή. Μην (χρησιμοποιείτε/ εφαρμόζετε) απευθείας πάνω ή κοντά σε τρόφιμα, ζωοτροφές ή ποτά, ή σε επιφάνειες ή σκεύη που είναι πιθανό να έρθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά και ζώα/κατοικίδια ζώα. Μην εφαρμόζετε απευθείας σε επιφάνειες στις οποίες αποθηκεύονται, παρασκευάζονται ή καταναλώνονται τρόφιμα ή ζωοτροφές.

Διαβάζετε πάντα την ετικέτα ή το φυλλάδιο πριν από τη χρήση και τηρείτε όλες τις οδηγίες που παρέχονται.

Για να βελτιστοποιήσετε την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής, διατηρήστε καλές πρακτικές υγιεινής: απομακρύνετε ή εμποδίστε την πρόσβαση σε όλες τις πηγές τροφής των εντόμων. Το δόλωμα πρέπει να είναι η βασική πηγή τροφής των μυρμηγκιών.

Ελέγξτε τις περιοχές εφαρμογής ανά εβδομάδα.

Λάβετε υπόψη τον βιολογικό κύκλο και τα χαρακτηριστικά του εντόμου-στόχου και προσαρμόστε κατάλληλα τις εφαρμογές. Συγκεκριμένα, στοχεύστε το πιο ευαίσθητο στάδιο του στόχου, την περίοδο και τις περιοχές εφαρμογής.

Υιοθετήστε ολοκληρωμένες μεθόδους διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών όπως τον συνδυασμό χημικών, φυσικών μεθόδων ελέγχου και άλλες μεθόδους δημόσιας υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τοπικές ιδιαιτερότητες (κλιματικές συνθήκες, στόχοι, συνθήκες χρήσης, κτλ.)

Ενημερώστε τον υπεύθυνο για τη διανομή ή τον κάτοχο της έγκρισης εάν η εφαρμογή δεν είναι αποτελεσματική.

Ο κάτοχος της έγκρισης πρέπει να αναφέρει οποιαδήποτε συμβάν ανθεκτικότητας στις Αρμόδιες Αρχές ή σε άλλες υπηρεσίες αρμόδιες με την διαχείριση ανθεκτικότητας (δεν είναι σχετικό για την ετικέτα του προϊόντος).

Καθορίστε ένα όριο παρακολούθησης των επιπέδων αποτελεσματικότητας σε πληθυσμούς σε καίρια σημεία (τουλάχιστον μία επισκόπηση ανά έτος) ώστε να ανιχνεύσετε σημαντικές αλλαγές στην ευαισθησία στην δραστική ουσία. Πληροφορίες από προγράμματα παρακολούθησης ανθεκτικότητας επιτρέπουν την έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων και δίνουν πληροφορίες για σωστή λήψη αποφάσεων.

#### **4.2.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών**

Δείτε τις Γενικές Οδηγίες Χρήσης

#### **4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του σκευάσματος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση**

Δείτε τις Γενικές Οδηγίες Χρήσης

#### **4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του σκευάσματος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση**

Δείτε τις Γενικές Οδηγίες Χρήσης

### **Πίνακας 3. Χρήση # 3 – Επιφανειακή εφαρμογή από επαγγελματίες χρήστες κατά του κόκκινου ακάρεος των πουλερικών**

Τύπος προϊόντος	PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
-----------------	--

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Ακαρεοκτόνο σε μορφή σκόνης επίπασης για την αντιμετώπιση του κόκκινου ακάρεος των πουλερικών σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Κόκκινο άκαρι των πουλερικών ( <i>Dermanysus gallinae</i> )
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί χώροι σε πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Εφαρμογή με αυτόματη αντλία επίπασης σκόνης για επιφανειακή εφαρμογή. Εφαρμογή με επίπαση μέσω: Φιαλιδίου τύπου αλατιέρας Φιαλιδίου με λεπτό στόμιο Φυσητήρα σκόνης Πιστολιού σκόνης με μακρύ ακροφύσιο  Το δοσομετρικό πώμα φέρει 3 είδη οπών (μεγάλες, μεσαίες, μικρές). Από το δοσομετρικό πώμα απελευθερώνεται ποσότητα προϊόντος σύμφωνα με το παρακάτω: 1 μεγάλη έξοδος απελευθερώνει 1 γρ. προϊόντος κάθε 2 δευτερόλεπτα 1 μεσαία έξοδος απελευθερώνει 1 γρ. προϊόντος κάθε 6 δευτερόλεπτα 7 μικρές έξοδοι απελευθερώνουν 0.5 γρ. προϊόντος με κάθε κίνηση
Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 20 g/m <sup>2</sup>  Το προϊόν δεν έχει υπολειμματική δράση. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4 εφαρμογές ανά έτος με μεσοδιάστημα 90 ημερών μεταξύ των εφαρμογών.
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Φιάλη που φέρει διάτρητο πώμα (Φιάλη από HDPE ή PP με διάτρητο πώμα από HDPE) – 5 γρ έως 1000 γρ. Σακούλες από σύνθετο υλικό (LDPE/aluminium εσωτερικά με Polyester ή PP εξωτερικά), θερμοκολλημένες και εντός κάδου – 1000 έως 7000 γρ. Σακούλες 25 κιλών από σύνθετο υλικό (LDPE/aluminium εσωτερικά με Polyester ή PP εξωτερικά), θερμοκολλημένες.

#### 4.3.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια και ολόσωμη φόρμα κατά την εφαρμογή του προϊόντος με αυτόματο μηχανισμό φυσήματος.

Μέχρι 4 εφαρμογές ανά έτος, μετά τον καθαρισμό των εγκαταστάσεων.

Η εφαρμογή του προϊόντος θα πρέπει να πραγματοποιείται κατάλληλα ώστε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα να μην έρχονται σε επαφή με το προϊόν.

Απομακρύνετε όλα τα ζώα πριν την εφαρμογή του προϊόντος στο χώρο. Τα ζώα μπορούν να επιστρέψουν στο χώρο αφού πρώτα το προϊόν επικαθίσει.

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προϊόντος, απομακρύνετε οποιοδήποτε εργαλείο μπορεί να έρθει σε επαφή με τρόφιμα/ζωοτροφές.

Για την αποφυγή μόλυνσης με το προϊόν, πριν την εφαρμογή του προϊόντος, καλύψτε δεξαμενές νερού, ζωοτροφές, γούρνες και άλλες επιφάνειες ή εξοπλισμό που μπορεί να έρθουν σε επαφή με ζωοτροφές.

#### **4.3.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση**

Μόνο για εφαρμογή σε πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Το προϊόν να ΜΗΝ χρησιμοποιείται σε εγκαταστάσεις ζώων όπου η έκθεση σε μονάδα επεξεργασίας λυμάτων (STP) ή/και η άμεση έκθεση στα επιφανειακά ύδατα δεν μπορεί να αποτραπεί.

Για καλύτερη αποτελεσματικότητα, μην εφαρμόζετε το προϊόν σε περίπτωση βροχής ή ανέμου.

Για καλύτερη αποτελεσματικότητα, εφαρμόστε καλές πρακτικές υγιεινής: απομακρύνετε ή αποτρέψτε την πρόσβαση του οργανισμού στόχου σε κάθε πηγή τροφής.

Ελέγχετε τις περιοχές εφαρμογής μία φορά την εβδομάδα.

Στρατηγικές για τη διαχείρισης ανάπτυξης ανθεκτικότητας:

- Χρήση εναλλακτικών προϊόντων που περιέχουν δραστικές ουσίες με διαφορετικό τρόπο δράσης, (για την απομάκρυνση ανθεκτικών ατόμων από τον πληθυσμό).
- Ενημερώστε τον κάτοχο εάν η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική.
- Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να αναφέρει τυχόν περιστατικά ανθεκτικότητας που έχει παρατηρήσει στις Αρμόδιες Αρχές (ΑΑ) ή σε άλλους αρμόδιους φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση της ανθεκτικότητας. (αυτό δεν είναι σχετικό με την ετικέτα του προϊόντος).
- Καθιέρωση βάσης και παρακολούθηση των επιπέδων αποτελεσματικότητας σε πληθυσμούς σε βασικές περιοχές (τουλάχιστον μία έρευνα ετησίως) προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν σημαντικές αλλαγές στην ευαισθησία στη δραστική ουσία. Οι πληροφορίες από τα προγράμματα παρακολούθησης της ανθεκτικότητας επιτρέπουν την έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων και παρέχουν πληροφορίες για τη σωστή λήψη αποφάσεων.
- Εξετάστε τον κύκλο ζωής και τα χαρακτηριστικά των επιβλαβών οργανισμών στόχων και προσαρμόστε την εφαρμογή κατάλληλα. Ειδικότερα, θα πρέπει να εντοπίζονται τα ευπαθή στάδια ανάπτυξης προσαρμόζοντας κατάλληλα το χρόνο και το πεδίο εφαρμογής.
- Ελέγχετε τακτικά τις περιοχές εφαρμογής.
- Εφαρμόστε πάντοτε μετά από σχολαστικό καθαρισμό και απολύμανση του χώρου. Συνιστάται επίσης και συνδυασμός της εφαρμογής με φυσικές μεθόδους όπως αύξηση της θερμοκρασίας σε κενούς χώρους.
- Εφαρμόστε μέτρα υγιεινής τόσο στο προσωπικό με πρόσβαση στις εγκαταστάσεις όσο και στον εξοπλισμό καθώς θα πρέπει να αποφεύγεται η μεταφορά ακάρεων στα ρούχα, τα κλουβιά ή τα αυγά.

#### **4.3.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών**

Δείτε τις Γενικές Οδηγίες χρήσης

#### 4.3.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του σκευάσματος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις Γενικές Οδηγίες χρήσης

#### 4.3.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του σκευάσματος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις Γενικές Οδηγίες χρήσης

#### Πίνακας 4. Χρήση # 4 – Επιφανειακή εφαρμογή από το ευρύ κοινό κατά του κόκκινου ακάρεος των πουλερικών

Τύπος προϊόντος	PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Ακαρεοκτόνο σε μορφή σκόνης επίπασης για την αντιμετώπιση του κόκκινου ακάρεος των πουλερικών σε κλουβιά πουλιών και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Κόκκινο άκαρι των πουλερικών ( <i>Dermanyssus gallinae</i> ) - Ακμαία
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί χώροι σε πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Εφαρμογή με επίπαση Εφαρμογή με αυτόματη αντλία επίπασης σκόνης για επιφάνειες. Εφαρμογή με επίπαση μέσω: Φιαλιδίου τύπου αλατιέρας Φιαλιδίου με λεπτό στόμιο Φυσητήρα σκόνης Πιστολιού σκόνης με μακρύ ακροφύσιο  Το δοσομετρικό πώμα φέρει 3 είδη οπών (μεγάλες, μεσαίες, μικρές). Από το δοσομετρικό πώμα απελευθερώνεται ποσότητα προϊόντος σύμφωνα με το παρακάτω: 1 μεγάλη έξοδος απελευθερώνει 1 γρ. προϊόντος κάθε 2 δευτερόλεπτα 1 μεσαία έξοδος απελευθερώνει 1 γρ. προϊόντος κάθε 6 δευτερόλεπτα 7 μικρές έξοδοι απελευθερώνουν 0.5 γρ. προϊόντος με κάθε κίνηση
Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 20 g/m <sup>2</sup>  Το προϊόν δεν έχει υπολειμματική δράση. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4 εφαρμογές ανά έτος με μεσοδιάστημα 90 ημερών μεταξύ των εφαρμογών.
Κατηγορία/-ες χρηστών	Ευρύ κοινό

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Φιάλη που φέρει διάτρητο πώμα (Φιάλη από HDPE ή PP με διάτρητο πώμα από HDPE) - έως 5γρ - 1000 γρ. Σακούλες από σύνθετο υλικό (LDPE/aluminium εσωτερικά με Polyester ή PP εξωτερικά), θερμοκολλημένες και εντός δοχείου - έως 5γρ - 1000 γρ.
--	---

#### 4.4.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Μέχρι 4 εφαρμογές ανά έτος, μετά τον καθαρισμό των εγκαταστάσεων. Η εφαρμογή του προϊόντος θα πρέπει να πραγματοποιείται κατάλληλα ώστε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα να μην έρχονται σε επαφή με το προϊόν.

Απομακρύνετε όλα τα ζώα πριν την εφαρμογή του προϊόντος στο χώρο. Τα ζώα μπορούν να επιστρέψουν στο χώρο αφού πρώτα το προϊόν επικαθίσει.

Μην εφαρμόζετε το προϊόν παρουσία τροφίμων/ζωοτροφών.

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προϊόντος, απομακρύνετε οποιοδήποτε εργαλείο μπορεί να έρθει σε επαφή με τρόφιμα/ζωοτροφές.

Για την αποφυγή μόλυνσης με το προϊόν, πριν την εφαρμογή του προϊόντος, καλύψτε δεξαμενές νερού, ζωοτροφές, γούρνες και άλλες επιφάνειες ή εξοπλισμό που μπορεί να έρθουν σε επαφή με ζωοτροφές.

#### 4.4.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Μόνο για εφαρμογή σε πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Απορρίψτε το επεξεργασμένο υλικό ως στερεό απόβλητο ή ως κομπόστ. Μην απορρίπτετε στην αποχέτευση.

Στρατηγικές για τη διαχείριση ανάπτυξης ανθεκτικότητας:

- Χρήση εναλλακτικών προϊόντων που περιέχουν δραστικές ουσίες με διαφορετικό τρόπο δράσης, (για την απομάκρυνση ανθεκτικών ατόμων από τον πληθυσμό).
- Ενημερώστε τον κάτοχο εάν η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική.
- Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να αναφέρει τυχόν περιστατικά ανθεκτικότητας που έχει παρατηρήσει στις Αρμόδιες Αρχές (ΑΑ) ή σε άλλους αρμόδιους φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση της ανθεκτικότητας. (αυτό δεν είναι σχετικό με την ετικέτα του προϊόντος).
- Καθιέρωση βάσης και παρακολούθηση των επιπέδων αποτελεσματικότητας σε πληθυσμούς σε βασικές περιοχές (τουλάχιστον μία έρευνα ετησίως) προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν σημαντικές αλλαγές στην ευαισθησία στη δραστική ουσία. Οι πληροφορίες από τα προγράμματα παρακολούθησης της ανθεκτικότητας επιτρέπουν την έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων και παρέχουν πληροφορίες για τη σωστή λήψη αποφάσεων.
- Εξετάστε τον κύκλο ζωής και τα χαρακτηριστικά των επιβλαβών οργανισμών στόχων και προσαρμόστε την εφαρμογή κατάλληλα. Ειδικότερα, θα πρέπει να εντοπίζονται τα ευπαθή στάδια ανάπτυξης προσαρμόζοντας κατάλληλα το χρόνο και το πεδίο εφαρμογής.
- Ελέγχετε τακτικά τις περιοχές εφαρμογής.
- Εφαρμόστε πάντοτε μετά από σχολαστικό καθαρισμό και απολύμανση του χώρου.

Συνιστάται επίσης και συνδυασμός της εφαρμογής με φυσικές μεθόδους όπως αύξηση της θερμοκρασίας σε κενούς χώρους.

- Εφαρμόστε μέτρα υγιεινής τόσο στο προσωπικό με πρόσβαση στις εγκαταστάσεις όσον και στον εξοπλισμό καθώς θα πρέπει να αποφεύγεται η μεταφορά ακάρεων στα ρούχα, τα κλουβιά ή τα αυγά.

#### 4.4.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών

Δείτε τις Γενικές Οδηγίες χρήσης

#### 4.4.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του σκευάσματος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις Γενικές Οδηγίες χρήσης

#### 4.4.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του σκευάσματος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις Γενικές Οδηγίες χρήσης

### Πίνακας 5. Χρήση # 5 – Εσωτερική χρήση σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις εκτροφής ζώων – Ευρύ κοινό

Τύπος προϊόντος	PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Εντομοκτόνο σε μορφή σκόνης επίπασης για την αντιμετώπιση των τσιμπουριών, μυγών και σφήκων μέσω επιφανειακής εφαρμογής σε κτηνοτροφικές μονάδες και εγκαταστάσεις εκτροφής ζώων.
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Τσιμπούρια ( <i>Ixodes Ricinus</i> ) - Ακμαία Μύγα των στάβλων ( <i>Stomoxys calcitrans</i> ) – Ακμαία Οικιακή Μύγα ( <i>Musca domestica</i> ) – Ακμαία Σφήκες ( <i>Vesputula vulgaris</i> )- Ακμαία
Πεδίο χρήσης	Εσωτερική χρήση σε κτηνοτροφικές μονάδες και εγκαταστάσεις εκτροφής ζώων.
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Εφαρμογή με επίπαση Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας με διασπορά ή με επίπαση (χειροκίνητος διανομέας). Επιφανειακή εφαρμογή σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (τσιμπούρια στο δάπεδο, σφήκες και μύγες στο δάπεδο και σε οριζόντιες επιφάνειες).
Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 20 g/m <sup>2</sup> Το προϊόν δεν έχει υπολειμματική δράση. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 εφαρμογές ανά έτος με μεσοδιάστημα 90 ημερών μεταξύ των εφαρμογών.
Κατηγορία/-ες χρηστών	Ευρύ κοινό
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Φιάλη που φέρει διάτρητο πώμα (Φιάλη από HDPE ή PP με διάτρητο πώμα από HDPE)- έως 5γρ - 1000 γρ. Σακούλες από σύνθετο υλικό (LDPE/aluminium εσωτερικά με Polyester ή PP εξωτερικά), θερμοκολλημένες και εντός δοχείου - έως 5γρ - 1000 γρ.

#### 4.5.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Μέχρι 2 εφαρμογές ανά έτος.

Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται έτσι ώστε τα παιδιά και τα κατοικίδια να μην έρχονται σε επαφή με το προϊόν.

Απομακρύνετε όλα τα ζώα από την εγκατάσταση πριν από την εφαρμογή. Τα ζώα μπορούν να επανεισαχθούν στις εγκαταστάσεις όταν το προϊόν έχει ήδη χρησιμοποιηθεί.

Μόνο για εφαρμογή σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις εκτροφής ζώων.

Απορρίψτε το επεξεργασμένο υλικό ως στερεά απόβλητα ή ως κομπόστ. Μην το απορρίπτετε στην αποχέτευση.

Μην το χρησιμοποιείτε σε χώρους στέγασης ζώων όπου η έκθεση σε μονάδα λυμάτων (STP) ή/ και η άμεση έκθεση σε επιφανειακά ύδατα δεν μπορούν να αποτραπούν.

Οι στρατηγικές για τη διαχείριση της ανθεκτικότητας είναι οι εξής:

- Χρήση εναλλακτικών προϊόντων που περιέχουν δραστικές ουσίες με διαφορετικό τρόπο δράσης, (για την απομάκρυνση ανθεκτικών ατόμων από τον πληθυσμό).
- Ενημερώστε τον κάτοχο εάν η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική.
- Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να αναφέρει τυχόν περιστατικά ανθεκτικότητας που έχει παρατηρήσει στις Αρμόδιες Αρχές (ΑΑ) ή σε άλλους διορισμένους φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση της ανθεκτικότητας. (αυτό δεν είναι σχετικό με την ετικέτα του προϊόντος).
- Καθιέρωση βάσης και παρακολούθηση των επιπέδων αποτελεσματικότητας σε πληθυσμούς σε βασικές περιοχές (τουλάχιστον μία έρευνα ετησίως) προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν σημαντικές αλλαγές στην ευαισθησία στη δραστική ουσία. Οι πληροφορίες από τα προγράμματα παρακολούθησης της ανθεκτικότητας επιτρέπουν την έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων και παρέχουν πληροφορίες για τη σωστή λήψη αποφάσεων.
- Εξετάστε τον κύκλο ζωής και τα χαρακτηριστικά των επιβλαβών οργανισμών στόχων και προσαρμόστε την εφαρμογή κατάλληλα. Ειδικότερα, θα πρέπει να εντοπίζονται τα ευπαθή στάδια ανάπτυξης προσαρμόζοντας κατάλληλα το χρόνο και το πεδίο εφαρμογής.
- Ελέγχετε τακτικά τις περιοχές εφαρμογής.
- Εφαρμόστε πάντοτε μετά από σχολαστικό καθαρισμό και απολύμανση του χώρου. Συνιστάται επίσης και συνδυασμός της εφαρμογής με φυσικές μεθόδους όπως αύξηση της θερμοκρασίας σε κενούς χώρους.
- Εφαρμόστε μέτρα υγιεινής τόσο στο προσωπικό με πρόσβαση στις εγκαταστάσεις όσο και στον εξοπλισμό καθώς θα πρέπει να αποφεύγεται η μεταφορά ακάρεων στα ρούχα, τα κλουβιά ή τα αυγά.

**4.5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση**

Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε κατοικίδια ζώα ή ζώα εκτροφής.

Μην εφαρμόζετε απευθείας πάνω σε ζώα.

Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα, τις ζωοτροφές και τα ποτά πριν από την εφαρμογή.

Μην χρησιμοποιείτε/ εφαρμόζετε απευθείας πάνω ή κοντά σε τρόφιμα, ζωοτροφές ή ποτά, ή σε επιφάνειες ή σκεύη που είναι πιθανό να έρθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά και ζώα/κατοικίδια ζώα.

Απομακρύνετε οποιοδήποτε εργαλείο που μπορεί να έρθει σε επαφή με τρόφιμα/ζωοτροφές κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

Φυλάξτε το προϊόν μακριά από παιδιά, πουλιά, κατοικίδια ζώα, ζώα εκτροφής και άλλα μη στοχευόμενα ζώα.

**4.5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών**

Δείτε τις Γενικές Οδηγίες χρήσης

#### 4.5.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του σκευάσματος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις Γενικές Οδηγίες χρήσης

#### 4.5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του σκευάσματος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις Γενικές Οδηγίες χρήσης

### Πίνακας 6. Χρήση # 6 – Εσωτερική χρήση σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις εκτροφής ζώων – Επαγγελματίες Χρήστες

Τύπος προϊόντος	PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Εντομοκτόνο σε μορφή σκόνης επίπασης για την αντιμετώπιση των τσιμπουριών, μυγών και σφήκων μέσω επιφανειακής εφαρμογής σε κτηνοτροφικές μονάδες και εγκαταστάσεις εκτροφής ζώων.
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Τσιμπούρια ( <i>Ixodes Ricinus</i> ) - Ακμαία Μύγα των στάβλων ( <i>Stomoxys calcitrans</i> ) – Ακμαία Οικιακή Μύγα ( <i>Musca domestica</i> ) – Ακμαία Σφήκες ( <i>Vespula vulgaris</i> ) – Ακμαία
Πεδίο χρήσης	Εσωτερική χρήση σε κτηνοτροφικές μονάδες και εγκαταστάσεις εκτροφής ζώων.
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Εφαρμογή με επίπαση Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας με διασπορά ή με επίπαση με χειροκίνητο διανομέα, φουσερό και πιστόλι τύπου εμβόλου). Επιφανειακή εφαρμογή σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (τσιμπούρια στο δάπεδο, σφήκες και μύγες στο δάπεδο και σε οριζόντιες επιφάνειες).
Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 20 g/m <sup>2</sup> Το προϊόν δεν έχει υπολειμματική δράση. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 εφαρμογές ανά έτος με μεσοδιάστημα 90 ημερών μεταξύ των εφαρμογών.
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Φιάλη που φέρει διάτρητο πώμα (Φιάλη από HDPE ή PP με διάτρητο πώμα από HDPE)- 5γρ έως 1000 γρ. Σακούλες από σύνθετο υλικό (LDPE/αλουμίνιο εσωτερικά με Polyester ή PP εξωτερικά), θερμοκολλημένες και εντός δοχείου - 1000γρ έως 7000 γρ. Σακούλες των 25 κιλών από σύνθετο υλικό (LDPE/αλουμίνιο εσωτερικά με πολυεστέρα ή PP εξωτερικά) θερμοκολλημένες.

**4.6.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση**

Μέχρι 2 εφαρμογές ανά έτος.

Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται έτσι ώστε τα παιδιά και τα κατοικίδια να μην έρχονται σε επαφή με το προϊόν.

Απομακρύνετε όλα τα ζώα από την εγκατάσταση πριν από την εφαρμογή. Τα ζώα μπορούν να επανεισαχθούν στις εγκαταστάσεις όταν το προϊόν έχει ήδη χρησιμοποιηθεί.

Μόνο για εφαρμογή σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις εκτροφής ζώων.

Απορρίψτε το επεξεργασμένο υλικό στα στερεά απόβλητα ή ως κομπόστ. Μην το απορρίπτετε στην αποχέτευση.

Μην το χρησιμοποιείτε σε χώρους στέγασης ζώων όπου η έκθεση σε μονάδα επεξεργασίας λυμάτων (STP) ή/και η άμεση εκπομπή σε επιφανειακά ύδατα δεν μπορούν να αποτραπούν.

Οι στρατηγικές για τη διαχείριση της ανθεκτικότητας είναι οι εξής:

- Χρήση εναλλακτικών προϊόντων που περιέχουν δραστικές ουσίες με διαφορετικό τρόπο δράσης, (για την απομάκρυνση ανθεκτικών ατόμων από τον πληθυσμό).
- Ενημερώστε τον κάτοχο εάν η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική.
- Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να αναφέρει τυχόν περιστατικά ανθεκτικότητας που έχει παρατηρήσει στις Αρμόδιες Αρχές (ΑΑ) ή σε άλλους αρμόδιους φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση της ανθεκτικότητας. (αυτό δεν είναι σχετικό με την ετικέτα του προϊόντος).
- Καθιέρωση βάσης και παρακολούθηση των επιπέδων αποτελεσματικότητας σε πληθυσμούς σε βασικές περιοχές (τουλάχιστον μία έρευνα ετησίως) προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν σημαντικές αλλαγές στην ευαισθησία στη δραστική ουσία. Οι πληροφορίες από τα προγράμματα παρακολούθησης της ανθεκτικότητας επιτρέπουν την έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων και παρέχουν πληροφορίες για τη σωστή λήψη αποφάσεων.
- Εξετάστε τον κύκλο ζωής και τα χαρακτηριστικά των επιβλαβών οργανισμών στόχων και προσαρμόστε την εφαρμογή κατάλληλα. Ειδικότερα, θα πρέπει να εντοπίζονται τα ευπαθή στάδια ανάπτυξης προσαρμόζοντας κατάλληλα το χρόνο και το πεδίο εφαρμογής.
- Ελέγχετε τακτικά τις περιοχές εφαρμογής
- Εφαρμόστε πάντοτε μετά από σχολαστικό καθαρισμό και απολύμανση του χώρου. Συνιστάται επίσης και συνδυασμός της εφαρμογής με φυσικές μεθόδους όπως αύξηση της θερμοκρασίας σε κενούς χώρους.
- Εφαρμόστε μέτρα υγιεινής και στο προσωπικό με πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό καθώς θα πρέπει να αποφεύγεται η μεταφορά ακάρεων στα ρούχα, τα κλουβιά ή τα αυγά.

**4.6.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση**

Μην το εφαρμόζετε κατά την παρουσία ανθρώπων (ειδικά παιδιών), κατοικίδιων ή άλλων ζώων.

Μην εφαρμόζετε απευθείας πάνω σε ζώα.

Φυλάξτε το προϊόν μακριά από παιδιά, πουλιά, κατοικίδια ζώα, ζώα εκτροφής και άλλα μη στοχευόμενα ζώα.

**4.6.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών**

Δείτε τις Γενικές Οδηγίες χρήσης

**4.6.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του σκευάσματος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση**

Δείτε τις Γενικές Οδηγίες χρήσης

#### 4.6.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του σκευάσματος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις Γενικές Οδηγίες χρήσης

### 5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

#### 5.1. Οδηγίες χρήσης

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

- Πλύνετε τα χέρια σας μετά τον χειρισμό, την επεξεργασία και πριν από τα γεύματα.
- Μην αναμειγνύετε με άλλες χημικές ουσίες ή προϊόντα.
- Μην εφαρμόζετε παρουσία ανθρώπων (ειδικά παιδιών), κατοικίδιων ζώων ή άλλων ζώων.
- Αφαιρέστε τυχόν τρόφιμα/ζωοτροφές από το σημείο εφαρμογής.
- Πριν από την επεξεργασία για να αποφύγετε οποιαδήποτε μόλυνση καλύψτε τις δεξαμενές νερού, τροφές/ζωοτροφές, τις γούρνες και άλλες επιφάνειες ή εξοπλισμό που μπορεί να έρθουν σε επαφή με το προϊόν.
- Αφαιρέστε οποιοδήποτε εργαλείο που μπορεί να έρθει σε επαφή με τρόφιμα/ζωοτροφές κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- Μην μολύνετε λίμνες, σωλήνες νερού ή τάφρους με το προϊόν ή με τα άδεια δοχεία.

#### 5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα ή το φυλλάδιο οδηγιών χρήσης πριν από τη χρήση και να ακολουθείτε όλες τις οδηγίες που παρέχονται.

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και μη στοχευόμενα ζώα/κατοικίδια.

Αποφύγετε την επαφή με τις επεξεργασμένες επιφάνειες/περιοχές, ιδιαίτερα από παιδιά.

#### 5.3. Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες και για τις οδηγίες πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτακτα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

##### Οδηγίες πρώτων βοηθειών

Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα. Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Διατηρήστε τον ασθενή σε ηρεμία. Διατηρήστε τη θερμοκρασία του σώματος. Εάν το άτομο είναι αναίσθητο, ξαπλώστε τον/την στο πλάι με το κεφάλι χαμηλότερα από το υπόλοιπο σώμα και τα γόνατα ελαφρώς λυγισμένα. Παρακολουθήστε την αναπνοή, εάν είναι απαραίτητο, εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ. ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ τον ασθενή σε νοσοκομείο και, όποτε είναι δυνατόν, πάρτε μαζί σας το δοχείο ή την ετικέτα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, καλέστε ένα ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε το δέρμα με νερό. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, καλέστε ένα ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, ξεπλύνετε με νερό. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να το κάνετε. Καλέστε ένα ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

##### Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, τόσο οξείες όσο και μεταγενέστερες:

Η δηλητηρίαση μπορεί να προκαλέσει τα ακόλουθα συμπτώματα: παραισθησία, η οποία

μπορεί να είναι σοβαρή στο δέρμα και τα μάτια. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στα μάτια, το δέρμα και τους βλεννογόνους. Η εισπνοή μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό, βήχα. Κίνδυνος πνευμονικού οιδήματος. Διέγερση, γαστρεντερικές διαταραχές, τρόμος, ζάλη, πονοκέφαλος, λήθαργος, έμετος, κοιλιακός πόνος, μυϊκές συσπάσεις, ναυτία, απώλεια συνείδησης.

Ένδειξη οποιασδήποτε άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας που απαιτείται, χορηγείται αμέσως.

Αρχικά, η θεραπεία είναι συμπτωματική και υποστηρικτική.

**Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων 210 7793777**

#### Μέτρα έκτακτης ανάγκης για την προστασία του περιβάλλοντος

Προσωπικά Μέτρα Πρόληψης: προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης: Κρατήστε τους ανθρώπους μακριά και απομονώστε την περιοχή διαρροής. Αποφύγετε την επαφή με το προϊόν που έχει διαρρεύσει ή τις μολυσμένες επιφάνειες.

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: Αποτρέψτε την είσοδο του προϊόντος στο περιβάλλον (επιφανειακά και υπόγεια ύδατα), στην αποχέτευση, κλπ, με την κατασκευή προστατευτικών φραγμάτων και το κλείσιμο των αποχετεύσεων. Ενημερώστε τις αρμόδιες αρχές για ανεξέλεγκτες διαρροές ή διαρροές σε υδάτινα ρεύματα, αποχετεύσεις, υπονόμους.

Μέθοδοι και υλικά για τον περιορισμό και τον καθαρισμό: Απορροφήστε τη διαρροή σε αδρανές υλικό (άμμος, καολίνη, κλπ), συλλέξτε και τοποθετήστε την σε δοχεία για αργότερα, τα οποία θα χαρακτηριστούν κατάλληλα ως επικίνδυνα απόβλητα.

#### **5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του**

- Απορρίψτε το περιεχόμενο/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς διαχείρισης αποβλήτων.
- Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση.
- Μην μολύνετε λίμνες, σωλήνες νερού ή τάφρους με το προϊόν ή με το άδειο δοχείο.
- Μην επαναχρησιμοποιείτε τη συσκευασία.

#### **5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης**

Το προϊόν θα πρέπει να αποθηκεύεται στις αρχικές, ερμητικά κλειστές συσκευασίες σε δροσερό, ξηρό, και καλά αεριζόμενο χώρο έως 30°C.

Αποφύγετε τις υψηλές θερμοκρασίες και την απευθείας έκθεση στο ηλιακό φως.

Προστατέψτε το από υγρασία.

Οι περιέκτες πρέπει να τοποθετηθούν κατάλληλα ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα.

Μην το αποθηκεύετε μαζί με οξειδωτικά, αλκάλια (καυστικά διαλύματα), ή οξέα. Κρατήστε μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Να ελέγχετε συχνά τα αποθέματα για τυχόν ζημιές.

Χρόνος αποθήκευσης: 4 χρόνια εφόσον τηρούνται κατάλληλες συνθήκες.

Μην αποθηκεύετε σε θερμοκρασίες άνω των 35° C.

- II. Το κείμενο της ετικέτας να είναι σύμφωνο με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.
- III. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. πρωτ. **7508/180159 ΠΕ /28-01-2020** απόφασή μας όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης  
Γεωργίας»**

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ**

Sharda Europe B.V.B.A., Heedstraat 58, 1730 Asse, Βέλγιο