

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Alga 300 είναι ένα συμπυκνωμένο εκχύλισμα καφέ φύκους του γένους *Sargassum* σε συγκέντρωση 35% β/ο. Παράγεται μέσω μίας εξειδικευμένης και ήπιας διαδικασίας ενζυμολύσεως με την οποία παραλαμβάνονται όλα τα οργανικά συστατικά του φύκους. Με την πρωτοποριακή διαδικασία παρασκευής του, προστατεύονται όλες οι φυτικές ορμόνες, τα αμινοξέα, το αλγινικό οξύ, οι βιταμίνες του φύκους και μεγιστοποιείται η ικανότητα δημιουργίας οργανικών συμπλόκων του σκευάσματος.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ

• Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. • Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/ διεθνείς κανονισμούς. • Για να αποφεύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. • Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ενίσχυση των βιολογικών διεργασιών των φυτών με φυσικές ισορροπημένες ορμόνες. Ενίσχυση της ανθοφορίας, της καρποδέσης, του μεγέθους, του χρωματισμού των καρπών καθώς και της παραγωγής σακχάρων. Βελτίωση της συντήρησης των καρπών μετά την συγκομιδή. Περιορίζει το περιβαλλοντικό στρες.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Επικοινωνήστε με τους κατά τόπους γεωπόνους. Πριν την εφαρμογή κάντε δοκιμές συνδυαστικότητας με μικρό όγκο ψεκαστικού υγρού.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οι προτεινόμενες δόσεις είναι καθαρά ενδεικτικές και μεταβάλλονται ανάλογα με τη θερμοκρασία, την ηλιοφάνεια, την επάρκεια νερού κ.τ.λ. Να αποφεύγεται η χρήση σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Οι εφαρμογές συστήνονται να γίνονται νωρίς το πρωί ή το απόγευμα. Μην υπερβαίνετε τις συστατώμενες δόσολογίες. Συστήνεται η εφαρμογή του μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της ετικέτας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση είναι ευθύνη του αγοραστή. Ανακινείστε καλά πριν τη χρήση.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Διατηρείστε το σε μέρος ξηρό και δροσερό. Προφυλάξτε το προϊόν από την έκθεση στον ήλιο και πιθανές χαμηλές θερμοκρασίες.



The Power from Ocean
The Source of Health

Alga300

Συμπυκνωμένο εκχύλισμα φυκιού
του γένους *Sargassum*

Ουσία βοηθητική της ανάπτυξης των
φυτών σύμφωνα με την Υ.Α. 217217/2004



Σύνθεση: Εκχύλισμα φυκιού: 35 % β/ο
Οργανική ουσία 12% β/ο
Αλγινικό οξύ 4% β/ο

Περιεχόμενο: 1 λίτρο

Προέλευση:
Leili Marine Bioindustry Inc



Αποκλειστική διανομή για την Ελλάδα:
FARMA-CHEM SA
ΒΙ.Π.Ε. ΣΙΝΔΟΥ - Γ' ΖΩΝΗ - Τ.Θ 1026
570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ: 2310 569 630 έως 3
FAX: 2310 797 047
info@farmachem.gr - www.farmachem.gr

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά), Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Κερασιά, Δαμασκηνιά, Βερκοκιά): Συνιστώνται ψεκασμοί λίγο πριν την έναρξη της άνθησης, στην καρποδέση και κατά την αύξηση του καρπού. Δόση: 100-200 κ.εκ./100 λίτρα νερό. **Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά Μανταρινιά, Γκρέιπ φρουτ, Λεμονιά):** Συνιστώνται ψεκασμοί, στα 2/3 της ανοιξιάτικης βλάστησης, στην πτώση των πετάλων, στο γέμισμα του καρπού το καλοκαίρι και 4-6 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή. Δόση: 100-200 κ.εκ./100 λίτρα νερό. **Αμπέλι - Σουλτανιά:** Συνιστώνται ψεκασμοί στο μάκρμα (επιμήκυνση βότρυ) και στα χοντράματα μετά την καρποδέση. Δόση: 100-200 κ.εκ./100 λίτρα νερό. **Εμπραπέδιο, Ονοπώσιμο σταφύλι:** Συνιστώνται ψεκασμοί στα 10 εκ. της νέας βλάστησης, πριν την άνθηση, στην έναρξη της καρποδέσης στο κλείσιμο της σταφύλης και στην έναρξη του γαλακτώματος. Δόση: 100-200 κ.εκ./100 λίτρα νερό. **Ακτινίδιο:** Συνιστώνται ψεκασμοί λίγο πριν την άνθηση, στην έναρξη της καρποδέσης και 3 εβδομάδες μετά την πλήρη άνθηση. Δόση: 100-200 κ.εκ./100 λίτρα νερό. **Ελιά:** Συνιστώνται ψεκασμοί στη νέα βλάστηση, στην έναρξη της ανθοφορίας, στην καρποδέση και στην σκλήρυνση του πυρήνα. Δόση: 100-200 κ.εκ./100 λίτρα νερό. **Ακρόδρυς (Αμυγδαλιά, Φυσικά, Φουντουκιά):** Συνιστώνται ψεκασμοί λίγο πριν την έναρξη της άνθησης και στην καρποδέση. Δόση: 100-200 κ.εκ./100 λίτρα νερό. **Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα (υπαίθρου):** Συνιστώνται ψεκασμοί στο στάδιο των 4-6 φύλλων, λίγο πριν την έναρξη της άνθησης, στην καρποδέση και 48 ώρες μετά από κάθε κόψιμο. Δόση: 100-200 κ.εκ./100 λίτρα νερό. **Λάχανο, Μπρόκολο, Κουνουπίδι, Μαρούτι:** Συνιστώνται ψεκασμοί 7 ημέρες μετά τη μεταφύτευση, στον σχηματισμό της κεφαλής και 14 ημέρες αργότερα. Δόση: 100-200 κ.εκ./100 λίτρα νερό. **Φράουλα:** Συνιστώνται ψεκασμοί στην μεταφύτευση, στην έναρξη της άνθησης και σε κάθε καρποδέση. Δόση: 100-200 κ.εκ./100 λίτρα νερό. **Πατάτα:** Συνιστώνται ψεκασμοί στο πλήρες φυτόωμα και κατά την έναρξη σχηματισμού των κονδύλων. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. **Καρπούζι, Πεπόνι, Αγγούρι, Κολοκύθη (υπαίθρου):** Συνιστώνται ψεκασμοί στην έναρξη της άνθησης, στην καρποδέση και στην ανάπτυξη του καρπού. Δόση: 100-200 κ.εκ./100 λίτρα νερό. **Φασόλι, Μπιζέλι:** Συνιστώνται ψεκασμοί όταν τα φυτά αποκτήσουν ύψος 10-15 εκ., στην αρχή και στο τέλος της άνθησης. Δόση: 100-200 κ.εκ./100 λίτρα νερό. **Κρεμμύδι, Καρότο:** Συνιστώνται ψεκασμοί όταν τα φυτά αποκτήσουν επαρκή φυλλική επιφάνεια. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. **Βαμβάκι:** Συνιστώνται 2 ψεκασμοί, ο πρώτος στο φυτόωμα και ο δεύτερος στα πρώτα χτένια. Δόση: 100-200 κ.εκ./100 λίτρα νερό. **Μηδική:** Συνιστάται ένας ψεκασμός μετά από κάθε μαχαίρι. Δόση: 100-200 κ.εκ./100 λίτρα νερό. **Στάρι (σκληρό, μαλακό), Κριθάρι:** Συνιστάται ένας ψεκασμός στο τέλος του αελαφώματος και πριν την εμφάνιση της σμυιάς. Δόση: 100-200 κ.εκ./100 λίτρα νερό. **Χλωστάπτης:** 100-200 κ.εκ./στρ. **Θερμοκηπιακές καλλιέργειες:** Βλέπε τις αντίστοιχες καλλιέργειες υπαίθρου για το χρόνο εφαρμογής. Δόση: 100-200 κ.εκ./100 λίτρα νερό. **Υδροπониση:** Εφαρμόζεται σε δόση 0,6-0,8 λίτρα/στρ. στα αντίστοιχα στάδια εφαρμογής των διαφυλλικών ψεκασμών. **Εμβάπτιση σπόρων:** 1-1,5 λίτρα/τόνο σπόρου.

“Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελματία χρήστη εφόσον ζητηθεί”

ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ./ΗΜ.ΠΑΡΑΓΩΓ./ΗΜ.ΛΗΞ:
Βλέπε επί της συσκευασίας