

Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμός φυλλώματος με καλή κάλυψη των φυτών.

Τρόπος παρασκευής φυεσκατικού υγρού:

Ανακινείτε καλά τη φιάλη πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του φυεσκατικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε τη συνιστώμενη ποσότητα σκευασμάτων στο φυεσκατικό δοχείο αναδευόμενος και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό, συσφραγίζοντας την ανώτερη κωνή όλη τη διάρκεια του φυεσκώματος.

Καθαρτικές φυεσκατικές μηχανημάτων:

Αδειάστε πλήρως το φυεσκατικό βύτιο. Ξεπλύνετε το βύτιο και όλα τα εξαρτήματα του φυεσκατικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυεσκατοστατικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά μπουκάλια (φιάλες και δοχεία) μαζί με τα καπάκια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρίψιμο ή σχάρισμα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, ενσωματώνονται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Πεδίο Εφαρμογής/Στάθους/Δόσεις σκευασμάτων / Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο.

Τομάτα (Α) (ανοσοποιητικό και επηρεάζει): Για Τομάτα Στήλη (*Boltyjs cinerea*). Με 200εκ.κ/στρ. σε 50-100* λίτρα φεσ. υγρού/στρ.

Φρούλα (Υ): Για Τομάτα Στήλη (*Boltyjs cinerea*). Με 200εκ.κ/στρ. σε 40-100* λίτρα φεσ. υγρού/στρ.

Φρούλα (Θ), **Τομάτα (Θ)**** και **Μελιτζάνα (Θ)**: Για Τομάτα Στήλη (*Boltyjs cinerea*). Με 200εκ.κ/στρ. σε 40-80 λίτρα φεσ. υγρού/στρ.

Πιπεριά (Θ): Για Τομάτα Στήλη (*Boltyjs cinerea*). Με 200εκ.κ/στρ. σε 50-80 λίτρα φεσ. υγρού/στρ.

Μαρούλι (Υ): Για Τομάτα Στήλη (*Boltyjs spp*) και Σκόληρωτιασά (Sclerotium spp.). Με 200εκ.κ/στρ. σε 50-100* λίτρα φεσ. υγρού/στρ.

Μαρούλι (Θ): Τομάτα Στήλη (*Boltyjs spp*) και Σκόληρωτιασά (Sclerotium spp.). Με 200εκ.κ/στρ. σε 50-80 λίτρα φεσ. υγρού/στρ.

Κρεμμύδι: Τομάτα Στήλη (*Boltyjs spp*) και Σκόληρωτιασά (Sclerotium spp.). Με 200εκ.κ/στρ. σε 40-100* λίτρα φεσ. υγρού/στρ.

Μηλοδαχία (Μηλιά, Αχλάδι): Φουζέκλαδου (*Venturia spp.*). Με 150εκ.κ/στρ. σε 40-100 λίτρα φεσ. υγρού/στρ.

Πυρηγνόκαρπα (Βερκοκιά, Ροδακινιά): Φασιόμηλη (ανθέων και κλάδων) (*Monilia spp.*). Με 200εκ.κ/στρ. σε 40-100 λίτρα φεσ. υγρού/στρ.

Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:

Αμπελι (ανοσοποιητικό και επηρεάζει): Εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας, μετά την άνθηση έως και την έναρξη ωρίμανσης καρπών. (ΒΣΧ 71-81)

Φρούλα (Θ), **Φρούλα (Υ)**: Εφαρμογές όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Ξεκινώντας από την αρχή της άνθησης έως και τη συγκομιδή (ΒΣΧ 60-89).

Τομάτα (Θ), **Μελιτζάνα (Θ)** και **Πιπεριά (Θ)**: Εφαρμογές όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Ξεκινώντας από την αρχή της άνθησης έως και την πλήρη ωρίμανση των καρπών (ΒΣΧ 60-89).

Μαρούλι (Υ), **Μαρούλι (Θ)** και **Κρεμμύδι**: Εφαρμογές όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Ξεκινώντας από την πρώτη στάδια ανάπτυξης του φυτού έως και τη συγκομιδή (ΒΣΧ 10-49).

Μηλοδαχία (Μηλιά, Αχλάδι): Εφαρμογές όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας, μετά την άνθηση. (ΒΣΧ 71).

Πυρηγνόκαρπα (Βερκοκιά, Ροδακινιά): Εφαρμογή στο στάδιο της ωρίμανσης των καρπών. (ΒΣΧ 81-85).

Μην, αριθμός εφαρμογών/ Καλλιεργ. Περίοδ. - Μεσοστάθμη εφαρμογών:

Αμπελι (ανοσοποιητικό και επηρεάζει), **Πυρηγνόκαρπα (Βερκοκιά, Ροδακινιά)**: 1, **Φρούλα (Υ)**, **Τομάτα (Θ)**, **Μελιτζάνα (Θ)**, **Πιπεριά (Θ)**, **Μαρούλι (Υ)** και **Μαρούλι (Θ)**, **Κρεμμύδι**: 2/10 - 12, **Μηλοδαχία (Μηλιά, Αχλάδι)**: 3/7.

Παρατηρήσεις:

* Ο μέγιστος φυεσκατικός υγρού να μην ξεπερνά τα 80 λίτρα/στρ. στην περίπτωση χειρόκινητης εφαρμογής στις καλλιέργειες της φρούλας, μαρουλιού και κρεμμυδιού για την προστασία του χρήστη.

** Μόνο για νιπτή καταπόλυση.

Ειδικές συνθήκες γεωργικής, φυτοαγίας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκευασμό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκαταστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας

Το σκευασμό περιέχει τη δραστική ουσία pyrimethanil η οποία ανήκει στην ομάδα 9 κατά FRAC.

Συνιστάται η εναλλαγή με μυκητοκτόμα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

Όταν γίνεται έως και τρεις (3) εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο, μόνο μία (1) εφαρμογή μπορεί να γίνει με προϊόντα που περιέχουν δραστικές ουσίες της ομάδας 9 κατά FRAC.

Όταν γίνεται τέσσερις (4) έως εφ (5) εφαρμογές για αντιμετώπιση του βοτρώτη ανά καλλιεργία και καλλιεργητική περίοδο, μέχρι δύο (2) εφαρμογές μπορούν να γίνουν με προϊόντα που περιέχουν δραστικές ουσίες της ομάδας 9 κατά FRAC.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιεργία στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκευασμό:

1. Να μην εισέρχεται στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το φυεσκατικό υγρό από τα φύλλα.

2. Να μην εισέρχεται στην καλλιεργία του αμπελιού έως ότου παρελθεί διάστημα 3 (τρών) ημερών από την εφαρμογή.

3. Να μην εισέρχεται στην καλλιεργία του μαρουλιού (βερκοκινήτου) έως ότου παρελθεί διάστημα 7 (επτά) ημερών από την εφαρμογή.

4. Να μην εισέρχεται στις καλλιέργειες βερκοκινήτου, φρούλας, τομάτας, μελιτζάνας, πιπεριάς έως ότου παρελθεί διάστημα 3 (τρών) ημερών από την εφαρμογή.

5. Να μην εισέρχεται στις καλλιέργειες μηλοδαχιάς και πυρηγνόκαρπων έως ότου παρελθεί διάστημα 1 (μίας) ημέρας από την εφαρμογή.

Σταθικά φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στα συνηθισμένα χρήστες και δόσεις εφαρμογής.



Μυκητοκτόνο, Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)



ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Εγγυημένη σύνθεση:

Δραστική ουσία: Pyrimethanil 40,00% β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 61,50 % β/β

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: 61007/27.01.2021

Τοπικά διασυστηματικό μυκητοκτόνο με διελασματική κίνηση. Εμφανίζει προληπτική και θεραπευτική δράση. Σε βροχικό επίπεδο, το pyrimethanil, παρεμποδίζει τη θρομβωτική της μεμβράνης και εκκρίσης υδρολυτικών ενζύμων από τα παθόγωνα, τα οποία είναι απαραίτητα για τη διαδικασία προσβολής των φυτών. Προορίζεται για την καταπολέμηση του βοτρώτη σε αμπελι, φρούλα, τομάτα, μελιτζάνα, πιπεριά, μαρούλι και κρεμμύδι, της σκληρωτιασικής σε μαρούλι και κρεμμύδι, του φουζέκλαδου σε μηλοδαχία και της μονιλίας σε πυρηγνόκαρπα.

UFI: C9HV-WMEY-830Q-359Y

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνια επιπτώσεις.
- Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
- Για να αποφευχθεί κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.



FARMA-CHEM SA

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

FARMA-CHEM SA

ΒΙΛΠΕ, ΣΙΔΩΟΥ - Γ ΖΩΝΗ - Τ.Θ.1026 - 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 569.630 έως 3 - FAX: 2310 797.047
info@galenika-gr - www.farmachem.gr

Κάτοχος της άδειας: **GALENIKA-FITOFARMACIJA d.o.o**

Tzaska cesta 515 - TJK, 1351 - Brezovica pri Ljubljani, Σλοβενία

Παρασκευαστής: **GALENIKA FITOFARMACIJA A.D.**

Batajnčki drum bb street,

11080 Beograd - Zemun, Σερβία.



GALENIKA - FITOFARMACIJA

Πρώτες βοήθειες – Αντιδοτο:

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα, ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

Σε περίπτωση επαφής με το μάτι: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως όλα τα λερωμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό/στόντου. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξεκαθαρίσετε.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777.

Δηλώσεις προφύλαξης:

- Φυλάσσεται κλειδωμένα. Μακριά από παιδιά.
- Αν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
- Μην τρώτε, πινείτε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Φοράτε ολοήμερη μάσκα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη/φύλαξη και την εφαρμογή.
- Σε περίπτωση επαναεσοδίου θα πρέπει να φοράτε γάντια, μακρι παντελόνι και ποικωμάσιο με μακριά μανίκα. Για την προστασία των κατοίκων και των περιόχων να χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του φυεσκατικού νερούς κατά 50%.

Για τις καλλιέργειες θερμοκηπίου, οι εργάσιες θα πρέπει να φορούν ολοήμερη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την εφαρμογή.

• Διάρθρωση παρεμφερών/παρόμοια σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

• Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Μη μίξη τσίλετες τον εξοπλισμό εφαρμογής κατά σε επικοινωνία ύδατα/Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των αποστημάτων αποχέτευσης από τις λιβάδικιες επιφάνειες και τους όρυκτους).

• Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να εφαρμόζεται σε τεχνητά αποστραγγιζόμενα εδάφη για την καλλιέργεια του μαρουλιού και της φηλονιασικής καλλιέργειας κρεμμυδιού.

• Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε από τα επικοινωνία ύδατα:

- Μία φυτική ζώνη ανόσχεσης 10 μέτρων στην καλλιέργεια της φρούλας υπαθρού ή θερμοκηπίου μη μόνιμης κατασκευής.
- Μία φυτική ζώνη ανόσχεσης 20 μέτρων στην καλλιέργεια του μαρουλιού υπαθρού ή θερμοκηπίου μη μόνιμης κατασκευής.
- Μία φυτική ζώνη ανόσχεσης 10 μέτρων για μία εφαρμογή ή 10 μέτρων για δύο εφαρμογές στην καλλιέργεια της τομάτας, της μελιτζάνας και της πιπεριάς θερμοκηπίου μη μόνιμης κατασκευής.
- Μία φυτική ζώνη ανόσχεσης 20 μέτρων στην καλλιέργεια του κρεμμυδιού.
- Μία αμείκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων ή μία αμείκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 50% στην καλλιέργεια του αμπελιού.
- Μία αμείκαστη ζώνη προστασίας 15 μέτρων συμπληρωματικώς φυτικής ζώνης ανόσχεσης 10 μέτρων στα πυρηγνόκαρπα.
- Μία αμείκαστη ζώνη προστασίας 15 μέτρων ή 5 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 75% για μία εφαρμογή στα μηλοδαχία.

• Μία φυτική ζώνη ανόσχεσης 10 μέτρων για πολλαπλές εφαρμογές στα μηλοδαχία.

• Μην εφαρμόζεται κατά την ανθεσμία. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Μην το χρησιμοποιείτε όταν υπάρχουν ανθεσμία ζώων ή απομικτώνετε τα ζώα πριν την ανθεσμία τους.

Τελευταία επίβλεψη πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις: Αμπελι (επηρεάζει) και ανοσοποιητικό: 21 ημέρες. Φρούλα (Υ+Θ), Τομάτα (Θ), Μελιτζάνα, Πιπεριά (Θ): 3 ημέρες. Μαρούλι (Υ+Θ), Ροδακινιά, Βερκοκιά: 7 ημέρες. Κρεμμύδι: 14 ημέρες. Μηλιά, Αχλάδι: 56 ημέρες.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευασματος:

Το σκευασμό παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερημιαία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται στην αρχική του κλάση συσκευασία, σε θερμοκρασία από καικά αερίθμους ημερών, προστατευμένο από το άμεσο ηλιακό φως.

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελματία χρήστη εφόσον ζητηθεί

ΑΡ. ΠΑΡΤ/ΗΜ. ΠΑΡΑΓ./ΗΜ ΑΛΕΣ.: Βλέπε επί της συσκευασίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

11