

FARMA-CHEM SA

www.farmachem.gr



Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

Buzin
Metribuzin 70 % β/β

Buzin
Metribuzin 70 % β/β
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

Τρίτος εφαρμογής: Ομοιόμορφος φεκασμός του εδάφους ή του φυλλώματος με 20-40 λίτρα νερό στο στρέμμα. Το έδαφος πρέπει να είναι υγρό και ψλοχωματισμένο. Εφαρμόζεται προφυτωτικά, το αντομότερο δυνατόν, μετά τη φύτευση και πριν να φτιάχνονται τα ζάνια και τα καλλιέργεια.

Τρίτος παρασκευής φεκαστικού υγρού/διαιρέματος εφαρμογής: Γεμίστε το δοχείο του φεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Διαλύστε την απαγόρευτη ποσότητα οκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο φεκαστικό δοχείο αναθένοντας. Συμπλήρωστε στη συνέχεια με το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευτη. Μην αφήνετε το έτοιμο μήγα στον φεκαστηρά, εφαρμόστε το φέμαστα.

Καθαρισμός φεκαστικών υπαντομάτων: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως το φεκαστικό βυτό. Ξεπλύνετε σχλοστικά το βυτό και όλα τα μέρη του φεκαστικού απομακρύνοντας όλα τα ζήνη του οκευάσματος 2-3 φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόστρηση του φυτοπροστετικού προϊόντος και της αυσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας μαζί με τα κουτιά, αφού κατατραφούν προηγουμένως με σκόπιμο για τη διασφάλιση της μη περιεκτέων χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνάδυστακότητα: -

Πεδίο Εφαρμογής/Στόχος/Δόσεις οκευάσματος/Τρίτος και χρόνος εφαρμογής/Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιέργητη περίοδο.

Πατάτα: Μία εφαρμογή ανά καλλιέργητη περίοδο για την καταπολέμηση επιφύλων πλατύφύλων και αγριωτών ζάνιων. α). Προφυτωτικά: από τη φύτευση μέχρι 3-4 μήνες, πριν από το φύτρωμα της καλλιέργειας (ΒΒCH 00-07). Δόση: 40 γραμ./στρέμμα. Όγκος φεκαστικού υγρού: 20-40 λίτρα/στρέμμα 8). Μεταφυτωτικά: από την εμφάνιση των νεαρών βλαστών έως ότου τα φυτά να έχουν ύψος 5-10 εκ. (ΒΒCH 09-20). Δόση: 30 γραμ./στρέμμα.

Όγκος φεκαστικού υγρού: 20-40 λίτρα/στρέμμα.

Παρατηρήσεις:

1. Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα κατά την εφαρμογή, προκειμένου να αποφευγθεί η διασπορά του οκευάσματος σε ευαίσθητες παρακαμένες καλλιέργειες. Μην φεύγετε σταν φυσάει.

2. Η αποτελεσματικότητα του μπορεί να μειώθει σε περίπτωση έλλειψης υγρασίας στο έδαφος ή σε περίπτωση που δε σημειώνεται βροχή μετά από την εφαρμογή.

3. Η εφαρμογή του οκευάσματος αυστητά σε ποικιλές πατάτας που δεν είναι ευαίσθητες στο Metribuzin: Spunta, Hermes, Solist, Veronique, Monnalis, Lusa, Marabell, Agatha, Fontane, Delicatesse, Natasia.

*Καταπολεμόμενα ζάνια:

Προφυτωτική εφαρμογή:

Πολύ ευαίσθητα: Σκαρολόχανο (*Mercurialis annua*)

Ευαίσθητα: Βλήτο (*Amaranthus hybridus*),
Λαζαρινά (*Chenopodium album*),
Μουρίτσα (*Echinochloa crus-galli*),
Πολυκόπιτο (*Polygonum sp*)

Μετριώς ευαίσθητα: Αγριοντομάτια ή Στύφνος (*Solanum nigrum*),
Βλήτο (*Amaranthus hybridus*)

ΑΡ. ΠΑΡΤ./ΗΜ. ΠΑΡΑΓ./ΗΜ. ΛΗΞ.: βλέπε επί της συσκευασίας

202104

Καθαρό Βάρος: 500 γραμμ.

Metribuzin 70 % β/β

Buzin
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

Μεταφυτωτική εφαρμογή:
Πολύ ευαίσθητα: Σκαρολόχανο (*Mercurialis annua*)

Ευαίσθητα: Λαζαρινά (*Chenopodium album*),
Μουρίτσα (*Echinochloa crus-galli*),
Πολυκόπιτο (*Polygonum sp*)

Μετριώς ευαίσθητα: Αγριοντομάτια ή Στύφνος (*Solanum nigrum*),
Βλήτο (*Amaranthus hybridus*)

Ειδικές αυθικής γεωργικές, φυτούλισες ή περιβανταλογικές υπό τις οποίες το οκευάσμα μπορεί να χρηματοποιείται ή να αποκλείστε: Διαγείριση ανθεκτικότητας: Για την απορρίπτηση ανθεκτικότητας να γίνει ενδαλήγηση επειβάσους με χανιοκότων διαφορετικών χημικών ομάδων με διαφορετικούς τρόπους δράσης στα πλαίσια αμειμωτώρων και μεβόδων καλής γεωργικής πρακτικής.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και: - οποράς ή φύτευσης της προσπατεύμενης καλλιέργειας: Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, στην ίδια περίοδο μπορεί να καλλιεργηθούν, μετά από οργάνωμα του χωραφού, ψυχανθή και σιτηρά. - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το οκευάσμα: Όταν έχει στεγνώσει το φεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

Στογεία φυτοτεξικότητας, ευαίσθησης ποικιλών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τη προϊόντα τους: Δεν παρουσιάζει φυτοτεξικότητα στην πατάτα στις συνοπτικές δοσές και τον τρόπο εφαρμογής. Μπορεί να παραπτηθούν παραδόμα συμπλήρωματα κατρινάματος ή λεύκανη στα φύλλα, τα οποία δεν έχουν καμιά επίπτωση στην αντιπάθη ή στην απόδοση της καλλιέργειας, σε ποικιλές όπως Draga, Jaera, Viva, Lusa, Agría και Delicatesse.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά σταν πρόστιμο για μετασυλλεκτικές χρήσεις: Πατάτα: 60 μήνες. Συνήθειες αποθήκευσης, χρήσης σταθερότητα του οκευάσματος: Να αποθηκεύεται καλά κλειστά στην αρχή του οκευάσματος, σε χώρο ήρηρ, δροσερό και καλά αεριζόμενο, προστατευμένο από υγρασία και παγετό. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

Metribuzin 70 % β/β
Buzin
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: 70333 / 17.05.2019

Αριθμ. πρωτ.: 5094/110566

Εγγυημένη σύνθεση: Metribuzin 70 % β/β, Βοηθητικές ουσίες 27,46 % β/β.

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων και αγρωτώδων ζιζανίων σε πατάτα, προφυτωτικά ή νωρίς μεταφυτωτικά.

Δρα παρεμποδίζοντας τη λειτουργία του φωτοσυστήματος II της φωτοσύνθεσης.
Απορροφάται από τις ρίζες και το φύλλωμα των ζιζανίων και μεταφέρεται προς το πάνω μέρος του φυτού.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Πολύ τοξικό για τους μόρδιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Κέποχος της άσεως:

Sharda Cropchem España S.L.
Edificio Abalayas Business Center,
Carretera Condomina nº 3, 12th Floor, 30006 Murcia,
Ισπανία, Mrs Elena Nieto, Tel.: +34646233985
E-mail: e.nieto@shardaintl.com - regn@shardaintl.com

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
SHARDA BALKAN ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ Μον. Ε.Π.Ε.
Μοναστηρίου 9, Τ.Κ. 54627, Θεσσαλονίκη,
Τηλ.: 6946144719



FARMA-CHEM SA

ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ - Γ. ΖΩΝΗ - Τ.Θ.1026 - 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ: 2310 569.630 ή 3 - FAX: 2310 797.047
info@farmachem.gr - www.farmachem.gr



Διανομέας:

FARMA-CHEM SA

Καθαρό Βάρος: 500 γραμ.



5 206284 660007

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:
• Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβολεύετε / Επικεφθείτε γιατρό.
• Σε περίπτωση εποφής με το δέρμα: Ξεπλύνετε με άρδινο νερό και σαπούνι.
• Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε το παθόντα στον καθαρό αέρα. Καλέστε γιατρό εάν χρειαστεί.
• Σε περίπτωση εποφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάμωσα με άρδινο νερό και ζήτηστε ιατρική συμβούλη.
• Σε περίπτωση καρπόποιης: Καλέστε γιατρό. Μην προκαλέσετε εμέτο χωρίς ιατρική συμβούλη. Να μην χρηγοπηθεί πίπτωση από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθητικές του.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπατωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

Δηλώσεις προφύλαξης:
• Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
• Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρηματοποιείτε αυτό το προϊόν.
Φοράτε κατόλιπλα γάντια κατά την ανάμετρή του. Φοράτε γάντια, ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και μάτιας κατά την εφαρμογή.