

Δηλώσεις προφύλαξης: P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. P210: Μακριά από θερμότητα/απνής/πυρκαγιά/φλόγες/θερμές επιφάνειες. – Μην καπνίζετε. P280: Μην αντανέιντε εκνευρωμένα. P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μύια σποικίης προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Φοράτε γάντια και προστατευτική ενδυμασία (μακρυμάνικη μπλούζα, μακρύ παντελόνι και παπούτσια) κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή. Σε περίπτωση επανεισόδου στο χώρο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό να φοράτε κατάλληλα γάντια και προστατευτική ενδυμασία (μακρυμάνικη μπλούζα, μακρύ παντελόνι και παπούτσια). P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιεχτή σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: Μη ρυτταίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. SPe3: Για να προστατέψετε τους **υδροβίους οργανισμούς** να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 50 μέτρων, συμπεριλαμβανομένης μιας φυτικής ζώνης ανάσχεσης 20 μέτρων, από τα επιφανειακά ύδατα σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 95%. SPe3: Για να προστατέψετε τα **αρθρόποδα μη στόχους** να χρησιμοποιήσετε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 95% ή να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη ασφαλείας 10 μέτρων από τη μη γεωργική γη σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% ή να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη ασφαλείας 5 μέτρων από τη μη γεωργική γη σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75%. SPe3: Για να προστατέψετε τα **φυτά μη στόχους** να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη ασφαλείας 10 μέτρων από τη μη γεωργική γη σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% ή να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη ασφαλείας 5 μέτρων από τη μη γεωργική γη σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75%.

EUH401: Για να αποφευχθεί κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες – Αντιδότης: P301+P310+P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε έμετο. P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. P333+P313: Εάν παρατηρήσει ερεθισμό του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. P362 + P364: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. P312: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό, αν αισθανθείτε αδιαθεσία. P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Στεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να επεξεργάζεστε. P337 + P313: Εάν δεν υποχωρήσει ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Αντιδότης: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Σε περίπτωση δηλητηρίασης ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία. Τηλ. Κέντρου Δηλητηρίασεων: 210 - 7793777.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται η εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης ή/και εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητική μέτρα).

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό ξεπλυστικό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλυστικού ρχνούνται στο ξεπλυστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να αναποθεθούν σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης: Στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του, καλά κλειστό, σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, σε θερμοκρασίες άνω των 0°C, μακριά από άμεση έκθεση στο ηλιακό φως, παραμένει σταθερό για 2 (δύο) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

Συνδυαστικότητα: Να μη συνδυάζετε με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Εφαρμόζεται μόνο του.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του σκευάσματος ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα στην θερμοθεσία φυλική επιφάνεια.

CARTEA 24 EC

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΩΣΤΩΔΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ, ΜΕΤΑΦΥΤΡΟΤΙΚΑ

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
Oxyfluorfen

Εγγυημένη σύνθεση: Oxyfluorfen 24% β/ο. Βοηθητικές ουσίες 75,97% β/β

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας: 70.295 / 09-10-2018



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Δηλώσεις επικινδυνότητας: H226: Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H332: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. H351: Ύποψη για πρόκληση καρκίνου. H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα. H410: Πολύ τοξικό για τους υδροβίους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ ΑΡ.
ΠΑΡΤΙΑΣ ΒΑΛΕΤΕ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



AFRASA

ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ:

1 ΛΙΤΡΟ

Κάτοχος της έγκρισης: INDUSTRIAS AFRASA S.A. Pol. Ind. Fuente del Jarro, Ciudad de Sevilla, 53 E46988 - Paterna, Valencia, Ισπανία - Τηλ.: (+34)961321700 - www.afrasa.es

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων και αγρυστωδών ζιζανίων, μεταφυτρικά. Εφαρμόζεται με ψεκασμό κοντά στο έδαφος, σε λιπρές που καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού, από το φθινόπωρο έως τις αρχές της άνοιξης.

ΠΕΛΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΔΟΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέπ φρουτ, Κίτρο): δόση 60 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 40 λίτρα ψεκ. υγρού / στρέμμα. Ψεκασιμό κοντά στο έδαφος, σε λιπρές που καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού, από το φθινόπωρο έως τις αρχές της άνοιξης. Συνιστάται η εφαρμογή αρχές της Άνοιξης σε ποικιλίες μανταρινιάς και σε πριμίες ποικιλίες πορτοκαλιάς που καλύπτουν το φθινόπωρο σε άμιες ποικιλίες μανταρινιάς και πορτοκαλιάς (Navel), Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά, Κιδομιά, Μουσουλιά, Αχλαδομήλα), Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηλιά, Κορομηλιά, Κερασιά, Βυσσινιά), Λωτός* (Χρήση ήσσονος σημασίας), Ακρόδουρα (Αμυγδαλιά, Φουντουκιά*, Φιστικιά*, Καστανιά*, Καρυδιά*, Κουκουναριά*) (Χρήση ήσσονος σημασίας): δόση 60 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 40 λίτρα ψεκ. υγρού / στρέμμα. Ψεκασιμό κοντά στο έδαφος σε λιπρές που καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού, από το φθινόπωρο έως τις αρχές της Άνοιξης, κατά το Αθήρανο. Αμπέλι (Ονοπιοσίσημα, Επιτραπέζια): δόση 60 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 40 λίτρα ψεκ. υγρού / στρέμμα. Ψεκασιμό κοντά στο έδαφος σε λιπρές που καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού, το φθινόπωρο. Ελιές: δόση 60 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 40 λίτρα ψεκ. υγρού / στρέμμα. Ψεκασιμό κοντά στο έδαφος σε λιπρές που καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού, το φθινόπωρο – Χειμώνα κατά την διάρκεια ωρίμανσης των καρπών με παρουσία ή μη ελίων στο έδαφος. Στόχοι: Ετήσια πλατύφυλλα και αγρυστωδή ζιζάνια.

Παρατηρήσεις: 1. Εφαρμόζεται με ψεκασμό κοντά στο έδαφος, σε λιπρές που καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού. 2. Η συνολική ποσότητα δ.ο.έτος δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 15 γραμ. δ.ο./στρ. 3. Τα ζιζάνια είναι ευαίσθητα από το στάδιο του σπόρου μέχρι τα 2-4 φύλλα. 4. Η εφαρμογή να γίνεται σε ηλιόθετο έδαφος. 5. Αποφύγετε τη χρήση του σε οργανικά εδάφη. 6. Αποφύγετε τον ψεκασμό όταν τα φυτά υπόφερον από στρες λόγω ξηρασίας, όταν αναμένεται βροχή και όταν φυσάει. 7. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ζημιών από διασπορά του ψεκαστικού νέφους σε παρακείμενες ευαίσθητες καλλιέργειες. 8. Καταπολιούμενα ζιζάνια Ευαίσθητα ζιζάνια (>85%): Αντράκλα (*Portulaca oleracea*), Λουβουδιά (*Chenopodium album*), Πεπιλοκάδα (*Convolvulus arvensis*), (*Diploclis urticoides*), Αγριοβρώμη (*Avena sterilis*) Μίτρια ευαίσθητα ζιζάνια (70-85%): Τριβόλι (*Trifolium terrestris*), Οξαλίδα (*Oxalis acetosella*), Καληντούλα (*Calendula arvensis*).

*Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδοχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες Λωτός, Αμυγδαλιά, Φουντουκιάς, Φιστικιάς, Καστανιάς, Καρυδιάς και Κουκουναριάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1 εφαρμογή.

Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμόζεται με ψεκασμό κοντά στο έδαφος, σε λιπρές που καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού, από το φθινόπωρο έως τις αρχές της άνοιξης, με μικτό τύπου σκούπας και πίεση 2 - 3 Ατμ.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινείστε καλά τη φιάλη ή το δοχείο, πριν τη χρήση. Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση με νερό και προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση. Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται υπό συνεχή ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μηχανήματος με καθαρό νερό. Επαναλάβετε δύο φορές.

Τελειάση επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέπ φρουτ, Κίτρο), Ελιά (παρουσία ελίων στο έδαφος): 21 ημέρες. Ελιά (χωρίς παρουσία ελίων στο έδαφος): 7 ημέρες, Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά, Κιδομιά, Μουσουλιά, Αχλαδομήλα), Λωτός, Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηλιά, Κορομηλιά, Κερασιά, Βυσσινιά), Ακρόδουρα (Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, Φιστικιά, Καστανιά, Καρυδιά, Κουκουναριά), Αμπέλι (Ονοπιοσίσημα, Επιτραπέζια): 180 ημέρες.

Φυτοτοξικότητα: Σε ευαίσθητες καλλιέργειες, μπορεί να προκληθεί φυτοτοξικότητα από την διασπορά σταγονιδίων του ψεκαστικού υγρού.

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά - Διανομέας: ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ, ΒΙ.Π.Ε. Θ. Σίνδος, 570 22 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 69830-3, Fax: 2310 787047 E-mail: info@farmchem.gr - www.farmchem.gr



FARMIA - CHEM SA

