

110x105mm

Cassiopeia® Star 20 WG

Pyraclostrobin (πυρακλόστρομπιν)
Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι (WG)

Εγγυημένη σύνθεση: pyraclostrobin 20% β/β (ΣΤρομπιλουρίνες, ομάδα μεθοξυκαρβαμικά)
Βοηθητικές ουσίες 79.49 % β/β

Μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση κατά των ασθενειών που προσβάλλουν την ελιά, την πορτοκαλιά, την μανταρινιά, τα πυρηνόκαρπα και το λωτό.

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Αρ. Άδειας: 60845/18-3-2019

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

- Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες.
- Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
- Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια.
- Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Ο περιέκτης να διατηρείται ερμητικά κλειστός.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
- Ξεπλύνετε το στόμα.
- Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
- Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Περιεχόμενο: 1 κιλό

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ: FARMA - CHEM SA
ΔΙΕΥΘ. ΓΡΑΦ. & ΕΡΓΟΣΤ.: ΒΙ.ΠΕ.Θ Γ΄ ΖΩΝΗ
ΤΗΛ.: 2310 569 630 έως 33 FAX: 2310 797 047
Τ.Θ. 1026 ΒΙ.ΠΕ.Θ. - Τ.Κ. 570 22 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
www.farmachem.gr, e-mail: info@farmachem.gr

FARMA - CHEM SA

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ:
BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.,
Παραδείσου 2 & Κηφισός,
151 25 Μαρούσι,
τηλ.: 210-6860130,
www.basf-agro.gr

© Σήμα κατατεθέν BASF

Αρ. Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας.
Ημερομηνία παρασκευής: Ως άνω μέρος συσκευασίας.
Ημερομηνία λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας.

110x105mm

Cassiopeia® Star 20 WG

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος, ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Παράγει γλυκοσφαιρίνη που ανήκει στη χημική ομάδα των μεθοξυκαρβαμικών και παρεμποδίζει την κυτταρική αναπνοή στη θέση Qo του συμπλοκού III της αναπνευστικής αλυσίδας, εμφανίζοντας απολαστική και διελαστική κίνηση.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
ΕΛΙΑ (εμπράτευση): Για την καταπολέμηση του **Κυκλοκονίου** (*Spilocaea oleaginea*) και του **Γλοιοσπορίου** (*Colletotrichum sp.*) κάνετε 1-2 αναδύσεις εφαρμογής μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν το 10% του τελικού τους μεγέθους και 1 εβδομαδιαία εφαρμογή μετά τη συγκομιδή με δόση 50 γραμ. σκευάσματος/στρέμμα και όγκο ψεκαστικού υγρού 100-150 λίτρα/στρέμμα (33.3-50 γραμ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 3 με μεσοδιάστημα εφαρμογών 21 ημέρες.
ΕΛΙΑ (ελασποίηση): Για την καταπολέμηση του **Κυκλοκονίου** (*Spilocaea oleaginea*) και του **Γλοιοσπορίου** (*Colletotrichum sp.*) κάνετε 1-2 αναδύσεις εφαρμογής μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν το 10% του τελικού τους μεγέθους με δόση 50 γραμ. σκευάσματος/στρέμμα και όγκο ψεκαστικού υγρού 100-150 λίτρα/στρέμμα (33.3-50 γραμ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 3 με μεσοδιάστημα εφαρμογών 21 ημέρες.
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ, ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ: Για την καταπολέμηση της **Αλτερνάριας** (*Alternaria sp.*) κάνετε 4 εφαρμογές από την αρχή της έντονης βλάστησης μέχρι και την αρχή της ωρίμανσης των καρπών με δόση 112.5 γραμ. σκευάσματος/στρέμμα και όγκο ψεκαστικού υγρού 150-300 λίτρα/στρέμμα (37.5-75 γραμ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 4 με μεσοδιάστημα εφαρμογών 14 ημέρες.
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Ροδάκινα, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Κερασιά, Δαμασκηλιά) (παθόντα ήσσονος σημασίας): Για την καταπολέμηση της Κλαδοσπορίωσης (*Cladosporium carpophilum*) κάνετε 2 εφαρμογές από την έναρξη ανάπτυξης των καρπών έως την αρχή της ωρίμανσης των καρπών με δόση 25 γραμ. σκευάσματος/στρέμμα και όγκο ψεκαστικού υγρού 100-150 λίτρα/στρέμμα (16.5-25 γραμ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 2 με μεσοδιάστημα εφαρμογών 14 ημέρες.
ΛΩΤΟΣ (χρήση ήσσονος σημασίας): Για την καταπολέμηση της Μυκοσφαίριας (*Mycosphaella nanae*) κάνετε 2 εφαρμογές από την εμφάνιση των φυλλών έως το τέλος της άνθησης με δόση 50 γραμ. σκευάσματος/στρέμμα και όγκο ψεκαστικού υγρού 100-200 λίτρα/στρέμμα (25-50 γραμ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 2 με μεσοδιάστημα εφαρμογών 15 ημέρες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1) ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μεγάλη δόση στο εκάστοτε να εφαρμόζεται με το χαμηλό όγκο ψεκαστικού υγρού και αντίστροφα. Πρέπει πάντα να τηρείτε και να μην υπερβαίνετε τη μέγιστη δόση ανά στρέμμα.
2) Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιεργειές Ροδάκινας, Νεκταρινιάς, Βερικοκιάς, Κερασιάς, Δαμασκηλιάς και Λωτού από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις σε παθόντα μακρής σημασίας, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστάμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης ανθεκτικότητας, τηρείτε τις οδηγίες χρήσης (προτεινόμενη δόση, αριθμός εφαρμογών, μεθοδικότητα και περιορισμοί κατά την εφαρμογή) και εναλλάσσετε με σκευάσματα με διαφορετικό τρόπο δράσης ή σκευάσματα που περιέχουν διαφορετικές ουσίες με διαφορετικό τρόπο δράσης. Εφαρμόστε το Cassiopeia® Star 20 WG προληπτικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενών και περιορίστε τις θεραπευτικές εφαρμογές.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη καλλιέργεια πριν στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τη φυλλώδη επιφάνεια.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:
Ελιά (εμπράτευση, ελασποίηση): 105 ημέρες
Πορτοκαλιά, Μανταρινιά: 7 ημέρες
Λωτός: 100 ημέρες
Ροδάκινα, Νεκταρινιά, Κερασιά, Βερικοκιά, Δαμασκηλιά: 14 ημέρες

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:
Γεμίζουμε το βυτίο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος υπό συνεχή ανάδευση. Συμπληρώνουμε το βυτίο με νερό και συνεχίζουμε την ανάδευση σε όλη τη διάρκεια του ψεκασμού.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίζετε τον εξοπλισμό του ψεκασμού καλά. Στραγγίζετε τον ψεκαστήρα στο σύνολό του και ξεπλύνετε τη δεξαμενή, τις σωληνώσεις και τα ακροφύσια τρεις φορές με καθαρό νερό μέχρι ο αερός και όλα τα ίχνη του προϊόντος να απομακρυνθούν.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΧΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Προϊόν: Συσφίγγεται καύση του για δύο (2) δευτερόλεπτα σε ειδικούς για το λόγο αυτό καυστήρες και σε θερμοκρασία 1100° C. **Συσκευασίες:** Οι συσκευασίες ξεπλένονται με τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια τα υλικά συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγούμενες με τρίψιμα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, αποθηκευόμενο στην αρχική του κλειστή συσκευασία, μακριά από τρόφιμα και ζωοτροφές, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο.

Μη μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιδοστρωτές επιφάνειες και τους δρόμους).

Για να προστατίψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια σφικαστή (ζώνη προστασίας 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για την καλλιέργεια της ελιάς και του λωτού και 15 μέτρων για την καλλιέργεια της πορτοκαλιάς, της μανταρινιάς και των πυρηνόκαρπων.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμειξη/φόρτωση και κατά την συντήρηση του ψεκαστικού μηχανήματος. Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Σε περίπτωση επανεξόδου στην καλλιέργεια οι εργατές θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: Σε περίπτωση που ο ασθενής έχει χάσει τις αισθήσεις του, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα και κυρίστε τον σε σταθερή πλάγια θέση. Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Ξεπλύνετε το στόμα. Πιείτε 200-300ml νερό. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Διατηρήστε τον παθόντα ήρεμο και μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε καλά με άφθονο νερό και σαπούνι.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Πλύνετε τα μάτια με άφθονο τρεχούμενο νερό για 15 λεπτά, κρατώντας τα θύραρα ανοικτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων: 210-7793777

P.Red032c P.320c
Cyan Black

Black