



140 x 140

Προφυσιλάξεις: P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. Την τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. P501: Διάβεστη του περιεχομένου/περιέκτη συμφέμενα με την εθνική νομοδεσία.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίτοπο: P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, θα έχετε μαζί σας τον περίεκτη του προϊόντος ή την επικείμενη συμβουλή. Σε περίπτωση κατάστασης: Ζητήστε αμείως ιατρική συμβουλή και δέλτετε αυτό το δοχείο ή την επικέπανη. Μην χρηστείτε τόπια από το στόμα σε άτομα που έχουν χαρεῖ τις αισθησίεις τους. Σε περίπτωση επαγρής με τα ματιά: πλύνετε αμείως με αφρόνιο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση εισπνοής: μεταφέρετε τον παθόντα στο καθόρι αέρα. Σε περίπτωση επαγρής με το δέρμα: πλύνετε αμείως με αφρόνιο νερό και σαπούνι. Αυριστήστε τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα. **Αντίτοπο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίτοπο. Ακολουθείτε συμπληκτική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηρίασης: 210-7739777.

Sр1: Μην ρυπαντείτε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή θίνεται τριπλά (3) ξέλυπνα τα νερά του ξεπλύπνουν στο φεαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφύον καταστραφούν προφοργώμενα με σκόπιο να τη διασφαλίσει ότι μη περιπέτει χρήσης, εναποθίστεται σε σημεία υπόλογης για ανακύλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Χρονική απόδειξη της σκεύασμάτος- Συνθήκες αποθήκευσης:

Να αποθηκεύεται στην αριγκή του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, έρη και καλά αεριζόμενο. Στα συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναρρόφηση ημερομηνία παρασκευής.

Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με άλλα σκεύασματα. Δεν συνδυάζεται με διαυγελμάτικα λιπαράματα με βάση το άζωτο. Σε περίπτωση που προηγηθεί εφαρμογή με παραφινικό λάδι, να εφαρμοστεί το ALFIL® 80 WG αφού περάσει μια εβδομάδα από την εφαρμογή.

Φυτοτοξικότητα: Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συστοιχίες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής φεαστικού μυρού: Γειτάει το δοχείο του φεαστικού μηχανήματος μέχι τη μέση με νερό. Προσθέτετε την αποτούσενη ποσότητα σκεύασμάτος στο φεαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέτετε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την αναδεύση.


Καθαρισμός ψεκαστήρα: Δεξιάστε τοπείστε το φεαστικό βυτίο. Βεβαίωσθε τότε ότι έχουν απομειναθεί όλα τα ίχνη του σκεύασμάτος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα έσπατματα του φεαστικού, τρεις (3) φορές με καθρέφτη νερού.

Τελευταίας επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Επειριδεοειδή, Μαρούλι: 15 ημέρες, Μηλιά, Αχλαδία, Κυδωνία, Αχλαδόμητα, Αμπέλι (ιονοποίησης και επιπράτησης): 28 ημέρες. Τομάτα, Αγγούρι, Κολοκύνθη / Κολοκυνθά, Πεπόνι, Καρπούζι: 3 ημέρες. Φρασόλια (ψεκασμός φυλλώματος): 14 ημέρες. Φρασόλια (εμβαπτιση ρίζωματος): - Αμυγδάλια, Φιστικά, Φουντουκά, Καρυδιά, Καστανιά: Καλοπετείτε από το χρόνο εφαρμογής (μερική την πλήρη ανθρόσια).



ΗΜΕΡΟΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
ΑΓΡΙΩΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:
ΒΛΕΠΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΟΝΕΙΑ
ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΑΣ

Κάτοχος της έγκρισης: INDUSTRIAS AFRASA S.A. Pol. Ind. Fuente del Jarro, Ciudad de Sevilla, 53, E46988 – Paterna, Valencia, Ισπανία; THA.: 034 96 132 17 00; www.afrasa.es



ΕΝΑΙΟΡΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΜΟ ΚΟΚΚΟΙ (WG)

Fosetyl-al

Αρ. Εγκρισης Κυκλοφορίας: 60.336 / 21-09-2012

Εγγυητής σύνθεσης: Fosetyl-al 80% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 16,7% β/β

ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

H412: ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.

EUH401: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΗΣΤΗΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.



Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
ΦΑΡΜΑΧΙΝΗ ΑΒΕΕ,

ΒΙΠ.Ο. Σίνιδος, Θεσσαλονίκη
Τ.Ο. 1026-Τ.Κ. 570 22, Τηλ.: 2310 569630-3,
Fax: 2310 797047, E-mail: info@farmachem.gr

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Παρουσιάζει συμπληκτική και απολαμπτική κίνηση και δράση παρεμποδίζοντας την διάσπηση των οπωρών και επάγγειος την μηχανισμούς εμμάνωσης των φυτών.

Καλλιέργειες - Λασθανες - Δάσοες (ανά 100 λίτρα φεκ. υγρών) - Χρόνος εφαρμογής: Επειριδεοειδή (Πορτοκαλιά, Λεμονιές, Μανταρίνιες, Κλιμαντίνες, Γκρέιπ-φρουτ, Φράστα, Κίτρο, Περγαμόντο, Κούμκουατ, Νεραντζίδι): Για Φυτώφθρωμα δύοπτο 250 - 300 γρ. (250-360 γρ./στρ.) Όγκος ωγκ. υγρών 100-150 λίτρα/στρ. Πρώτος φεκασμός του Ιούλου και τρίτος Οκτώβριο-Νοέμβριο. Ακρόδρυα (Αμυγδαλά, Φιστικά, Φουντουκά, Καρυδιά, Καστανιά) - Χρήσης ήσσος σημασίας: Για Φυτώφθρωμα δύοπτο 250 - 300 γρ. (200-360 γρ./στρ.) Όγκος ωγκ. υγρών 80-120 λίτρα/στρ. Τρίτη φεκασμού μέχρι την πλήρη ανθήση, με ελάχιστο Μεσοδιάστημα εφαρμογών 3 μηνας.

Μηλιά, Άγλαδα: Για Φυτώφθρωμα λαμπού και ριζών δύοπτο 250-360 γρ. (200-360 γρ./στρ.) Όγκος ωγκ. υγρών 80-120 λίτρα/στρ. Πρώτος φεκασμός του Ιούλου και τρίτος Οκτώβριο. Σε περίπτωση του Απριλίου, ο δεύτερος του Ιούλου και ο τρίτος Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.

Αμπέλια (ιονοποίησμα και επιπράτηση): Για Περονόσπορο δύοπτο 250-300 γρ. (75-330 γρ./στρ.) Όγκος ωγκ. υγρών 10-11 λίτρα/στρ. Φεκασμός λίγο πριν την ανθήση και επαναλαμβάνεται κάθε 10-14 μηνές, όπου οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της αριθμούς.

Φρασόλια (Υ+Φ): Για Φυτώφθρωμα λαμπού και ριζών δύοπτο 250 γρ. (200-360 γρ./στρ.) Όγκος ωγκ. υγρών 10 λίτρα/στρ. Εμβαπτισμός της φυτεύσης δύοπτο 250 γρ. (250 γρ./στρ.) Όγκος ωγκ. υγρών 100 λίτρα/στρ. Προληπτικοί φεκασμοί έως την ανθήση.

Τομάτα (Υ+Φ): Περονόσπορος: δύοπτο 200-300 γρ. (200-300 γρ./στρ.) Όγκος ωγκ. υγρών 100 λίτρα/στρ. Προληπτικοί φεκασμοί ψυλλωμάτων.

Αγγούρι, Κολοκύνθη/Κολοκυθάκι (Υ+Φ): Περονόσπορος δύοπτο 200-300 γρ. (60-300 γρ./στρ.) Όγκος ωγκ. υγρών 80-100 λίτρα/στρ. Προληπτικοί φεκασμοί ψυλλωμάτων.

Πρόνι, Καρπούζι (Υ+Φ): Περονόσπορος δύοπτο 200-300 γρ. (160-300 γρ./στρ.) Όγκος ωγκ. υγρών 80-100 λίτρα/στρ. Προληπτικοί φεκασμοί ψυλλωμάτων.

Μαρούλι (Υ+Φ): Περονόσπορος δύοπτο 200-300 γρ. (100-300 γρ./στρ.) Όγκος ωγκ. υγρών 50-100 λίτρα/στρ. Προληπτικοί φεκασμοί ψυλλωμάτων.

Παραπτήσεις: 1. Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, να ακολουθούνται οι οδηγίες των Γεωργικών Προϊστορισμών. 2. Δεν είναι τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έγινε λίγες έλεγχος για ενδέχομενες αργητικές επιπτώσεις στα καλλιέργειες Αμυγδάλων, Φιστικά, Φουντουκά, Καρυδιά, Καστανιά και Αχλαδόμητα από τη χρήση του σκεύασμάτος. Για τις εν λόγω χρήσεις (χρήσης ήσσος σημασίας) το κάτοχος της άσεως δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοδιόκτητη από τη χρήση του σκεύασμάτος.

Μέγιστος ορθιμός εφαρμογών ανά καλλιέργητη περιόδο: Επειριδεοειδή, Μηλιά, Αχλαδία, Κυδωνία, Αχλαδόμητα, Αμπέλι (ιονοποίησης και επιπράτησης): 4 εφαρμογές με εμβαπτισμό φεκασμούν 10-14 μηνές, Φρασόλια (Υ+Φ): εμβαπτισμό ριζώματος πριν τη μεταφύτευση 1 εφαρμογή, 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα φεκασμού 8-10 μηνές, Αγγούρι, Κολοκύνθη/Κολοκυθάκι (Υ+Φ): 1-3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα φεκασμού 8-10 μηνές, Φιστικά, Κλιμαντίνες, Γκρέιπ-φρουτ, Φράστα, Κάρπαθος (Υ+Φ): 1-3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα φεκασμού 8-10 μηνές, Πεπόνι, Καρπούζι (Υ+Φ): 1-3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα φεκασμού 8-10 μηνές, Μαρούλι (Υ+Φ): 1-3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα φεκασμούν 10-14 μηνές

ET-202a-GR-Q05-R02



ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ:
100 ΓΡ