



FARMA-CHEM SA

ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ | Γ' ΖΩΝΗ | Τ.Θ.1026



570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ.: 2310 569.630 έως 33



FAX: 2310 797.047



info@farmachem.gr



www.farmachem.gr



ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

GEL FRUIT

ΠΡΟΪΟΝΤΑ GEL

Λίπασμα 18-11-59 + 2MgO + TE.

✓ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Εγγυημένη σύνθεση	
Ολικό άζωτο (N)	10.0% β/β ή 18.0% β/ο
Νιτρικό άζωτο (N-NO ₃)	5.80% β/β ή 10.40% β/ο
Ουρικό άζωτο (N-NH ₂)	5.80% β/β ή 10.40% β/ο
Φώσφορος (P ₂ O ₅), υδατοδιαλυτό	6.00% β/β ή 11.0% β/ο
Κάλιο (K ₂ O), υδατοδιαλυτό	32.70% β/β ή 59.0% β/ο
Μαγνήσιο (MgO), υδατοδιαλυτό	1.10% β/β ή 2,0% β/ο
Βόριο (B), υδατοδιαλυτό	0,010% β/β ή 0,018% β/ο
Χαλκός (Cu), χηλικός με EDTA, υδατοδιαλυτός	0,002% β/β ή 0,004% β/ο
Σίδηρος (Fe), χηλικός με EDTA, υδατοδιαλυτός	0,050% β/β ή 0,090% β/ο
Μαγγάνιο (Mn), χηλικό με EDTA, υδατοδιαλυτό	0,025% β/β ή 0,045% β/ο
Μολυβδαίνιο (Mo), υδατοδιαλυτό	0,002% β/β ή 0,004% β/ο
Ψευδάργυρος (Zn), χηλικός με EDTA, υδατοδιαλυτός	0,010% β/β ή 0,018% β/ο

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ

Προϊόν: LIMA EUROPE NV

ΛΙΠΑΣΜΑ Ε.Κ.

✓ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ:

Υδρολίπανση/Ψεκάσμος φυλλώματος

Εφαρμογή εδάφους:

Εφαρμόστε 0.5 - 1 κιλό/στρέμμα/εφαρμογή. Για συνεχές ριζοπότισμα η συνιστώμενη συγκέντρωση σε εντατική καλλιέργεια κυμαίνεται από 0,5 - 2 γρ./λίτρο (0,05 έως 0,2%). Η συνήθης σύσταση για τις περισσότερες καλλιέργειες είναι 1γρ. /λίτρο νερού.

Πατάτα: Εφαρμόστε 0.5 - 1 κιλό/στρέμμα στην αρχή της ωρίμανσης. Επαναλάβετε με την ίδια δοσολογία 1 - 2 φορές σε διάστημα 14 ημερών. **Λαχανικά (ντομάτα, αγγούρι, πεπόνι, φράουλες κ.λπ.):** Εφαρμόστε 0.7 - 1 κιλό/στρέμμα/εφαρμογή στο διάστημα που είναι πράσινος ο καρπός μέχρι να ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του τελικού χρώματος. **Οπωροφόρα δέντρα:** Εφαρμόστε 0.7 - 1 κιλό/στρέμμα στο στάδιο ανάπτυξης του καρπού. Επαναλάβετε με την ίδια δοσολογία κατά το στάδιο της διόγκωσης του καρπού.

Διαφυλλική Εφαρμογή:

Εφαρμόστε 0.2 - 0.5 κιλό/στρέμμα/εφαρμογή. Ποτέ μην υπερβαίνετε την συγκέντρωση 0,5% (5 γρ./λίτρο νερού). Πάντα να χρησιμοποιείτε νερό σε επαρκή ποσότητα για να εξασφαλίσετε πλήρη κάλυψη του φυλλώματος. Μην εφαρμόζετε σε περιόδους με υψηλή θερμοκρασία ή σε περιόδους υψηλής υδατικής καταπόνησης για τα φυτά. Ο καλύτερος χρόνος εφαρμογής είναι νωρίς το πρωί ή το βράδυ. **Μεγάλη καλλιέργεια (δημητριακά, ζαχαρότευτλα, βαμβάκι, κ.λπ.):** Εφαρμόστε κατά την έναρξη της ωρίμανσης. **Πατάτα:** Εφαρμόστε κατά τη διόγκωση των κονδύλων. Επαναλάβετε σε διάστημα 10 - 14 ημερών. **Λαχανικά:** Εφαρμόστε κατά τη διάρκεια που είναι πράσινος ο καρπός μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης. **Οπωροφόρα δέντρα:** Εφαρμόστε κατά τη διάρκεια που είναι πράσινος ο καρπός μέχρι την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης του τελικού χρωματισμού του καρπού.

✓ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ:

Το **Grogreen Fruit 18-11-59 + 2MgO + TE** είναι ένα λίπασμα υψηλής συγκέντρωσης φωσφόρου σε συνδυασμό με όλα τα απαραίτητα θρεπτικά και ιχνοστοιχεία που απαιτούνται από το φυτό σε απόλυτη ισορροπία. Έχει σχεδιαστεί για χρήση κατά τη διάρκεια του σταδίου ανάπτυξης και ωρίμανσης του καρπού για κηπευτικά, οπωροφόρα και είδη μεγάλης καλλιέργειας.

✓ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία μακριά από θερμότητα ή άμεσο ηλιακό φως.

- Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από κάθε χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.