



**FARMA-CHEM SA**

ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ | Γ' ΖΩΝΗ | Τ.Θ.1026   
570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
ΤΗΛ.: 2310 569.630 έως 33   
FAX: 2310 797.047   
info@farmachem.gr   
www.farmachem.gr 

## ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

GROLEAF

ΠΡΟΪΟΝΤΑ GEL

ΛΙΠΑΣΜΑ NPK 20-20-20

### ✓ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Εγγυημένη σύνθεση	
Ολικό άζωτο (N)	20,00% β/β
Νιτρικό άζωτο (N-NO <sub>3</sub> )	0,30% β/β
Ουρικό άζωτο (N-NH <sub>2</sub> )	19,70% β/β
Πεντοξείδιο του φωσφόρου (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) διαλυτό σε νερό	20,00% β/β
Οξειδίο του καλίου (K <sub>2</sub> O), διαλυτό σε νερό	20,00% β/β
Βόριο (B), ως βορικό οξύ, διαλυτό σε νερό	0,049% β/β
Χαλκός (Cu), χηλικός EDTA, διαλυτός σε νερό	0,050% β/β
Σίδηρος (Fe), χηλικός EDTA, διαλυτός σε νερό	0,400% β/β
Μαγγάνιο (Mn), χηλικό EDTA, διαλυτό σε νερό	0,200% β/β
Μολυβδαίνιο (Mo), διαλυτό σε νερό	0,009% β/β
Ψευδάργυρος (Zn), χηλικό EDTA, διαλυτός σε νερό	0,400% β/β

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ

Προϊόν: LIMA EUROPE NV

ΛΙΠΑΣΜΑ Ε.Κ.

### ✓ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ:

Διαφυλλική Εφαρμογή:

Δημητριακά: Εφαρμόστε 0,2-0,4 κιλά/στρέμμα κατά την επιτάχυνση της βλαστικής ανάπτυξης την άνοιξη ή τον χειμερινό μετά τον λήθαργο.

**Πατάτα:** Εφαρμόστε 0,5 κιλά/στρέμμα στην έναρξη της διόγκωσης και του γεμίσματος των κονδύλων. Επαναλάβετε 10 ημέρες αργότερα.

**Κρεμμύδι, Μαρούλι:** Εφαρμόστε 0,4 κιλά/στρέμμα στην επιτάχυνση της βλαστικής ανάπτυξης. Επαναλάβετε κατά τη διάρκεια του κύκλου ανάπτυξης.

**Λαχανικά Θερμοκηπίου:** Εφαρμόστε 0,05-0,1 κιλά/στρέμμα κατά την βλαστική ανάπτυξη. Επαναλάβετε με την ίδια ποσότητα κατά το στάδιο της καρπικής ανάπτυξης.

**Λαχανικά Ηπαιθρου:** Εφαρμόστε 0,2-0,4 κιλά/στρέμμα κατά την επιταχυνόμενη βλαστική ανάπτυξη. Επαναλάβετε με την ίδια ποσότητα κατά το στάδιο της καρπικής ανάπτυξης.

**Μικρά Οπωροφόρα:** Εφαρμόστε 0,2-0,4 κιλά/στρέμμα στην επιταχυνόμενη βλαστική ανάπτυξη. Επαναλάβετε με την ίδια δόση στο πρασίνισμα των καρπών και κατά το στάδιο της διόγκωσης.

**Οπωροφόρα Δέντρα:** Εφαρμόστε 0,3-0,5 κιλά/στρέμμα μετά την καρπόδεση. Επαναλάβετε δύο φορές με δόση 0,3 κιλά/στρέμμα κατά τη διάρκεια της καρπικής ανάπτυξης με 15-20 ημέρες διάστημα μεταξύ των εφαρμογών. Πραγματοποιήστε μία εφαρμογή μετά τη συγκομιδή με 0,5 κιλά/στρέμμα πριν το λήθαργο. Οι εφαρμογές στα αμπέλια θα έπρεπε να ξεκινούν στο στάδιο της άνθισης με 0,2-0,4 κιλά/στρέμμα. Ακολουθήστε τις ίδιες εφαρμογές στα υπόλοιπα οπωροφόρα δέντρα.

### ✓ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Το **Groleaf 20-20-20** μπορεί να συνδυαστεί στη χρήση με την πλειονότητα των αγροχημικών και λιπασμάτων. Συνιστάται να εκτελέσετε μια δοκιμή μικρής κλίμακας πριν προχωρήσετε. Μην το αναμιγνύετε με προϊόντα που περιέχουν ασβέστιο.

### ✓ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ:

Το **Groleaf** είναι ένα διαφυλλικό NPK λίπασμα με πολύ υψηλή συγκέντρωση μικροθρεπτικών στοιχείων. Χρησιμοποιείται διαφυλλικά ως επιταχυντής του φυλλώματος, με τεχνολογία F+A. Αυτό το προϊόν είναι ο τέλειος τρόπος για αποτελεσματική εφαρμογή μικροθρεπτικών μαζί με NPK, σε ένα ισορροπημένο σκεύασμα.

Αυτό το λίπασμα περιέχει ουρία, η οποία μπορεί να απελευθερώσει αμμωνία και να έχει αντίκτυπο στην ποιότητα του αέρα. Ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα αποκατάστασης.

### ✓ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

Της Lima τα Ευρωπαϊκά λιπάσματα δεν αλλοιώνονται σε ποιότητα, υπό την προϋπόθεση ότι προστατεύονται από την βροχή, την υγρασία, την ηλιακή ακτινοβολία και τις υψηλές θερμοκρασίες. Όταν ανοιχτούν, θα πρέπει να κλειστούν καλά ώστε να μην επιτραπεί στην υγρασία να εισέλθει και έτσι να προστατέψετε το προϊόν από το να χυθεί.

Αποθηκεύστε το προϊόν σε θερμοκρασία μεταξύ των 0°C και των 40 °C. Η μερικώς χρησιμοποιημένη ή κατεστραμμένη συσκευασία πρέπει να διατηρείται καλά κλειστή.

- *Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.*
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** *Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από κάθε χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.*