



FARMA - CHEM SA

Τ.Θ. 1026 ΒΙ.ΠΕ.Θ. - Τ.Κ. 570 22 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 - 569 630 έως 33 FAX: 2310 - 797 047
<http://www.farmachem.gr>, e-mail: info@farmachem.gr

ZIZANIOKTONO

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΠΡΟΪΟΝ:
HERBY FLO 40 SC

Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο που απορροφάται από τις ρίζες και μετακινείται αποπ्लाστικά. Η ζιζανιοκτόνος δράση του οφείλεται στην παρεμπόδιση του πολυμερισμού της τουμπουλίνης με αποτέλεσμα την αναστολή της αύξησης του ριζικού συστήματος.

Είναι πυκνό εναιώρημα (SC) με Propyzamide 40% β/ο, Βοηθητικές ουσίες: 61,85% β/β,

ΠΡΟΪΟΝ: KERB FLO 400 SC, **ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** Dow Agrosiences, **ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ:** Γερμανία.

Συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις:

Στόχος: Κουσκούτα καθώς και ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*.

Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρέμμα): 20-40.

Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά, Καρυδιά, Καστανιά), **Μηλοειδή** (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά), **Πυρηνόκαρπα** (Ροδακινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηλιά, Κερασιά), **Αμπέλι:** με 187,5 κ.εκ. σκευ./στρ. Εφαρμόζεται ανάμεσα στις γραμμές προφυτρωτικά επιφανειακά.

Μπρόκολο, Λάχανο: με 250 κ.εκ. σκευ./στρ. α) μετασπαρτικά προφυτρωτικά επιφανειακά, β) αμέσως μετά τη μεταφύτευση.

Κουνουπίδι, Μαρούλι: με 375 κ.εκ. σκευ./στρ. α) προσπαρτικά με ενσωμάτωση, β) μετασπαρτικά προφυτρωτικά επιφανειακά, γ) αμέσως μετά τη μεταφύτευση.

Ραδίκι: με 375 κ.εκ. σκευ./στρ. Μεταφυτρωτικά έως το 4^ο φύλλο.

Αντίδι: με 375 κ.εκ. σκευ./στρ. α) προσπαρτικά με ενσωμάτωση, β) μετασπαρτικά προφυτρωτικά επιφανειακά.

Φασολάκια νωπά: με 187,5 κ.εκ. σκευ./στρ. α) προσπαρτικά με ενσωμάτωση, β) μετασπαρτικά προφυτρωτικά επιφανειακά.

Αγκινάρα και άγρια αγκινάρα: με 375 κ.εκ. σκευ./στρ. Μεταφυτρωτικά στην έναρξη ανάπτυξης βλαστού.

Φακή, Ηλίανθος: με 187,5 κ.εκ. σκευ./στρ. α) προσπαρτικά με ενσωμάτωση, β) μετασπαρτικά προφυτρωτικά επιφανειακά.

Ελαιοκράμβη: με 187,5 κ.εκ. σκευ./στρ. Μετά το στάδιο των 2-4 φύλλων.

Καλλωπιστικά δένδρα και θάμνοι: με 375 κ.εκ. σκευ./στρ. Εφαρμόζεται στις γραμμές φύτευσης ή στο 50% της επιφάνειας του εδάφους.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο:

1 εφαρμογή για όλες τις καλλιέργειες.

Παρατηρήσεις:

***Καταπολεμούμενα ζιζάνια:** Πλατύφυλλα: Κουσκούτα (*Cuscuta spp.*), Πολυκόμπι (*Polygonum aviculare*), Αγριοπιπεριά (*P. persicaria*), Λουβουδιά (*Chenopodium album*), Βερόνικα (*Veronica spp.*), Αντράκλα (*Portulaca oleracea*). **Αγρωστώδη:** Αλεπονουρά (*Alopecurus myosuroides*), Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*), Κοινή πόα (*Poa annua*).

1. Στα φυλλώδη λαχανικά για την καλύτερη καταπολέμηση της κουσκούτας, η δόση μπορεί να αυξηθεί έως τα 500 κ.εκ./στρέμμα.

2. Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων που προέρχονται από αμπελώνες στους οποίους έχει γίνει χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος HERBY FLO 40 SC.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και: Σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες χρήσεως της ετικέτας ως προς τον χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος σε κάθε προτεινόμενη καλλιέργεια.

Σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

A) Αγκινάρες, ραδίκι, μαρούλι, σκαρόλα: κανένα.

B) Ψυχανθή, καλαμπόκι, σόργο, καρότο, πατάτα, σέλινο, φράουλα, βαμβάκι: 5 μήνες.

Γ) Σαχαρότευτλα, σπανάκι, κολοκυνθοειδή, λάχανο, ελαιοκράμβη, κρεμμύδι, σκόρδο, πιπεριά, τομάτα, μελιτζάνα: 8 μήνες.

Δ) Σιτηρά, αγρωστώδη για βοσκή, γρασίδια: 12 μήνες. Το έδαφος στο οποίο έχει εφαρμοστεί Prorpyzamide 50 WP πρέπει να οργωθεί σε βάθος 15 εκ. πριν να σπαρεί με σιτηρά, αγρωστώδη ή οποιαδήποτε άλλη καλλιέργεια που δεν αναφέρεται παραπάνω. Οι παραπάνω χρόνοι είναι οι μέγιστοι που απαιτούνται. Ο χρόνος αναμονής μπορεί να μειωθεί σε θερμά κλίματα καθώς και όταν χρησιμοποιούνται οι χαμηλές δόσεις εφαρμογής.

Της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Να αποφεύγεται η επανείσοδος των ανθρώπων μέχρι να στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό.

Τρόπος εφαρμογής:

Εφαρμόζεται ανάλογα με την καλλιέργεια, α) προ σπαρτικά με ενσωμάτωση ή μετασπαρτικά προφυτρωτικά επιφανειακά ή αμέσως μετά την μεταφύτευση.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες):

Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά, Καρυδιά, Καστανιά), **Μηλοειδή** (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά), **Πυρηνόκαρπα** (Ροδακινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηινιά, Κερασιά), **Αμπέλι**, **Ραδίκι**, **Ηλίανθος**, **Ελαιοκράμβη**, **Καλλωπιστικά δένδρα και θάμνοι**: μη εφαρμόσιμο. **Μπρόκολο**, **Λάχανο**, **Κουνουπίδι**: 60. **Μαρούλι**, **Αντίδι**: 28. **Φασολάκια νωπά**, **Φακή**: 90. **Αγκινάρα**: 60. **Άγρια αγκινάρα**: 120.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, και καλά αεριζόμενο.

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τα κενά της συσκευασίας του.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

Γενικές συμβουλές: Απαγορεύεται η εφαρμογή του σκευάσματος με ψεκαστήρες πλάτης.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.