

Metix Course

8/40 WP


Βρέχιμη σκόνη (WP)

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση.

Εγγυημένη σύνθεση: • Metalaxyl 8% β/β • Μεταλλικός χαλκός 40 % β/β (σε μορφή οξυχλωριού χαλκού) • Βοηθητικές ουσίες 20,10% β/β

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 60769/17.12.2018

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.



Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύστε την απαραίμενη δόση του σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και προσθέτετε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση και εφαρμόστε μέσα σε λίγες ώρες.

Συνδυαστικότητα: --

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες, σάκοι), μαζί με τα κουτιά αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίψιμο, για τη διασφάλιση της μη περιατέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε ομοιαία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Πεδίο εφαρμογής/Στόχος/Δόσεις σκευάσματος/Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής/ Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:

Αμπέλι: Περονόσπορος (Plasmopara viticola) με 250 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 250 γρ. (μέγιστη ποσότητα) σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μέχρι 4 εφαρμογές όταν οι βλαστοί έχουν μήκος περίπου 10 εκατ., μετά από 10 ημέρες, λίγο πριν την άνθηση και λίγο μετά την άνθηση.

Πατάτα: Περονόσπορος (Phytophthora infestans) με 250 γρ. (μέγιστη ποσότητα) σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Διαδοχικές προληπτικές εφαρμογές κάθε 10-14 ημέρες με έναρξη όταν τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκ. 2 φαρμογές.

Παραπρήσεις: 1) Εάν μετά την τελευταία εφαρμογή με το σκεύασμα εμφανίστει περονόσπορος σε διάστημα μικρότερο από 10-14 ημέρες θα πρέπει να γίνει αμέσως επέμβαση με μυκητοκτόνα επαφής ή διασυστηματικά διαφορετικού τρόπου δράσης (να μην περιέχουν δραστικό συστατικό της ομάδας των φαινολαμδών, όπως benalaxyl και ofurace). 2) Η συνολική εφαρμοζόμενη ποσότητα χαλκούχων σκευάσμάτων ανά καλλιεργητική περίοδο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 400 γραμ. ανά στρέμμα (ποσότητα εκφρασμένη σε μεταλλικό χαλκό).

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτούγειας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλείστε: -

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που εφαρμόστηκε το σκεύασμα: Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από τη ψεκασμένη περιοχή για 21 ημέρες.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής όταν εφαρμόζεται μετά την άνθηση. Ο κίνδυνος φυτοτοξικότητας αυξάνεται στις χαμηλές θερμοκρασίες (< 5 °C) και σε υγρές συνθήκες.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες): Αμπέλι: Στο τέλος της ανθοφορίας. Πατάτα: 28 ημέρες.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο καλά αεριζόμενο, προστατευμένο από υγρασία και το άμεσο ηλιακό φως και σε θερμοκρασία μέχρι 35°C. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρεύεται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΑΡ. ΠΑΡΤ./ΗΜ. ΠΑΡΑΓ./ΗΜ. ΛΗΞ.: βλέπε επί της συσκευασίας

νομ. 2020/2018



Καθαρό Βάρος: 5 κιλά

Κάτοχος της άδειας: IQV ITALIA SRL
Via Carlo Dell' Acqua, 7, 20027 Rescaldina (MI),
Italy (Ιταλία)

Παρασκευαστής σκευάσματος: INDUSTRIAS QUIMICAS
DEL VALLES (IQV) S.A. Av. Rafael Casanova 81, 08100
Mollet del Valles, Barcelona, Ισπανία



www.farmachem.gr

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
FARMA-CHEM SA
ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ - Γ ΖΩΝΗ - Τ.Θ.1026
570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 569.630 έως 3 - FAX: 2310 797.047
info@farmachem.gr

