

MICROFIX

ELEMENTS

ΚΛΠ 1 (Γ) (II) (β)

ΛΙΠΑΣΜΑ CE



ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ

Περιέχει ιχνοστοιχεία για την πρόληψη και την αντιμετώπιση τροφωπειών και χλωρώσεων που οφείλονται σε ελλείψεις ιχνοστοιχείων.

Εγγυημένη Σύνθεση

| | | | |
|-----------------|----------|------------------------------|-----------|
| Ολικό άζωτο (N) | 2.7% β/β | Μαγγάνιο (Mn)** | 4.0% β/β |
| Βόριο (B)* | 0.5% β/β | Μολυβδαίνιο (Mo)* | 0.10% β/β |
| Χαλκός (Cu)** | 1.5% β/β | Ψευδάργυρος (Zn)** | 1.5% β/β |
| Σίδηρος (Fe)** | 4.0% β/β | Οξείδιο του μαγνησίου (MgO)* | 9.0% β/β |

* υδατοδιαλυτό | **EDTA χηλικό και υδατοδιαλυτό

Συστατικά: Σίδηρο-EDTA (CAS: 54959-35-2)*, Ψευδάργυρο-EDTA (CAS: 14025-21-9)*, Μαγγάνιο-EDTA (CAS No: 15375-84-5)*, Θειικό μαγνήσιο (CAS: 10034-99-8)*, Χαλκός-EDTA (CAS: 14025-15-1)*, CMC1: Ουσίες και μείγματα παρθένων υλικών ΣΥΜΜΕΙΚΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ | Απλό ανόργανο μικροθρεπτικό λίπασμα | Λίπασμα χηλικών συμπλόκων μικροθρεπτικών στοιχείων | Λίπασμα αλάτων μικροθρεπτικών στοιχείων

Το **MICROFIX ELEMENTS** περιέχει όλα τα απαραίτητα ιχνοστοιχεία σε ιδανική αναλογία ώστε να καλύπτει τις ανάγκες της κρυφής πείνας των καλλιεργειών. Η σταδιακή εφαρμογή του μέσα στην καλλιεργητική σεζόν, μεγιστοποιεί τη φωτοσύνθεση και εξασφαλίζει ικανοποιητική παραγωγή.



Μπορεί να βλάψει την γονιμότητα.
Μπορεί να βλάψει το έμβρυο.

Δηλώσεις προφυλάξεων: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Φυλάσσεται κλειδωμένο. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία. Να χρησιμοποιείται μόνο όταν υπάρχει απόλυτη ανάγκη. Μην υπερβαίνετε τις κατάλληλες τιμές δόσης.
Βορικό Οξύ CAS: 10043-35-3

Είναι σχετικά μη τοξικό για τις μέλισσες.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

Υδρολίπανση: 200-500 γρ./στρ., 3-4 φορές την καλλιεργητική περίοδο, την περίοδο της γρήγορης βλαστικής ανάπτυξης.

Διαφυλλικές εφαρμογές: Ροδάκινα, Νεκταρίνα, Βερίκοκα, Κεράσια, Μήλα, Αχλάδια, Ελιά, Εσπεριδοειδή, Αμπέλι, Ακτινίδιο, Αμύγδαλο: 100 γρ./100 λίτρα νερό. Την άνοιξη στη νέα βλάστηση, όποτε απαιτείται στη γρήγορη βλαστική ανάπτυξη και μετά τη συγκομιδή. Ντομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, αγγούρι, πεπόνι, καρπούζι: 100 γρ./100 λίτρα νερό. Στη νέα βλάστηση και επανάληψη όποτε απαιτείται. Βαμβάκι: 100 γρ./100 λίτρα νερό. Όταν έχουμε αρκετό φύλλωμα. Επαναλαμβάνουμε ανά 2-3 εβδομάδες (3 ψεκασμοί). Κονδυλόριζες καλλιέργειες (Πατάτες, Σακχαρότευτλα): 50-100 γρ./100 λίτρα νερό. Όταν έχουμε αρκετό φύλλωμα και όταν σχηματιστεί ο κόνδυλος και μετά από 2-3 εβδομάδες. Θερμοκηπιακές καλλιέργειες: 100 γρ./100 λίτρα νερό. Μαζί με τα λιπάσματα σε επαναλαμβανόμενες εφαρμογές. Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώμη, Σικάλη, Σόργο, Ρύζι, Καλαμπόκι: 100 γρ./100 λίτρα νερό. Στη νέα βλάστηση και μετά από 2-3 εβδομάδες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οι διαφυλλικοί ψεκασμοί του MICROFIX ELEMENTS είναι πιο αποτελεσματικοί όταν γίνονται νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα, οπότε επιτυγχάνεται και η μεγαλύτερη δυνατή απορρόφηση των ιχνοστοιχείων από το φυτό. Διαλύουμε την ανάλογη ποσότητα σκόνης σε μικρή ποσότητα νερού και στη συνέχεια προσθέτουμε στο ψεκαστικό υγρό ανακατεύοντας καλά.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΟΤΗΤΑ

Συνδυάζεται με τα περισσότερα φυτοφάρμακα και υδατοδιαλυτά λιπάσματα. Όταν γίνεται συνδυασμός με φυτοφάρμακα να ακολουθούνται οι οδηγίες των αντίστοιχων φαρμάκων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Πυκνότητα: 0.85 +/- 0.1 g/Cm³
pH: 6.5 +/- 1 (σε διάλυμα νερού 1%)

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελματία χρήστη εφόσον ζητηθεί



ΑΡ. ΠΑΡΤ./ΗΜ. ΠΑΡΑΓ.:
Βλέπε επί της συσκευασίας

P.O. Box 1333 - 3260 AH - Oud Beterland - The Netherlands
Tel: +31(0)165578888 - www.eurosolids.com



Καθαρό Βάρος: **25 κιλά**



FARMA-CHEM SA

Υπεύθυνος για την τελική
διάθεση στην αγορά:
FARMA-CHEM SA
ΒΙΛΠΕ, ΣΙΝΔΟΥ - Γ. ΖΩΝΗ -
Τ.Θ.1026 - 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ: 2310 569.630 έως 3
FAX: 2310 797.047
info@farmachem.gr