

Προφυλάξεις: • Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. • Μακριά από θερμότητα / απνήθρες / υγμένες φλόγες / θερμές επιφάνειες. • Μην καπνίζετε. • Διασπείρεται / Φυλάσσεται μακριά από ενδύματα, καύσιμα υλικά. • Λάβετε κάθε προφυλαξή ώστε να μην αναμειχθεί με καύσιμα υλικά. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα απομικρής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. • Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε μέσα για την κατάσβεση. • **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. • **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

Αντιδοτό: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Δείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας στο γιατρό.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Επικοινωνήστε με τους κατά τόπους γεωπόνους.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

• Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. • Εφαρμόζεται αργά το απόγευμα και συνιστάται ψεκασμός μέχρι απορροής. • Οι προτεινόμενες δόσεις είναι καθαρά ενδεικτικές και μεταβάλλονται ανάλογα με τη θερμοκρασία, την ηλιοσέλα καθώς και από το εδαφικό pH, την επάρκεια νερού κ.τ.λ. • Να αποφεύγεται η χρήση σε ακραίες καιρικές συνθήκες. • Προτείνεται πριν την εφαρμογή σε μια καλλιέργεια ή περιοχή για πρώτη φορά ή σε συνδυασμό με άλλα σκευάσματα, να δοκιμάζεται αρχικά σε μια μικρή περιοχή. • Μην υπερβιβάνεται τις συνιστώμενες δόσολογίες. Συστήνεται η εφαρμογή του μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της ετικέτας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση είναι εντελώς απαγορευμένη.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Διατηρείστε το σε μέρος ξηρό και δροσερό.

Προφυλάξτε το προϊόν από πιθανές χαμηλές θερμοκρασίες (παγετό).

Το **POWER-1 N** είναι πυκνό, υγρό αζωτούχο λίπασμα, ιδανικό για τη βελτίωση της βλαστικής ανάπτυξης των καλλιεργειών. Περιέχει και τις 3 μορφές του αζώτου (ουρικό, αμμωνιακό και νιτρικό), γεγονός που του επιτρέπει να εφοδιάζει τις καλλιέργειες με αζώτο τόσο άμεσα όσο και σταδιακά. Όταν εφαρμόζεται με ψεκασμούς φυλλώματος, η ουρική μορφή αφομοιώνεται άμεσα ακόμα και σε περιόδους που επικρατούν σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες. Ενδεικνύεται η εφαρμογή του στα πρώτα στάδια ανάπτυξης του φυλλώκιν επιφανείας των καλλιέργειών. Μπορεί να εφαρμοσθεί διαφυλλικά και με υδρόλίπανση.

Το POWER 1:

- Είναι ιδανικό για την ανάπτυξη και το πρασινισμα των χλωσαστήτων.
- Παρέχει ομοιόμορφη κατανομή του Αζώτου τόσο στο φύλλωμα όσο και στο έδαφος.
- Ενισχύει την παραγωγή πρωτεϊνών στα σπέρμα.
- Είναι κατάλληλο για συμπληρωματική λίπανση σε όλες τις καλλιέργειες και ιδιαίτερα σε αυτές που έχουν αυξημένες ανάγκες σε αζώτο (π.χ. φυλλώδη λαχανικά).
- Είναι ενεργό σε χαμηλές θερμοκρασίες και σε εδάφη με υψηλό δείκτη pH.
- Ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες εμφάνισης φυσιολογικών ανεμοκλιών από την υπερπάρκεια αζώτου.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Power-1 N



© Σημά εμπορικό της FARMA-CHEM SA

Σύνθεση	(β/β)	(β/ο)
Αζωτο (N) ολικό	24,1%	29,0%
Ουρικό	13,3%	16,0%
Νιτρικό	5,4%	6,5%
Αμμωνιακό	5,4%	6,5%

ΛΙΠΑΣΜΑ Ε.Κ.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά οξειδωτικό

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Εσπεριδοειδή (Πορτοκάλια, Λεμόνια, Μανταρίνια, Γκρέϊπ φρουτ): Συστήνεται ένας ψεκασμός στα 2/3 της αναοίχτης βλάστησης και επανάληψη μετά από 30 ημέρες. Δόση: 200-500 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 200-400 λίτρα νερού/στρ.

Μηλοειδή (Μήλα, Αχλάδια): Συστήνεται ένας ψεκασμός μετά την καρποδέση και ένας μετασυλλεκτικά. Δόση: 200-500 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-200 λίτρα νερού/στρ.

Πυρηνόκαρπα (Ροδάκινα, Κερασιά, Νεκταρίνια, Βερυκοκκιά): Συστήνεται 3 εφαρμογές, α) μετά την καρποδέση, β) 4-6 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή για βελτίωση του μεγέθους στα ροδάκινα, στα νεκταρίνια και βερυκοκκα και γ) μετασυλλεκτικά. Δόση: 200-500 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 150-250 λίτρα νερού/στρ.

Αμυγδαλιά, Φυστικά, Καρυδιά, Φουντουκιά: Συστήνεται ένας ψεκασμός μετά την καρποδέση και ένας μετασυλλεκτικά. Δόση: 200-500 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-200 λίτρα νερού/στρ.

Ακτινίδια: Συστήνονται ψεκασμοί πριν την άνθηση και στην ανάπτυξη του καρπού. Δόση: 200-500 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-150 λίτρα νερού/στρ.

Αμπέλια (Οινοποίηση, Επιτραπέζια, Σουλτανίνα): Συστήνονται ψεκασμοί στη νέα βλάστηση, στην έναρξη της καρποδέσης μέχρι και το γυάλισμα. Δόση: 250-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα νερού/στρ.

Ελιά: Συστήνονται ψεκασμοί πριν την άνθηση, στο κρόκισμα και κατά την αύξηση του μεγέθους του καρπού. Δόση: 250-500 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 150-300 λίτρα νερού/στρ.

Κηπευτικά (Βιοχωνική Τομάτα, Υπαίθρια Τομάτα, Πιπεριά, Αγγούρι, Μελιτζάνα, Καρπούζι, Πεπόνι, Κολοκυθί): Συστήνεται ψεκασμοί στην έναρξη της άνθησης, στην καρποδέση και 30 ημέρες αργότερα. Στη βιοχωνική τομάτα συστήνεται ψεκασμός και πριν την άνθηση για να κλείσουν οι γραμμές γρηγορότερα. Δόση: 250-1000 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα νερού/στρ.

Φυλλώδη λαχανικά (Λάχανο, Μπρόκολο, Κουνουπίδι, Μαρούλι): Συστήνονται ψεκασμοί μόλις σχηματιστεί το κεφάλι και επανάληψη μετά από 7-10 ημέρες. Δόση: 250-500 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα νερού/στρ.

Κρεμμύδια: Συστήνεται ψεκασμός όταν τα φυτά έχουν ύψος 15-20 cm. Επανάληψη στο γέμισμα του βολβού. Δόση 250-500 κ.εκ./100 λίτρα νερό.

Καρότα: Συστήνεται ψεκασμός όταν τα φυτά είναι 7,5 - 15 cm. Επανάληψη σε 3 εβδομάδες. Δόση: 250-500 κ.εκ./100 λίτρα νερό.

Πατάτα: Συστήνονται ψεκασμοί πριν την κονδυλοποίηση και στην αρχή της άνθησης. Δόση: 250-500 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα νερού/στρ.

Βαμβάκι: Συστήνεται ψεκασμός στα 3-4 φύλλα. Δόση: 200-500 κ.εκ. ανά στρέμμα. Επίσης, στην αρχή της άνθησης και όποτε απαιτείται αζώτο. Δόση: 500-2000 κ.εκ. ανά στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-80 λίτρα νερού/στρ.

Σπύρι: Συστήνεται ψεκασμός από το στάδιο των 2 φύλλων μέχρι το στάδιο των 5 αβερφίων. Δόση: 250-500 κ.εκ. ανά στρέμμα. Επίσης, πριν την εμφάνιση της σημιας στην ίδια δόση. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30-50 λίτρα νερού/στρ.

Ρύζι: Συστήνεται ψεκασμός στο στάδιο των 3-5 αβερφίων και όποτε υπάρχει ανάγκη αζώτου. Δόση: 250-500 κ.εκ. ανά στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30-50 λίτρα νερού/στρ.

Καλαμπόκι: Συστήνονται 1-2 ψεκασμοί από τα 4 φύλλα μέχρι τα 8 φύλλα. Δόση: 250-500 κ.εκ. ανά στρέμμα, ανάλογα με το στάδιο της καλλιέργειας. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30-50 λίτρα νερού/στρ.

Θερμοκήπιο: Εφαρμόζεται σε δόση 250-500 κ.εκ./100 λίτρα νερό, στα αντίστοιχα στάδια των υπαίθριων καλλιεργειών. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-200 λίτρα νερού/στρ.

Γιαζόν: Το Power-1 N είναι ιδανικό για γαζόν, εφαρμόζεται σε όλα τα είδη και όλες τις εποχές. Δόση: 250-500 κ.εκ/στρ. Βλέπε τις αντίστοιχες καλλιέργειες υπαίθρου για το χρόνο εφαρμογής. Δόση: 1-4 λίτρα/στρέμμα.

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελματία εφόσον ζητηθεί

Παρασκευαστής - Τυποποιητής - Συσκευαστής:

FARMA - CHEM SA

ΔΙΕΥΘ. ΓΡΑΦΕΙΟΝ & ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ:
ΒΙ.ΠΕ.Θ. Γ' ΖΩΝΗΣ

ΤΗΛ: 2310 569 630 έως 33 FAX: 2310 797 047

Τ.Θ. 1026 ΒΙ.ΠΕ.Θ. - Τ.Κ. 570 22 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

www.farmachem.gr, e-mail: info@farmachem.gr



FARMA - CHEM SA



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:
1 Lt ή 1,20 Kg