

Διαφυλλική
ενεργοποίηση



PRO ALGIN

Το **GROGREEN Pro Algin** είναι ένα ΝΚ λίπασμα, με βάση επιλεγμένα αμινοξέα και εκχύλισμα φύκους, για την ενίσχυση της ανάπτυξης των καλλιεργειών. Το μείγμα θα υποστηρίξει την καλλιέργεια ώστε να είναι καλύτερα προσαρμοσμένη σε αντίξοες συνθήκες που θα μπορούσαν να μειώσουν την απόδοση και την ποιότητα της καλλιέργειας. Θα συμβάλει, επίσης, στην πρόσληψη και στην αποτελεσματικότητα των θρεπτικών συστατικών, υποστηρίζοντας έναν υγιέστερο και πιο αποτελεσματικό μεταβολισμό των φυτών.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Το Pro-Algin συνιστάται για όλους τους τύπους καλλιεργειών.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Το Pro Algin είναι κατάλληλο για διαφυλλική εφαρμογή, για απευθείας χρήση στο έδαφος ή στάγδην άρδευση.

Υδρολίπανση: Εφαρμόστε 0,3 – 0,5 κιλά/στρέμμα/εφαρμογή, ξεκινώντας μετά τη μεταφύτευση ή κατά τη βλάστηση για τα λαχανικά ή στην έναρξη της ριζοβολίας για τα οπωροφόρα δέντρα. Επαναλάβετε την εφαρμογή 2 - 3 φορές κατά τη διάρκεια των βασικών σταδίων του φυτού (ανθοφορία, καρπόδεση, διόγκωση του καρπού) ή κατά τη διάρκεια δυσμενών κλιματολογικών συνθηκών και κακής σύστασης εδαφών.

Διαφυλλική εφαρμογή: Η εφαρμογή κυμαίνεται από 150-300 κυβ.εκ./100 λίτρα νερό. Πάντα να χρησιμοποιείται σε επαρκή ποσότητα νερού ώστε να εγγυάται η πλήρη κάλυψη του φυλλώματος.

Ποτέ μην υπερβαίνετε τη συγκέντρωση 0,5% (ή 5 γρ / λίτ. νερού).

Φάσμα δράσης: Μεγάλης καλλιέργεια (σιτάρι, κριθάρι κ.λπ.): Πριν από την ωρίμανση (GS21), ταξιανθία 1 cm.

Πατάτα: Κατά τη διάρκεια της κονδυλοποίησης και κατά το στάδιο της διόγκωσης.

Λαχανικά (φράουλες, ντομάτα, αγγούρι, πεπόνι, καρπούζι κ.λπ.): Μετά τη μεταφύτευση, πριν από την ανθοφορία, μετά την καρπόδεση, κατά τη διάρκεια της διόγκωσης του καρπού.

Οπωροφόρα δέντρα (μήλα, αχλάδια, ροδάκινα, δαμάσκηνα κ.λπ.): Κατά την έκπτυξη των οφθαλμών, μετά την καρπόδεση, κατά τη διάρκεια της διόγκωσης του καρπού, μετά τη συγκομιδή.

Εσπεριδοειδή: Κατά τη βλαστική ανάπτυξη την άνοιξη, μετά την καρπόδεση, μετά τη φυσιολογική πτώση τον Ιούνιο, κατά τη διάρκεια διόγκωσης του καρπού.

Ελιά: Κατά τη βλαστική ανάπτυξη την άνοιξη, μετά την καρπόδεση, κατά τη διόγκωση του καρπού, μετά τη συγκομιδή.

Αμπέλι: Κατά τη βλαστική ανάπτυξη την άνοιξη, μετά την καρπόδεση, κατά το στάδιο της αλλαγής χρώματος των καρπών (ή γυαλισματος στις λευκές ποικιλίες), μετά τη συγκομιδή.

Να χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες μόνο όπου υπάρχει αναγνωρισμένη ανάγκη. Μην υπερβαίνετε τις δόσεις εφαρμογής.

Επικοινωνήστε με την εταιρεία ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ για πιο συγκεκριμένες συστάσεις: info@farmachem.gr

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΧΛΩΡΙΟ
ΧΑΜΗΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΔΜΙΟΥ (Cd)

ΥΓΡΟ ΟΡΓΑΝΟ-ΟΡΥΚΤΟ ΛΙΠΑΣΜΑ
NK 5 - 6.5



Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το μισό δοχείο ψεκασμού με καθαρό νερό, προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα Pro-Algin, γεμίστε πλήρως τη δεξαμενή με νερό και εφαρμόστε χωρίς καθυστέρηση. Προσθέστε το πρώτο στον ψεκαστήρα κατά την ανάμιξη με άλλα αγροχημικά. Καθαρίστε καλά τον ψεκαστήρα μετά τη χρήση. Αποφύγετε τον ψεκασμό σε υψηλές θερμοκρασίες.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Το Pro-Algin είναι συμβατό με τα περισσότερα αγροχημικά και λιπάσματα που χρησιμοποιούνται. Συνιστάται μια δοκιμή μικρής κλίμακας πριν προχωρήσετε. Αποφύγετε την ανάμιξη με αλκαλικές ουσίες, εύφλεκτα υλικά και αναγωγικούς παράγοντες. Πάντα να διαβάζετε την ετικέτα του συνδυαζόμενου προϊόντος πριν την ανάμιξη με το Pro-Algin. Ποτέ μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη δόσολογία.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Συνιστάται η προστασία από τον παγετό, αποθήκευση από 5-40°C σε κατάλληλη αποθήκη με καλό εξαερισμό. Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία μακριά από υψηλές θερμοκρασίες και ηλιακή ακτινοβολία. Η μερικώς χρησιμοποιημένη ή κατεστραμμένη συσκευασία πρέπει να διατηρείται καλά κλειστή. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά τη χρήση.

Φυλάσσεται κλειδωμένο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/ διεθνείς κανονισμούς. Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Παρασκευάζεται από την: Lima Europe NV
Doelhaagstraat 77/1, 2840 Rumst, Belgium
Tel: +32 3 203 55 50
www.lima-europe.com

Αποκλειστική Διάθεση για την Ελλάδα:
ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ
ΒΙ.Π.Ε.Θ. Σίνδος, Θεσσαλονίκη,
Τηλ.: 2310 569630 -3,
Fax: 2310 797047,
E-mail: info@farmachem.gr

Αριθμός παρτίδας: 2024-0208

Καθαρό βάρος: 5 ΚΙΛΑ



FARMA-CHEM SA

pH (1% διάλυμα): 7 – 8	Πυκνότητα: +/- 1,18 κιλά/λίτρο	
ΣΥΝΘΕΣΗ	% β/β	% β/ο
Ολικό άζωτο (N)	5.3%	6.25%
Οργανικό άζωτο (N-org), από αμινοξέα	4.0%	4.72%
Ουρικό άζωτο (N-NH ₂)	1.3%	1.53%
Ολικό οξείδιο του καλίου (K ₂ O)	6.5%	7.7%
Οξείδιο του καλίου (K ₂ O), υδατοδιαλυτό	6.5%	7.7%
Οργανικός άνθρακας	17.5%	20.65%
Ξηρά ύλη	50%	50%
Βόριο (B), ως άλας αιθανολαμίνης, υδατοδιαλυτό	0.045%	0.053%
Χαλκός (Cu), χηλικός με EDTA, υδατοδιαλυτό	0.001%	0.001%
Σίδηρος (Fe), χηλικός με EDTA, υδατοδιαλυτό	0.030%	0.035%
Μαγγάνιο (Mn), χηλικός με EDTA, υδατοδιαλυτό	0.013%	0.015%
Μολυβδαίνιο (Mo), ως άλας νατρίου, υδατοδιαλυτό	0.002%	0.002%
Ψευδάργυρος (Zn), χηλικός με EDTA, υδατοδιαλυτό	0.005%	0.006%

Συστατικά: Νιτρικό Κάλιο¹ (CAS n° 7757-79-1), Γλυκίνη¹ (CAS n° 56-40-6), Γλυκίνη Βεταΐνη¹ (CAS n° 107-43-7), Εκχύλισμα φυκιών¹ (CAS n° 84775-78-0)

¹Ουσίες και μείγματα παρθένων υλικών (ΚΣΥ 1)

GROGREEN PRO ALGIN Υγρό οργανό-ορυκτό λίπασμα NK 5-6,5 με μικροθρεπτικά συστατικά

UFI: 7MMG-N27S-DOON-009M

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.
Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε.
Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός, συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

