

Πεδίο εφαρμογής - Στόχοι - Δόσεις - Τρόπος & Χρόνος εφαρμογής:

Όγκος φευκαστικού υγρού: 30-50 λίτρα/στρέμμα.

Τρόπος & χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος μεταφυτωτικά. Στάδιο ζιζανίων από 2-4 πραγματικά φύλλα μέχρι το τέλος του αδελφώματος των ζιζανίων και πριν τα ζιζανία καλυψθούν από την καλλιέργεια και γίνονται ανταγωνιστικά σε αυτήν (BBCH 12-BBCH 23). Μπορεί να εφαρμοθεί και μερχά τη μεμφάνιση του πρώτου κόμβου των ζιζανίων (BBCH 31). Η δόση εφαρμογής κυμαίνεται ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης των ζιζανίων.

Μέγιστος ορθήμας εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 1 εφαρμογή.

Βαμβάκι: Πολυετή αγρωτώδη ζιζανία: i) *Cynodon dactylon* (Αγριόδα) & *Paspalum distichum* (Νεραγριός) με 250 κ.εκ./στρ. ii) *Sorghum halapense* (Βελιούρας) με 200-250 κ.εκ./στρ. **Ετήσια αγρωτώδη ζιζανία:** i) *Echinocloa crus-galli* (Μουρκίτρια), *Lolium spp.*, *Lolium multiflorum*, Πολιύανθη Ήρα & *Lolium rigidum* Λεπτή Ήρα με 150 κ.εκ./στρ. *Avena spp.*, *Avena fatua* & *Avena sterilis* (Αγριοβρύωμη), *Phalaris spp* (Φάλαρη), *Digitaria sanguinalis* (Αιματόχορτο) με 100-150 κ.εκ./στρ.

Πατάτες, Ζαχαρόπετυλα, Φασόλια, Ηλιανθός, Μπιζέλια, Ελαιοκράμβη (χειμερινή), Τομάτα (υπιθρός): Πολυετή αγρωτώδη ζιζανία: i) *Cynodon dactylon* (Αγριόδα) με 250 κ.εκ./στρ. ii) *Sorghum halapense* (Βελιούρας) με 200-250 κ.εκ./στρ. **Ετήσια αγρωτώδη ζιζανία:** i) *Echinocloa crus-galli* (Μουρκίτρια), *Lolium spp.*, *Lolium multiflorum*, Πολιύανθη Ήρα & *Lolium rigidum* Λεπτή Ήρα, *Avena spp.*, *Avena fatua* & *Avena sterilis* (Αγριοβρύωμη), *Phalaris spp* (Φάλαρη), *Digitaria sanguinalis* (Αιματόχορτο) με 150 κ.εκ./στρ.

Παρατηρήσεις: • Χρησιμοποιήστε την υψηλότερη δόση όταν τα ζιζανία έχουν ξεπεράσει το προτεινόμενο στάδιο ανάπτυξης και σε περιπτώσεις μεγάλης πυκνότητας ζιζανίων. • Για καλύτερα αποτελέσματα υφίσματεται στα ζιζανία κατά τη ώρη της τους ανάπτυξης όπου αυξάνεται η δυνατότητα διάκηνης του προϊόντος στο φωτό. • Τα ζιζανία ελέγχονται αποτελεσματικότερα και πιο γρήγορα σε υψηλότερες θερμοκρασίες και σε έδαφος με επαρκή εδαφική υγρασία. • Για όλες τις καλλιέργειες πρέπει την καλύψη της καλλιέργειας από τα ζιζανία και πριν αυτά γίνονται ανταγωνιστικά στην καλλιέργεια. • Οταν επιτακτούν κακές καλλιεργητικές συνθήκες, όπου τα ζιζανία και η καλλιέργεια είναι κάτω από πίεση, που μπορεί να προκληθεί από παγετό, ξηρασία, ανεπάρκεια χνοσοτοξίνων, πλημμύρα ή έντονη μυκητολογική ή εντομολογική προσβολή και μπορεί να έχουμε μείωση στη δυνατότητα μετακίνησης του προϊόντος, τότε να μην εφαρμόζεται το προϊόν ή σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η εφαρμογή του, να χρησιμοποιήσετε προτεινόμενα.

Ανθεκτικά ζιζανία: Όλα τα πλατύφυλλα. Οδηγίες για τη χρήση του RECEIPT 4 EC: Μετά από δοκιμές συνάγεται ότι το προϊόν δεν έχει επίπτωση σε καλλιέργειες που προορίζονται για σποροταραγγή ή για παραγωγή βαλβήνων και η φυτωτική ικανότητα ήταν ίδια με του μάρτυρα.

Ειδικές προφυλάξεις για τα ζιζανιοκάτα: • Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπαράτα και οπώρους. • Χρησιμοποιήστε χωριστά φευκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκάτα. • Μη ρυπαΐνετε αρδευτική ή πόσιμη νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες. • Μη θεκάζετε όταν φυσάει. • Μη διπλωφεκάζετε τα άκρα των ζωνών. Μην αγκάνετε τις δύσεις. Μη τη χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δε συνιστάται. • Μετά τη φευκασμό ξεπλύνετε καλά τη φευκαστικά μέσα με νερό και απορρυπαντικό.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας: Οι πλατύφυλλες καλλιέργειες μπορούν να επανασταρούν αμέσως σε έδαφος που έχει εφαρμοθεί το RECEIPT 4 EC, αλλά πρέπει να μεσοληφθεί διάστημα 4 εβδομάδων από την εφαρμογή του για την επανασταρά αγρωτώδων καλλιέργειών (στηρρ).



Quinalofop-P-tefuryl 4%
(Κουιναλοφόπ-Π-τεφουρύλ)

Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

Εγγυημένη σύνθεση: quinalofop-P-tefuryl 4% β/ο - Βοηθητικές ουσίες 95,29% β/β

**Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο.
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

Διασυστηματικό μεταφυτωτικό ζιζανιοκάτον πολυετών και ετήσιων αγρωτώδων ζιζανίων.
Σε βιοχημικό επίπεδο η δράση του είναι στην καρβοξυλάση του οκετουλοσυνενζύμου A στην
βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων (inhibition of acetyl CoA carboxylase).



Αρ. Εγκ. Κυκλ. Y.A.A.&T. προϊόντος αναφοράς

PANAREX 4 EC: 7879

Πολωνία: Ar. Εγκ. πονομορίτου προϊόντος: R-16/2009

Παρασκευαστής: Arysta LifeScience Great Britain Ltd.

KΙΝΔΥΝΟΣ

• Μπορεί να προκαλείσει θάνατο σε περίπτωση κατάποτης και διεύδυνης στις αναπνευστικές οδούς.
• Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. • Υποστηρίζεται στην πρόληψη καρκίνου. • Υποστηρίζεται στην πρόληψη βατιάς στη γονιμότητα στο έμβρυο. • Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 189903

Υπεύθυνος κυκλοφορίας στην Ελλάδα - Υπεύθυνος

τελικής συσκευασίας & σήμανσης: FARMA-CHEM SA

ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ - Γ. ΖΩΝΗ - Τ. 010.26

570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗ.Α.: 2310 569.630 έως 3 - FAX: 2310 797.047

info@farmachem.gr



Δηλώσεις προφύλαξης: • Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Εφόδιαστε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. • Να αποφεύγεται η ελεύθερωση στο περιβάλλον. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικό ενδύμαντο/ μέσα απομήκη προστασία για τα μάτια/πρόσωπο.

• Διάθεση του περιεχομένου/περιελήφθη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο: • Σε ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γατρά. • ΜΗΝ προκαλέσετε έμετο. • Σε ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΑ: Επιλέγετε προστεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γατρά. • ΜΗΝ προκαλέσετε έμετο. • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως τα λερωμένα ρούχα και παπούτσια. Πλύνετε με σαπούνι και πολύ νερό. • Σε περίπτωση εισπνοής: Πηγαίνετε σταν καθαρό αέρα σε περιθώρια τυχαίας εισπνοής καπνών ή σκόνης από υπερθέματα ή καύση. Εάν τα συμπτώματα διαρκούν, καλέστε γατρά.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φάλες) ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλά ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο φευκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφύο καταστραφούν προπογινώντας με τρόπιμα, για τη διασφάλιση της μη περιεπέριττη χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμόζεται μεταφυτωτικά με ομοιόμορφο φευκασμό του φυλλώματος των ζιζανίων με 30-50 λίτρα/στρέμμα. Ο μικρότερος όγκος χρησιμοποιείται όταν τα ζιζανία είναι μικρά και ο μεγαλύτερος όγκος χρησιμοποιείται όταν έχουμε μεγάλο πληθυσμό ζιζανίων ή όταν τα ζιζανία είναι σε μεγαλύτερη ανάπτυξη. Πλέον φευκαστικό μεχρι 3 ατμ. (45 πτ.) Μικρές τύπου σκόνης. Ο φευκασμός πρέπει να γίνεται με συνεχή ανάδευση του φευκασμού. Τρόπος παρασκευής φευκαστικού υγρού: Η απαιτούμενη ποσότητα σκευασμάτων προστίθεται σε λίγο νερό σε χοριστό δοχείο και ρίχνεται με συνεχή ανάδευση στο βιτό. Η φάλη ξεπλένεται 3 φορές και τα νερά ρίχνονται στο βιτό. Απογεύμισμε με νερό και συνεχίζουμε την ανάδευση μέχρι τέλος του φευκασμού. Δεν απαιτείται για την εφαρμογή του η προσθήτη λαδού ή επιφαρεπόραστο. Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις. Είναι φυτοτοξικό στη στιρρά και στις μη εύωρωτες πλατύφυλλες καλλιέργειες. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομή: Τομάτα υπιθρό: 28 ημέρες. Βαμβάκι, Πατάτα υπιθρό, Ηλιανθός, Ζαχαρόπετυλα, Φασόλια & Μπιζέλια για δροσία: 56 ημέρες. Χειμερινή Ελαιοκράμβη: δεν ορίζεται εφόσον η εφαρμογή είναι στα αρχικά στάδια της καλλιέργειας.

Χρονική σταθερότητα σκευασμάτων - Συνθήκες αποθήκευσης: Το σκευασμά πρέπει να αποθηκεύεται, στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας. Διατηρείται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο περιβάλλον. Όταν αποθηκεύεται συμφωνα με τις παραπάνω συνθήκες, παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: Βλέπε επί της συσκευασίας

Περιεχόμενο: 1 Λίτρο