

Πεδίο εφαρμογής - Στόχος - Δρόπιος και Χρόνος εφαρμογής: Εσπεριδοειδή (Πορτοκάλι, Μανταρίνη, Λεμόνι, Γκρέιπ-φρουτ, Κίτριο), Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά), Μήλοιδη (Μήλοι, Άχλαδι), Πυρηνόκρατο (Βερυκοκί, Νεκταρίνη, Ροδακίνη, Κερασί), Αμπέλιο (επιτραπέζια και σινοποιόπιτσα), Ελιές: αγέτισμα ζάνινα (*) (αγρυπνότητα και πλατύσφυλλα) με 150-200 κ.εκ. σε 20-40 λίτρα φεκ. υγρού στο στρέμμα, για Μολόχα (Malva sp.), Τουκούνιδα (Urtica sp.), Πολύκαρπο (Portulaca oleracea) με 400-600 κ.εκ. σε 20-40 λίτρα φεκ. υγρού στο στρέμμα. Οταν τα ζάνινα βρίσκονται στο στόχο της ζωρτζιάς τους ανάπτυξης, 2) Βούλευτη ζάνινα (*), για Αγριάδα (Cynodon dactylon) με 750-1000 κ.εκ. σε 20-40 λίτρα φεκ. υγρού στο στρέμμα, για θελέωντα (Sorghum halepense) και Φτέρζη (Pteridium aquilinum) με 500 κ.εκ. σε 20-40 λίτρα φεκ. υγρού στο στρέμμα για Νερόκαδα (Convolvulus arvensis) και Κίρινο (Cirsium arvense) με 1000 κ.εκ. σε 20-40 λίτρα φεκ. υγρού στο στρέμμα. Όταν τα ζάνινα βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγα μέτρα από αυτή, Για Κύπερο (Cyperus sp.) με 600 κ.εκ. (1^η εφαρμογή) σε 20-40 λίτρα φεκ. υγρού στο στρέμμα, 2^η εφαρμογή με 500 κ.εκ. (2^η εφαρμογή) σε 20-40 λίτρα φεκ. υγρού στο στρέμμα, 2^η εφαρμογή σε περιπτώτα αναβολιστός, Βούλευτη (**); αγέτισμα ζάνινα (*) (αγρυπνότητα και πλατύσφυλλα) με 150-200 κ.εκ. σε 20-40 λίτρα φεκ. υγρού στο στρέμμα. Κατευθεύτηκε, φεκούσας μεταξύ των οργανισμών πριν την έναρξη της ανάπτυξης, Καπνός: Ορόβούχο (Drobanthus ramosissima) με 40 κ.εκ. σε 30-40 λίτρα φεκ. υγρού στο στρέμμα, Φεκούσα καλύψεων: 40 ημέρες μετα τη μεταφεύση, 3) Αγροί με τη συγκέντηση των καλλιέργειών ή πριν την κατέργαση του εδάφους για σπόρους: Αγέτισμα ζάνινα (*) (αγρυπνότητα και πλατύσφυλλα) με 150-200 κ.εκ. σε 20-40 λίτρα φεκ. υγρού στο στρέμμα, για Μολόχα (Malva sp.), Τουκούνιδα (Urtica sp.), Πολύγονο (Polygonum sp.), Αντράκια (Portulaca oleracea) με 400-600 κ.εκ. σε 20-40 λίτρα φεκ. υγρού στο στρέμμα, για Μολόχα (Malva sp.), Τουκούνιδα (Urtica sp.), Πολύγονο (Polygonum sp.), Αντράκια (Portulaca oleracea) με 400-600 κ.εκ. σε 20-40 λίτρα φεκ. υγρού στο στρέμμα. Όταν τα ζάνινα βρίσκονται στο στόχο της ζωρτζιάς τους ανάπτυξης, 2) Αγέτισμα ζάνινα (*) (εντονώς το είδος του πολυετούς ζάνινου ως ανατέρω) σε 20-40 λίτρα φεκ. υγρού στο στρέμμα. Όταν τα ζάνινα βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγα μέτρα από αυτή, Ακαλλέργειτης εκτόνωσης: αγέτισμα ζάνινα (*) (αγρυπνότητα και πλατύσφυλλα) με 150-200 κ.εκ. σε 20-40 λίτρα φεκ. υγρού στο στρέμμα, για Μολόχα (Malva sp.), Τουκούνιδα (Urtica sp.), Πολύγονο (Polygonum sp.), Αντράκια (Portulaca oleracea) με 400-600 κ.εκ. σε 20-40 λίτρα φεκ. υγρού στο στρέμμα. Όταν τα ζάνινα βρίσκονται στο στόχο της ζωρτζιάς τους ανάπτυξης (εντονώς το είδος του πολυετούς ζάνινου ως ανατέρω) με 500-1000 κ.εκ. (αντοχή με το είδος του πολυετούς ζάνινου ως ανατέρω) σε 20-40 λίτρα φεκ. υγρού στο στρέμμα. Όταν τα ζάνινα βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγα μέτρα από αυτή, για Ζυλαύδες θάμνου, Βάτα (Rubus sp) με 500-1000 κ.εκ. σε 20-40 λίτρα φεκ. υγρού στο στρέμμα. Όταν τα ζάνινα βρίσκονται από την άνθηση με 4000-1000 κ.εκ. σε 20-40 λίτρα φεκ. υγρού στο στρέμμα. Κοντά ή κατά την άνθηση των ζάνινων, Κατά μήκος αρπελτικών και στραγγυντικών καναλιών, Υδρόχορη ζάνινα με 800-1000 κ.εκ. σε 20-40 λίτρα φεκ. υγρού στο στρέμμα. Κοντά ή κατά την άνθηση των ζάνινων, Μέγιστος αριθμός εφαρμογής / καλλιέργειτη περίοδος: Εσπεριδοειδή-Ακρόδρυα-Μήλοιδες-Καπνός-Ακαλλέργειτης εκτόνωσης για επιστρέψαντα και Ελιές για Κύπερο: 2. Πυρηνόκρατος-Αρπελτικό-Ελασ-Βαμβακό-Αγροί μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας και την ανάπτυξη του εδάφους για σπόρους-Ακαλλέργειτης εκτόνωσης για Τουκούνιδα και Ζαλόδες θάμνους-Κατά μήκος αρπελτικών και στραγγυντικών καναλιών (Υδρόχορη ζάνινα): 1. (*) για την καταπολέμηση των επιτραπέζιων αποτάσσουν συμβούλια με δύο διαφορικές (χειρωνα-ανοιχή ή/και (καλοκαιρι-θεύντωρ) ανάλογα με την εποχή εμφάνισης των ζάνινων και την καλλιέργεια στα ζάνινα βρίσκονται στο στόχο της ζωρτζιάς τους ανάπτυξης, (**). Για την καταπολέμηση πολυετών ζάνινων αποτάσσουν συμβούλια με εφαρμογή όταν τα ζάνινα βρίσκονται κοντά στην άνθηση κατά την ουσίωση ή λίγα μέτρα από αυτή, (***) Στα βαθύδια του φεκούσας πρέπει να είναι κατευθύνουμενοι μεταξύ των οργανισμών πριν την έναρξη της ανάπτυξης της καλλιέργειας. Τα σταγνωμένα του φεκούσα που δεν πρέπει να έρχονται σε εποποιημένους οπωρώνες ή ωμητικές από το τρίτο (3) έτος από την φυτεύση τους και μετά, ανάλογα με την ανάπτυξη των φυτών, 2) Για τα πλατύσφυλλα ζάνινα Malva spp. (μολύρες), Urtica spp. (τουκούνιδα), Polygonum spp. (πολύκαρπη, λαστάρια), Portulaca oleracea (αντράκι), Η ζωρτζιά που γίνεται μετά το έσβιλμα της καρφιτσής, 3) Για την αγριάδα, η εφαρμογή θα γίνεται μετά των έξι μήνων 15-30 εκσπότη. 4) Για την φερνίγη η γενετιά που γίνεται μετά το έσβιλμα της καρφιτσής, 5) Να μην γίνεται φεκούσας, αν αναμένεται βροχή ή 6 άρες, 6) Να μην γρηγοριούνται σε καλλιέργειες, που προσφέρονται για σποροφαρμάτηση, 7) Μην φεκάστε σταν φυσεί. 8) Μην την χρησιμοποιήστε σε καλλιέργειες, που παρήγαν υπέροχα βρώσιμα προϊόντα πριν τη συγκομιδή τους, 9) Για της επιπροσδεις ελιές επιτρέπεται η ουλογή των μόνο από το δενδρό, 10) Η εφαρμογή για γίνεται όταν δεν υπάρχει νερό στα στραγγιστικά κανάλια.

SATELITE 36SI

**Διασυστηματικό, μη εκπειρευτικό ζιζανιοκτόνο
via την καταπολέμηση επιστρέψαντων και ποθυτεών (αγρωτιστικών,
πλατύσφυλλων ζιζανιών) και υδροχαρών ζιζανιών,
ξυλωδών φυτών, καθώς και για την καταπολέμηση
της οροβάγχης του καπνού.**

GLYPHOSATE (ΓΛΙΦΟΣΕΪΤ) 56% • Πικνό διάσπαμα (SL)

Αριθμ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: 7954/1-3-2011



ΕΠΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Glyphosate οξύ: 36% β/θ (υπό μορφή μάρτιος ισοπροπολιμάνιο: 48,6% β/θ) Βοηθητικοί ουσίες: 55,7% β/θ

Απορροφάται από τα φύλλα και τους τρυφερούς βλαστούς των ζιζανιών και παρεμποδίζει το ένζυμο EPSPS αναστέλλοντας την βιοσύνηση των αρωματικών αμινοζεινών.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες
Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς,
με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

H FARMA-CHEM SA
Εφαρμόζει παπούοποιημένο
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
ISO 9001

Μέλος της:
ECCA
European Crop Care Association

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
1 λίτρο

FARMA - CHEM SA

Κάτοχος της έγκρισης:

AFRASA

INDUSTRIAS AFRASA, S.A.
Ciudad de Sevilla, 53 - 46988 Pol. Ind. Fuente del Jarro - PATERNA (Valencia) Spain
Tf. 96 132 17 00 - FAX 96 132 17 16 - E-mail: afrasa@afrasa.es

Προβαλλόμενος: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. • Μην αναπνεύετε εκνεύφασμα. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε ή μετά το πρώτο. • Φοράτε καπαλλάρες ψηφιδών. • Ως εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατικά ενδύματα και καπέλλας μποτές εσωτερικού σε πεδιά που προστατεύουν την ψούση. • Σε περιπτώσεις εκρήξεως θα πολεμήσετε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΙΑΣΕΩΝ η ένα γιαρέ. • Σε περιπτώσεις επορίας με το δέρμα Αφοράτε το εποπτόμενα με το φεκούσα υγρό ρούχα και πάνετα καλά το προστέμνεται μέρη του σώματος με νερό και άσπρο. • Σε περιπτώσεις επορίας με τη μάτια: Εποπτάστε τα μάτια με νερό αφέκτωση ζάνινα. • Σε περιπτώσεις επορίας με τη μύτη: Εποπτάστε τη μύτη με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την αναπνοή: Εποπτάστε την αναπνοή με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την ράγη: Εποπτάστε την ράγη με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την στοματική ράγη: Εποπτάστε την στοματική ράγη με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την αναπνοή: Εποπτάστε την αναπνοή με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την ράγη: Εποπτάστε την ράγη με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την στοματική ράγη: Εποπτάστε την στοματική ράγη με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την αναπνοή: Εποπτάστε την αναπνοή με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την ράγη: Εποπτάστε την ράγη με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την στοματική ράγη: Εποπτάστε την στοματική ράγη με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την αναπνοή: Εποπτάστε την αναπνοή με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την ράγη: Εποπτάστε την ράγη με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την στοματική ράγη: Εποπτάστε την στοματική ράγη με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την αναπνοή: Εποπτάστε την αναπνοή με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την ράγη: Εποπτάστε την ράγη με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την στοματική ράγη: Εποπτάστε την στοματική ράγη με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την αναπνοή: Εποπτάστε την αναπνοή με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την ράγη: Εποπτάστε την ράγη με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την στοματική ράγη: Εποπτάστε την στοματική ράγη με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την αναπνοή: Εποπτάστε την αναπνοή με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την ράγη: Εποπτάστε την ράγη με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την στοματική ράγη: Εποπτάστε την στοματική ράγη με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την αναπνοή: Εποπτάστε την αναπνοή με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την ράγη: Εποπτάστε την ράγη με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την στοματική ράγη: Εποπτάστε την στοματική ράγη με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την αναπνοή: Εποπτάστε την αναπνοή με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την ράγη: Εποπτάστε την ράγη με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την στοματική ράγη: Εποπτάστε την στοματική ράγη με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την αναπνοή: Εποπτάστε την αναπνοή με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την ράγη: Εποπτάστε την ράγη με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την στοματική ράγη: Εποπτάστε την στοματική ράγη με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την αναπνοή: Εποπτάστε την αναπνοή με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την ράγη: Εποπτάστε την ράγη με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την στοματική ράγη: Εποπτάστε την στοματική ράγη με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την αναπνοή: Εποπτάστε την αναπνοή με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την ράγη: Εποπτάστε την ράγη με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την στοματική ράγη: Εποπτάστε την στοματική ράγη με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την αναπνοή: Εποπτάστε την αναπνοή με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την ράγη: Εποπτάστε την ράγη με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την στοματική ράγη: Εποπτάστε την στοματική ράγη με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την αναπνοή: Εποπτάστε την αναπνοή με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την ράγη: Εποπτάστε την ράγη με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την στοματική ράγη: Εποπτάστε την στοματική ράγη με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την αναπνοή: Εποπτάστε την αναπνοή με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την ράγη: Εποπτάστε την ράγη με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την στοματική ράγη: Εποπτάστε την στοματική ράγη με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την αναπνοή: Εποπτάστε την αναπνοή με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την ράγη: Εποπτάστε την ράγη με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την στοματική ράγη: Εποπτάστε την στοματική ράγη με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την αναπνοή: Εποπτάστε την αναπνοή με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την ράγη: Εποπτάστε την ράγη με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την στοματική ράγη: Εποπτάστε την στοματική ράγη με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την αναπνοή: Εποπτάστε την αναπνοή με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την ράγη: Εποπτάστε την ράγη με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την στοματική ράγη: Εποπτάστε την στοματική ράγη με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την αναπνοή: Εποπτάστε την αναπνοή με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την ράγη: Εποπτάστε την ράγη με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την στοματική ράγη: Εποπτάστε την στοματική ράγη με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την αναπνοή: Εποπτάστε την αναπνοή με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την ράγη: Εποπτάστε την ράγη με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την στοματική ράγη: Εποπτάστε την στοματική ράγη με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την αναπνοή: Εποπτάστε την αναπνοή με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την ράγη: Εποπτάστε την ράγη με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την στοματική ράγη: Εποπτάστε την στοματική ράγη με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την αναπνοή: Εποπτάστε την αναπνοή με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την ράγη: Εποπτάστε την ράγη με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την στοματική ράγη: Εποπτάστε την στοματική ράγη με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την αναπνοή: Εποπτάστε την αναπνοή με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την ράγη: Εποπτάστε την ράγη με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την στοματική ράγη: Εποπτάστε την στοματική ράγη με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την αναπνοή: Εποπτάστε την αναπνοή με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την ράγη: Εποπτάστε την ράγη με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την στοματική ράγη: Εποπτάστε την στοματική ράγη με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την αναπνοή: Εποπτάστε την αναπνοή με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την ράγη: Εποπτάστε την ράγη με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την στοματική ράγη: Εποπτάστε την στοματική ράγη με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την αναπνοή: Εποπτάστε την αναπνοή με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την ράγη: Εποπτάστε την ράγη με νερό για 15 λεπτά. • Σε περιπτώσεις επορίας με την στοματική ρ