

Τρόπος εφαρμογής: Ομοιόμορφος μεταφυτρωτικός ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα. Χρησιμοποιείστε ακροφύσια μεtek τύπου σκόπιας και ψεκάστε με πίεση μικρότερη από δύο (2) ατμόσφαιρες (30 PSI).

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι την μέση με νερό. Προσθέστε την συστασμένη δόση σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδευόμενος. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την αναδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυθίο. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυθίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με νερό και απορριπτικά αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και ξεπλύνετε καλά τρεις φορές με καθαρό νερό. Πριν το έναρξηχρησιμοποίησης ξεπλύνετε το πάλι με άθρονο καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία σκευάσματος ξεπλύνονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύνμα (το νερό του ξεπλύνματος τα ρέχουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρίπτημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, ενσιποθίζονται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Πεδίο Εφαρμογής/Στόχος/Δόσεις σκευάσματος/ Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο.

Χεμερινά σπηρά και Ανοιξιάτικα σπηρά (σπάρη, Κριθάρι, Βρώμη, Σίκαλη) : Μία εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων με 100 κ.εκ. ανά στρέμμα σε 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα.

Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Χεμερινά σπηρά: Εφαρμόζεται μεταφυτρωτικά από την εμφάνιση του πρώτου κόμβου (αρχή καλαμίσματος) έως το στάδιο του φύλλου σημεία BBCH 31-39. Ανοιξιάτικα σπηρά: Εφαρμόζεται χωρίς μεταφυτρωτικά από το στάδιο των 3 πραγματικών φύλλων έως την εμφάνιση του δεύτερου κόμβου (αρχή καλαμίσματος) BBCH 13-32.

Παρατηρήσεις: 1. Τα ζιζάνια ψεκάονται σε νεαρά στάδια έως τα 20 – 30 εκ ύψος ενώ βρίσκονται σε γρήγορη ανάπτυξη. 2. Για την αποφυγή της διασποράς των ψεκαστικών σταγονιδίων σε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες, μην ψεκάετε όταν φυσάει. 3. Μην ψεκάετε αν αναμένεται βροχή σε 5 ώρες από την εφαρμογή. 4. Μην ψεκάετε όταν η θερμοκρασία είναι μικρότερη από 10°C ή μεγαλύτερη από 25°C. 5. Μην ψεκάετε όταν επικρατούν συνθήκες καταπόνησης των καλλιεργειών, όπως παρατεταμένη ξηρασία, νεκροκατμήματα, παγωνιά, ισχυροί ψυχροί άνεμοι ή όταν τα φυτά έχουν υποστεί ζημίες κ.α. **Καταπολέμηση ζιζανίων:** Ευαίσθητα ζιζάνια: Αναγούλα (Anagallis arvensis), Κομψέλα (Capsella bursa-pastoris), Κενταύριον (Centaurea cyanus), Λουμπούδι (Chenopodium album) Περικολάδα (Convolvulus arvensis), Κολοκώτιδα μεγалоκόρητη (Galium aparine), Γεράνι (Geranium dissectum), Καντόχορτο (Fumaria officinalis), Λάιμο (Lamium spp.), Χαμομήλι (Matricaria spp.), Παπαρούνα κοινή (Papaver rhoeas), Παπανίδα (Raphanus raphanistrum) Λάιθο (Rumex sp), Μαρτάκι (Senecio vulgaris), Ζυχός (Sonchus arvensis), Σπέργυλα (Spergula arvensis), Στελλάριδα (Stellaria media), Βερβόνας (Veronica spp.), (Ridolfia segatum), **Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:** Ανθεμίδα (Anthemis arvensis), Καρδαμίνια (Cardamine hirsuta), Κεράσιον (Cerastium spp.), Κίρσιον (Cirsium arvense), Πικρίς (Pictis/Helminthotheca echinoides), Πολυκόμμη (Polygonum aviculare).

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Διοχείριση Ανθεκτικότητας. Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατόν και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης), για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και - σποράς ή φύτευσης της προστεσούμενης καλλιέργειας: Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας είναι δυνατή η επανασπορά, 4 εβδομάδες μετά την εφαρμογή του σκευάσματος.- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, μετά την άρση να μην καλλιεργηθούν ευαίσθητα φυτά όπως τομάτα, τεύτλα, βαμβάκι, - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

Shardalim

(ομάδα φαινοξυαλκανοϊκών) - Πυκνό διάλυμα (SL)

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΔΑΑ): 70.375/28.01.2020
Εγγυημένη σύνθεση: Δραστική ουσία: MCPA οξύ 75 % β/ο
(υπό μορφή αλάτος διμεθυλαμίνης 91,85 % β/ο) - Βοηθητικές ουσίες 20,6 % β/β

Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο της ομάδας των φαινοξυαλκανοϊκών για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων σε Χεμερινά και Ανοιξιάτικα σπηρά. Απορροφάται κυρίως από τα φύλλα των ζιζανίων, μετακινείται διασυστηματικά μέσα στους φυτικούς ιστούς δια μέσου συμπλήξης και αποβάλλεται και συγκεντρώνεται στους νεαρούς μεριστωματικούς ιστούς όπου αντισταθεί τον κανονικό ρυθμό αύξησης των κυττάρων. Προκαλεί επανάπτυξη και ασύμμετρη ανάπτυξη των φυτών με χαρακτηριστική συστροφή και παραμόρφωση νεαρών φύλλων και βλαστών.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. ΠΡΟΤΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Επιβλαβές σε περίπτωση κατάπτωσης.
- Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
SHARDA BALKAN ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. Μοναστηρίου 9,
Τ.Κ. 54627, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 6946144719

Παρασκευαστής σκευάσματος: SHARDA CROPCHEM LIMITED
Κάτοχος της άδειας:
Sharda Cropchem Espana S.L. Edificio Atalayas Business Center,
Camí Condominia n1 3, 12th Floor,
30006 Murcia, Ισπανία, Tel. + 34 868127589,
e-mail: e.nieto@shardaintl.com, regn@shardaintl.com



Διανομή:
FARMA-CHEM SA
ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ - Γ' ΩΣ 1026 - 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 569.630 έως 3 - FAX: 2310 797.047
info@famachem.gr - www.famachem.gr

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΤΗΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΗΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. • Ξεπλύνετε το στόμα. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους αν εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. • Εάν δεν υποχρεού ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό. • Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα, στον καθαρό αέρα. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άθρονο νερό και σαπούνι. Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΗΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777

Δηλώσεις προφύλαξης:

- Φυλάσσετε κλειδωμένα. Μακριά από παιδιά. • Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Φοράτε προστατευτικά ενδύματα /μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια κατά την ανάμιξη /φόρτωση και προστατευτικά ενδύματα κατά την εφαρμογή. Σε περίπτωση επανεισοδου μετά τον ψεκασμό οι εργάτες πρέπει να φορούν μακρομάνικο πουκάμισο και μακρό παντελόνι. • Διάθεση περιεχομένου/περιεχτή σύμφωνα με την Εθνική νομοθεσία • Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. • Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήνετε μία φυτική ζώνη ανάλογης, 10 μέτρων από επιφανειακά νερά, σε χειμερινά σπηρά. • Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήνετε μίαν αφέακτη ζώνη προστασίας από μη γεωργική γη, 10 μέτρων σε συνδυασμό με την χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψ.μ. κατά 50% ή 5 μέτρων σε συνδυασμό με την χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψ.μ. κατά 75%. Δεν απαιτείται αφέακτη ζώνη προστασίας όταν ψεκάετε με ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψ.μ. κατά 90% • Για να αποφεύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Στοιχεία φυτοεξήκησης, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Το σκεύασμα δεν είναι φυτοεξόξο στις συνδυασμένες καλλιέργειες και δόσεις και στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. **Μεταυλιτική επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μεταυλιτικές χρήσεις (ημέρες):** Δεν ορίζεται. Καλύπτεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας κατά την εφαρμογή. **Συνθήκες αποθήκευσης: χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:** Στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, και καλά αεριζόμενο, παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

 Περιεχόμενο: **1 λίτρο**

ΑΡ. ΠΑΡΤ.ΗΜ. ΠΑΡΑΓ./ΗΜ ΑΠΕ.: Βλέπε επί της συσκευασίας