



Προέλευση Αυστραλίας:

agrichem®

# supa bor

ΛΙΠΑΣΜΑ Ε.Κ.

Εγγυημένη σύνθεση:

Βόριο (Β) Υδατοδιαλυτό 8,3% ββ, 10% βιο (Cas No.10043-35-3) ως Βοριούχος αθιολογαμίνη

Εξειδικευμένο σκεύασμα για διόρθωση τροφολογιών βορίου.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα.
- Μπορεί να βλάψει το έμβρυο.
- Φυλάσσετε κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.



FARMA-CHEM SA

Αποκλειστική διανομή για την Ελλάδα:

FARMA-CHEM SA

ΒΙΛΓΕ. ΣΠΙΝΔΟΥ - Γ' ΣΩΝΗ - Τ.Θ. 1026

570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ: 2310 569.630 έως 3 - FAX: 2310 797.047

info@farmachem.gr - www.farmachem.gr

Προσοχή:

• Εξοικονομήστε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προσοχής. • Χρησιμοποιείτε μόνο σημεία προστασίας όταν απαιτούνται. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΣΕΛΗΣ ή ΠΑΘΗΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γαστρί.

• Διάθεση του παρασκευάσματος/παρατίτλου σύμφωνα με τους τοπικούς/ διεθνείς κανονισμούς.

• Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. • Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Τηλ. Κέντρου Δελιτηράδων: 210 77 93 777

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Είναι σε μορφή πακνίου αναμετρήσιμου.
- Έχει μικροσφαιρίδια που διασφαλίζουν ομοιόμορφη κατανομή και χρήση και αποτελεσματική απορρόφηση από το φυτό.
- Μπορεί να εφαρμοστεί μαζί με μεγάλη γκάμα αγροχημικών, μελώνοντας τον αριθμό και το συνολικό κόστος των φυτοφαρμάκων.
- Η ειδική του φόρμουλα καθιστά πιο εύκολη την διασπορά του μέσα στα φυτοκλιμακίδια και στις δεξιμένες αναμειγνύμενες αέραιες.

**Γιαρτοκάρνο-Πυρεθροκάρνο:** Συστήνεται 3 φορές/αι από το φυτοκλίμακιο των αειθαλών μέχρι πριν την άνθηση β) στην πύκνωση των πατάκων και γ) μετά τη συγκομιδή. Δόση: 100-200 κ.κ./100 λίτρα νερό. **Ελιά:** Συστήνεται 1 φορά/αι πριν την έναρξη της άνθησης, στην καρπόδεση και μετά τη συγκομιδή. Δόση: 100-200 κ.κ./100 λίτρα νερό.

**Αμπέλι (επιτραπέζιο, αναψοκάρνο, σποράδι):** Συστήνεται 1 φορά/αι στην έναρξη των ανθοκλιμακίων, στο εξορισμό των ανθοκλιμακίων και στην καρπόδεση. Δόση: 100-200 κ.κ./100 λίτρα νερό. **Εσπεριδοειδή:** Συστήνεται 1 φορά/αι πριν την άνθηση β) στην καρπόδεση και στην ανάπτυξη των καρπών. Δόση: 50-100 κ.κ./100 λίτρα νερό. **Αμυγδαλιές:** Συστήνεται 1 φορά/αι πριν την άνθηση, στην καρπόδεση και μετά τη συγκομιδή. Δόση: 100-200 κ.κ./100 λίτρα νερό.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες  
Φυλάσσετε κλειδωμένο και μακριά από παιδιά

"Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελματία χρήστη εφόσον ζητηθεί"



**Κιτριανά (Πατάτα, Πεπόνι, Αγγούρι, Μελιτζάνα, Καλαμπόκι, Πεπόνι, Κορνόφι), Κουρούτι, Μελιτζάνα, Λιχνοειδή:** Συστήνεται 1 φορά/αι στο 40-60 φύλλο και επανάληψη όποτε απαιτείται. Δόση: 100-200 κ.κ./100 λίτρα νερό. **Φρούτα:** Συστήνεται 1 φορά/αι στην έναρξη της άνθησης και επανάληψη 14 ημέρες μετά, σε δόση 100-200 κ.κ./100 λίτρα νερό. **Ελαστροειδή, Σαρκώδη:** Συστήνεται 1 φορά/αι στο 40-60 φύλλο και επανάληψη όποτε απαιτείται. Δόση: 100-200 κ.κ./100 λίτρα νερό. **Φασόλια, Φασολάκια, Καρότι, Κερασιές:** Συστήνεται 1 φορά/αι στα 15 εκ. ύψος φυτού ή εφόσον υπάρχει επαρκής φυλλώδη επιφάνεια. **Πατάτες:** Συστήνεται 1 φορά/αι 3-4 εβδομάδες μετά το φύτεμα και 14 ημέρες μετά την κνοδολογήση, σε δόση 100-200 κ.κ./100 λίτρα νερό. **Όσπρια:** Συστήνεται 1 φορά/αι στο 40-50 φύλλο. Δόση: 100-200 κ.κ./100 λίτρα νερό. **Βερίκοκο:** Συστήνεται 1 φορά/αι στο 40-60 φύλλο στην εμφάνιση των καρπών σε δόση 100-200 κ.κ./100 λίτρα νερό. **Σητάρι:** Συστήνεται 1 φορά/αι στο αόλωνμα σε δόση 100-200 κ.κ./100 λίτρα νερό. **Υδροκίονιστρο:** Δόση 250-400 κ.κ./στρ. στα αντίστοιχα στάδια. **Θαλασσοειδή:** 100-200 κ.κ./100 λίτρα νερό στα αντίστοιχα στάδια των υπαζώνων καλλιέργειας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οι προτεινόμενες δόσεις είναι καθαρά ενδεικτικές και μεταβάλλονται ανάλογα με τη θερμοκρασία, την υγρασία καθώς και από το εδαφικό pH, την επίδραση νερού κ.τ.λ. Να αποφεύγεται η χρήση σε κρύα και κρύα καιρούς. Αποκρίνετε καλά πριν τη χρήση. Οι εφαρμογές συστήνονται να γίνονται νωρίς το πρωί ή το απόγευμα. Μην υπερβαίνετε τις συνιστώμενες δόσεις. Συστήνεται η εφαρμογή του μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της ετικέτας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση είναι ευθύνη του εφαρμοστή. ΠΡΟΣΟΧΗ! Να μην εφαρμόζονται όταν υπάρχει δραστηριότητα μελισσών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Είδος βάρους: 1,19-1,21, pH 6-7

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Επικοινωνήστε με τους κατά τόπους γεωπόνους.

ΣΥΝΗΘΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Στην αρχή του συσκευασίας, κλειστό σε δροσερό και καλά αεραζόμενο χώρο.

ΑΡ. ΠΑΡΤΑΝΗΜ. ΠΑΡΑΓ.ΗΜ ΑΔΕ: Βλέπε επί της συσκευασίας



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1lt ή 1,2 κιλά