ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ SUPA K 30

- Οργανικό κάλιο για την άμεση απορρόφηση με σκοπό την ενδυνάμωση του φυτού.
- Το κιτρικό κάλιο μεταβάλλεται γρήγορα σε υδρογονάνθρακες οι οποίοι συντελούν στην ωρίμανση και στην βελτίωση της ποιότητας των παραγώμενων προϊόντων.
- Απόλυτα διαλυτό και διαθέσιμο στα φυτά μεταφέροντας την απαιτούμενη ποσότητα θρεπτικών στοιχείων με μικρό ποσοστό εφαρμογών.
- Η υψηλή συγκέντρωση του προϊόντος μειώνει την ποσότητα εφαρμογής και το κόστος συσκευασίας και μεταφοράς.
- Η ειδική του φόρμουλα καθιστά πιο εύκολη την διασπορά του μέσα στα ψεκαστικά υλικά και στις δεξαμενές αναμείξεως και άρδευσης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:
Ειδικό βάρος: 1.45 kg/lt, **Χρώμα:** Διαυγές πράσινο/καφέ, **pH:** 8,5-9.

Αποθηκεύεται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο περιβάλλον, μακριά από υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και το άμεσο ηλιακό φως.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Συνδυάζεται με τα περισότερα φυτοφάρμακα και υδατοδιαλυτά σκευάσματα. Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα που περιέχουν ασβέστιο και μαγνήσιο. Όταν γίνεται συνδυασμός με φυτοφάρμακα να ακολουθούνται οι οδηγίες των αντίστοιχων φαρμάκων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ:
Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση.
Κατάλληλο για εφαρμογή: Διαφυλλικά, Υδρολίπανση, Αεροψεκασμό.

06/2018

Supa K 30™

30% ΚΙΤΡΙΚΟ ΚΑΛΙΟ

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
Κάλιο ως κιτρικό: 30% β/ο ή K_2O 24.8% β/β
Αρ. Κυκλοφορίας: 50/13-11-2009

Άμεσα διαθέσιμο κάλιο σε κιτρική μορφή για εφαρμογή στο γέμισμα του καρπού και την ωρίμανση.

K 30

Προέλευση: AGRiCHEM Αυστραλίας

AUSTRALIAN MADE

agrichem

Αποκλειστική διάθεση για την Ελλάδα:
FARMA - CHEM SA
ΔΙΕΥΘ. ΓΡΑΦΕΙΩΝ & ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ: ΒΙ.ΠΕ.Θ. Γ' ΖΩΝΗ
ΤΗΛ.: 2310 569 630 εως 33 FAX: 2310 797 047
Τ.Θ. 1026 ΒΙ.ΠΕ.Θ. - Τ.Κ. 570 22 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
www.farmachem.gr, E-mail: info@farmachem.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1,45kg ή 1lt

Μέλος του: ECCA european crop care association

ISO 9001 Η FARMA-CHEM SA Εφαρμόζει Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

FARMA-CHEM SA

Προφυλάξεις: ● Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. ● Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. ● Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
Πρώτες βοήθειες: ● **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. ● Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς - εθνικούς - διεθνείς κανονισμούς.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ - ΔΟΣΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Βαμβάκι: Διαφυλλική: Από το 5ο φύλλο μέχρι το πρώτο λουλούδι: 200cc/στρέμμα. Από το πρώτο λουλούδι μέχρι το δέσιμο των πρώτων καρπιδίων: 500cc/στρέμμα.
Κολοκυνθοειδή: 700cc/στρέμμα. Εφαρμόστε στο γέμισμα του καρπού και στην ωρίμανση.
Μεγάλη Καλλιέργεια: Μπιζέλια, Βρώμη, Ηλίανθοι, Σιτάρι: 300cc/στρέμμα. Εφαρμογή για τη διόρθωση τροφοπενιών.
Πατάτες: 700cc/στρέμμα. Εφαρμόστε κατά το γέμισμα του κονδύλου.
Δενδρώδεις Καλλιέργειες: Αβοκάντο, Εσπεριδοειδή, Μακαντέμια, Μηλοειδή και Πυρηνόκαρπα, Τροπικά φρούτα: Διαφυλλική: 500cc/100lt νερό. **Υδρολίπανση:** 2lt/στρέμμα. Εφαρμόστε κατά το γέμισμα του καρπού και την ωρίμανση.
Χλοοτάπητας: 200cc/100m². Εφαρμόστε για ενδυνάμωση του τάπητα και βελτίωση του χρώματος. Προστατεύει από τον παγετό και αυξάνει την αντοχή στις ασθένειες.
Λαχανικά: Διαφυλλική: 700cc/στρέμμα. **Υδρολίπανση:** 1,5lt/στρέμμα. Εφαρμόστε κατά το γέμισμα καρπού και κατά την ωρίμανση.
Αμπέλια: 150cc/100lt νερό. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** η εφαρμογή στα σταφύλια πρέπει να γίνεται προσεχτικά. Όταν εφαρμόζεται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, το SUPA K 30 μπορεί να βλάψει την άνθηση. Πάντα ψεκάζετε δοκιμαστικά σε μια μικρή περιοχή.
Μπανάνες: Αεροψεκασμός: 300cc/στρέμμα. **Από έδαφος:** 500-700cc/στρέμμα. ΔΕΝ εφαρμόζεται σε ακάλυπτα νεαρά φυτά, γιατί μπορεί να λάβει χώρα φυτοτοξικότητα. ΜΗΝ εφαρμόζετε το SUPA K 30 με χαλκούχα σκευάσματα ή σε φυτά με κατάλοιπα χαλκού. Εφαρμόστε το SUPA K 30 μόνο του ανά 14 ημέρες τουλάχιστον 2 φορές πριν την άνθηση.

Παρατηρήσεις: ● Οι προτεινόμενες δόσεις είναι καθαρά ενδεικτικές και μεταβάλλονται ανάλογα με την θερμοκρασία, την ηλιοφάνεια καθώς και από το εδαφικό pH. ● Σε διαφυλλικές εφαρμογές θα πρέπει να χρησιμοποιείται η ελάχιστη δόση όταν η θερμοκρασία και η ηλιοφάνεια βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα ενώ σε υδρολίπανση όταν εφαρμόζουμε δυσκίνητα στοιχεία, χρησιμοποιούμε τη μέγιστη δόση όταν έχουμε αλκαλικά εδάφη.