

Πεδίο εφαρμογής - Στόχος - Δόσεις - Τρόπος & Χρόνος εφαρμογής:

ΚΑΡΟΤΟ, ΑΡΑΚΑΣ, ΟΣΠΡΙΑ (ΡΕΒΥΘΙΑ ΦΑΣΩΛΙΑ ΚΟΥΚΙΑ), ΣΤΑΡΙ, ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ: Για επίστια αγρωτιώδη και πλατύφυλλα ζήζαντα με 400-600 κ.εκ./στρέμμα. Προφυτωτικά της καλλιέργειας (επιφανειακά μέσως μετά την σπόρα).

ΦΑΚΗ (Χρήση ήσονς σημαστας): Για επίστια αγρωτιώδη και πλατύφυλλα ζήζαντα με 400 κ.εκ./στρέμμα. Προφυτωτικά της καλλιέργειας (επιφανειακά μέσως μετά την σπόρα).

ΜΑΙΝΤΑΝΟ, ΦΥΛΑΔΑ ΑΝΗΙΟΥ (Χρήση ήσονς σημαστας): Για επίστια αγρωτιώδη και πλατύφυλλα ζήζαντα με 300-500 κ.εκ./στρέμμα. Προφυτωτικά της καλλιέργειας (επιφανειακά μέσως μετά την σπόρα).

ΠΑΤΑΤΑ: Για επίστια αγρωτιώδη και πλατύφυλλα ζήζαντα με 400-600 κ.εκ./στρέμμα. Προφυτωτικά της καλλιέργειας (επιφανειακά μέσως μετά την σπόρα).

ΚΡΕΜΜΥΔΙ, ΣΚΟΡΔΑ: Για επίστια αγρωτιώδη και πλατύφυλλα ζήζαντα με 400-500 κ.εκ./στρέμμα. Νωρίς μεταφυτωτικά της καλλιέργειας.

ΤΟΜΑΤΑ, ΠΙΠΕΡΙΑ, ΛΑΧΑΝΟ, ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ, ΜΑΡΟΥΛΗ, ΡΑΔΙΚΙ: Για επίστια αγρωτιώδη και πλατύφυλλα ζήζαντα με 400 κ.εκ./στρέμμα. Είτε αγρωτιώδη μετά την σπόρα.

ΣΠΑΡΑΤΗ: Για επίστια αγρωτιώδη και πλατύφυλλα ζήζαντα με 500-600 κ.εκ./στρέμμα. Προφυτωτικά: ο) είτε στην επιφάνειαν μετά την κατασκευή τους, πριν την κώλυψη με πλαστικό. Β) είτε στην επιφάνεια του ισοπεδωμένου εδάφους (μετά τέλος της συκομοκής και την καταστροφή των ασημάνων). Το αργότερο μετά την ίσιωση.

ΑΓΚΙΝΑΡΑ: Για επίστια αγρωτιώδη και πλατύφυλλα ζήζαντα με 400-500 κ.εκ./στρέμμα. Πριν τη μεταφύτευση με ενωμάστηση σε γκρεμοτείχη φυτών πάνω στην άνθηση των γραμμών, και μετά τη διατέλεση παράχωμα του καθευδήσαντος περιβάλλοντος.

ΒΑΜΒΑΚΙ, ΣΟΥΤΑ, ΗΛΙΑΝΘΟΣ, ΑΡΑΧΙΔΑ: Για επίστια αγρωτιώδη και πλατύφυλλα ζήζαντα με 400-600 κ.εκ./στρέμμα. Προστριπτικά με ενωμάστηση τη προφυτωτικά της καλλιέργειας (επιφανειακά μέσως μετά την σπόρα).

ΚΑΠΝΟΣ (στα ζιζανιούκτα): Για επίστια αγρωτιώδη και πλατύφυλλα ζήζαντα με 400-600 κ.εκ./στρέμμα. Πριν η μεταφύτευση των γραμμών, και μετά τη διατέλεση παράχωμα του καθευδήσαντος περιβάλλοντος πάνω στην άνθηση των γραμμών.

ΚΑΠΝΟΣ (στα αντιπυλίζακτα των Αμερικανικών καπνών Μπέρλει και Βιρτζίνια): Για παρεμπόδιση ανάπτυξης μισαχαλιών φυτών μεταξύ 20-50 μεγάλης της καλλιέργειας.

Ογκός κεφαλής (Αλπρόστρεμπτα): 20-50 για λόγο της καλλιέργειας.

Μέγιστος όριος εφαρμογών ανά καλλιέργεια: 1 εφαρμογή για όλες τις καλλιέργειες.

Καταπολεμώμενο ζιζανία: Επήνια Αγρυπνώστη Ζιζαία: Ευοιδήτη ζιζαία: Βέλιουρα από σπόρο (*Sorghum halepense*), Μίλιο (*Milium sp.*), Φετούκια (*Festuca sp.*), Κεράι (*Panicum sp.*), Ελεύθενη (*Eleusine indica*), Ήρα (*Lolium multiflorum*), Μουριάτα (*Echinocloa crus-galli*), Αλεπούνια (*Alopex myosuroides*), Κοινή πάσια (*Poa annua*), Ανεγάρωπη (*Aprrera spica venti*), Νεραγιάριδα (*Paspalum paspaloides*), Φάλωρ (*Phalaris sp.*), Σεταρία (*Setaria sp.*), Επίσια Πλατύφυλλα ζιζαία: Ευοιδήτη ζιζαία: Στύνωνς (*Solanum nigrum*), Βάλτο (*Amaranthus spp.*), Λουβιδιόνια (*Chenopodium album*), Γλυτρόπια (*Portulaca oleracea*), Ανθέμις (*Anthemis sp.*), Μαργαρίτα (*Chresanthemum sp.*), Ζωάς (*Sonchus oleraceus*), Αγριοκαρδαμόνιο (*Lepidium draba*), Οξαλίδα (*Oxalis pescaruae*), Παπανόνια κοινή (*Papaver rhoeas*), Πολύγωνο (*Bidderdykia convolvulus*), Περικολάδα επτάσια (*Convolvulus arvensis*), Γκάλιο (*Gallium aparine*, Βερόνικα (*Veronica sp.*), Τσουκνίδα (*Urtica sp.*), Αγιροπιτέρια (*Polygonum persicaria*), Adonis spp.

Παραπρήσης: Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων που προέρχονται από αιγαλέωπες στους οποίους έχει γίνει χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος Sharpshen 33 EC.

Α. Η δράση του Sharpshen 33 EC στις επιφανειακές εφαρμογές επιτρέπεται σημαντικά από την έδαφικη υγρασία. Συνιστάται στις περιπτώσεις αυτές πότισμα 24-48 ώρες μετά την εφαρμογή για την ενωμάστηση - «ενεργοποίηση» του ζιζανιούκτου στο έδαφος.

Β. Στο βαμβάκι μετά τη προστηρική εφαρμογή με ενωμάστηση συνιστάται να ακολουθήσει εφαρμογή μεταστριπτικά, προφυτωτικά της καλλιέργειας με μόνιμη ζιζανιούκτη για την δράση της προστηρικής προστασίας.

Γ. Οι μικρότερες δόσεις αναφέρονται σε ελαφριά εδάφη - χαμηλής περιεκτικότητας σε οργανική ουσία ή και μεγαλύτερη πίεση προσβολής. Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται οι μέγιστες δόσεις, και ανάλογα με τη σύσταση/ημέρηση του έδαφου, είναι δυνατό να παρατηρήσετε παροδική καθεύδηση ανάπτυξης των φυτών, επίσης σε συνήθης υψηλής εδαφικής υγρασίας ή και χαρκών θερμοκρασίας.

Δ. Το Sharpshen 33 EC καταπολεμεί τα ζιζανία που φυτρώνουν ή βρίσκονται σε πολύ νεαρό στάδιο (φύτρωμα-κοτύλωδης). Εφόσον υπάρχουν φυτρωμένα ζιζανία θα πρέπει προηγουμένως να καταστρέψουν με σκληρότητα ή καταπόλεμη μεταφυτωτικό ζιζανιούκτη.

Ε. Μην εφαρμόζετε το Sharpshen 33 EC σε θεμέλιο κοπή ή περιεκτικότητας σε οργανική ουσία ή και μεγαλύτερη πίεση προσβολής. Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται οι μέγιστες δόσεις, και ανάλογα με τη σύσταση/ημέρηση του έδαφου, είναι δυνατό να παρατηρήσετε παροδική καθεύδηση ανάπτυξης των φυτών, επίσης σε συνήθης υψηλής εδαφικής υγρασίας.

Ζ. Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες της φακής, του μούτανού και των φωλιών ανέμων από τη χρήση του σκευασμάτος. Για τις εν λόγω χρήσεις ο κάτιος της δέσεις δεν φέρει ευδύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητά ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευασμάτος.

Sharpen 33 EC

Pendimethalin (Πεντιμεθαλίν) ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΜΟ ΥΓΡΟ (EC)

Αριθμός Αδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 70107/11.02.2015
Εγγυημένη Σύνθεση: Pendimethalin 33% β/ο, Βοηθητικές ουσίες: 63,2 % β/β
Περιέχει αρωματικό διαλύτη (νάφθα)

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.

Εκλεκτικό ζιζανιούκτο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων και αγρωτιώδων ζιζανίων κατά το φύτρωμά τους, σε διάφορες καλλιέργειες. Εφαρμόζεται και ως αντιπυλίζακτο καπνού. Στο βιοχημικό επίπεδο επιτρέπει την λειτουργία της μίτωσης με παρεμπόδιση του σχηματισμού των μικροσωλαΐνιστων της μιτωπικής ατρακτου. Δρα δι' επαφής και παρεμποδίζει την ανάπτυξη των μασχαλιών οφθαλμών-φυλλών, που αικολουθεί το κορυφολόγημα των ομερικανικών καπνών Μπέρλει και Βιρτζίνια.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

• Υγρό και αιρούμενο. • Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση καταπόσης και διελύσιμης στις αναπνευστικές δόδιες. • Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. • Προκαλεί σαρώφαρμα και οργανικό καπνού. • Πάνω τούρη για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχειρώδες επιπτώση. • Φύλακες πλευρών και μεταφυτωτικές καλλιέργειες. • Εφαρμόζεται σε πλευρών και στη συνέχεια αιρούμενο καπνοτραφόρο προγύμνασμόν με τρόπη για τη διασφάλιση της μη περάσης χρήσης, επανοπλίζεται σε πλευρά αιρούμενο καπνού για ανάκτηση ενέργειας.

Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμόζεται ανάλογα με τη καλλιέργεια, προστηρικά με ενωμάστηση προφυτωτικά επιφανειακά ή υγρής μεταφυτωτικά. Στην επιφανειακή εφαρμογή σε ζιζανιούκτα φυτών, προστηρικά με πέντε μέσα σε 6-8 μέρες κρείσσαι πότισμα. Επίσης εφαρμόζεται ως αντιπυλίζακτο καπνού χωρίς παραχώματα σε πάνω από τον ίδιο αριθμό της ζιζανιούκτου περιβάλλοντος. Χρησιμοποιείται μετεκτύπωση στο πλευρό της καλλιέργειας.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζεται το ψεκαστικό μέσο με χρήση μερικών λίτρων νερού. Συμπληρώνεται με την εθνική νομοθεσία. Προστηρικά μετεκτύπωση στο πλευρό της καλλιέργειας.

Καροφόρος ψεκαστικού μηχανήματος: Μετά την ψεκασμό είναι παραπίπτωτη η σημερινή καθεύδηση της προστηρικής προστασίας.

Καροφόρος ψεκαστικού μηχανήματος: Μετά την ψεκασμό είναι παραπίπτωτη η σημερινή καθεύδηση της προστηρικής προστασίας.

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

- Εάν δημιουργείται ιατρική συμβούλη, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την επικετα.
- **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗ:** Κάλεστε μερικώς το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή είναι γιατρός. • Μην προκαλέσετε εμπτυσσή με αρθρών περιοχή ή από την προστατευόμενη περιοχή.
- **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Πλύνετε την προστατευόμενη περιοχή με αρθρών περιοχή ή από την προστατευόμενη περιοχή.
- **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Επάντιστε την προστατευόμενη περιοχή με αρθρών περιοχή ή από την προστατευόμενη περιοχή.
- **ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει αντίδοτο.
- **ΤΗΑ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:** Την περιόδο της παρασκευής ή την πρώτη ημέρα στην παθούσα ή τις έναντι μετά την παθούσα ημέρα.

Ειδικές συνήθης γεωργικές, φυτοϊανές ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες θα χρησιμοποιηθεί ή θα αποκλείστε: Διαχείριση ανθεκτικότητας: α) εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική διαθέσιμης, καλλιεργητικά μέτρα κάτω) ώστε να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις αποτολώτικες απαραίτησης. Β) εφαρμογή σε εναλλακτικά ζιζανιότακτα ή άλλα ομόλιδα με διαφορετικό τρόπο δράσης. Το ΜΗΝ εφαρμόζεται στην ποικιλία Ηράκιον και στην ποικιλία στου Παλεόρ.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταφορικής εφαρμογής: Στην περιόδο της παρασκευής ή την πρώτη ημέρα στην παθούσα ημέρα.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φωτοπροτατευτικού προϊόντος: Οι αγρότες πρέπει να απορρίψουν την έδρα της προστηρικής προστασίας με την εθνική νομοθεσία. Πλύνετε την προστηρική προστασία με την εθνική νομοθεσία. Μην μπλύνετε το νερό με την ίδια την προστηρική προστασία. Η προστηρική προστασία μπορεί να αφήσει μια αιμέσωτη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από την επιφανειακή ύδωση με πρινή κώλυψη σε συνδιάσωμα με την κρήτη ακροπολιούσας μελάνης της διατοπούρας του ψεκαστικού υγρού.

Προστηρική επένδυση στην προστηρική προστασία: Η προστηρική προστασία πρέπει να αφήσει μια αιμέσωτη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από την μεγαλύτερη γη της στάδιο.

Προστηρική επένδυση μεταφορικής προστασίας: Η προστηρική προστασία πρέπει να αφήσει μια αιμέσωτη ζώνη προστασίας 5%.

Προστηρική επένδυση στην προστηρική προστασία: Η προστηρική προστασία πρέπει να αφήσει μια αιμέσωτη ζώνη προστασίας 75%.

Προστηρική επένδυση στην προστηρική προστασία: Η προστηρική προστασία πρέπει να αφήσει μια αιμέσωτη ζώνη προστασίας 75%.

Προστηρική επένδυση στην προστηρική προστασία: Η προστηρική προστασία πρέπει να αφήσει μια αιμέσωτη ζώνη προστασίας 75%.

Προστηρική επένδυση στην προστηρική προστασία: Η προστηρική προστασία πρέπει να αφήσει μια αιμέσωτη ζώνη προστασίας 75%.

Προστηρική επένδυση στην προστηρική προστασία: Η προστηρική προστασία πρέπει να αφήσει μια αιμέσωτη ζώνη προστασίας 75%.

Προστηρική επένδυση στην προστηρική προστασία: Η προστηρική προστασία πρέπει να αφήσει μια αιμέσωτη ζώνη προστασίας 75%.

Προστηρική επένδυση στην προστηρική προστασία: Η προστηρική προστασία πρέπει να αφήσει μια αιμέσωτη ζώνη προστασίας 75%.

Προστηρική επένδυση στην προστηρική προστασία: Η προστηρική προστασία πρέπει να αφήσει μια αιμέσωτη ζώνη προστασίας 75%.

Προστηρική επένδυση στην προστηρική προστασία: Η προστηρική προστασία πρέπει να αφήσει μια αιμέσωτη ζώνη προστασίας 75%.

Προστηρική επένδυση στην προστηρική προστασία: Η προστηρική προστασία πρέπει να αφήσει μια αιμέσωτη ζώνη προστασίας 75%.

Προστηρική επένδυση στην προστηρική προστασία: Η προστηρική προστασία πρέπει να αφήσει μια αιμέσωτη ζώνη προστασίας 75%.

Διανοέας:
FARMA-CHEM S.A
ΒΙ. ΣΙΑΣΟΥ - ΓΩΝΙΗ - Τ.Θ.1026
5722 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 569.630 Αντ. 3 - FAX: 2310 797.047
info@farmachem.gr - www.farmachem.gr

Περιεχόμενο: 1 λίτρο