



FARMA-CHEM SA

ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ | Γ' ΖΩΝΗ | Τ.Θ.1026



570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ.: 2310 569.630 έως 33



FAX: 2310 797.047



info@farmachem.gr



www.farmachem.gr



ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

TOUR 2,5 EC

ENTOMOKTONO

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής - στομάχου κατά μυζητικών και μασητικών εντόμων. Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων και συγκεκριμένα στις διαύλους των ιόντων Na στις προσυναπτικές μεμβράνες των νευρικών κυττάρων.



ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Είναι γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC) με 2,5% (β/ο) δραστική ουσία (Deltamethrin) και 97,13% β/β βοηθητικές ουσίες.

Κάτοχος της άδειας: SHARDA CROP CHEM ESPAÑA S.L.

Παρασκευαστής σκευάσματος: SHARDA CROP CHEM LIMITED

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.



ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος	Δόσεις σκευάσματος	Δόσεις σκευάσματος	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα εφαρμογών
		Κ.εκ. σκευ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα /στρ	Κ.εκ/ στρέμμα		
Εσπεριδοειδή	Αφίδες, (<i>Myzus persicae</i> – MYZUPE)	30 – 50	100	30 – 50		

(Πορτοκαλιά CIDSΙ, Μανταρινιά CIDRE, Λεμονιά CIDLI, Γκρεϊπ Φρουτ CIDPA, Νεραντζιά CIDAU)	Λεκάνιο, (<i>Saissetia oleae</i> –SAISOL), Μύγα μεσογείου, (<i>Ceratitis capitata</i> – CERTCA) Αλευρώδης (<i>Aleurothrixus floccosus</i> – ALTHFL)	50	100	50	Μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα	1
Μηλοειδή Μηλιά MABSD, Αχλαδιά ΡΥUCO	Καρπόκαψα μηλιάς (<i>Laspeyresia pomonella</i> – CARPPO), Αφίδες (<i>Aphis pomi</i> – APHIPO, <i>Dysaphis plantaginea</i> – DYSAPL), Ψύλλα (<i>Psylla mali</i> – PSYLMA) Ανθονόμος (<i>Anthonomus pomorum</i> – ANTHPO, <i>A. spilotus</i> – ANTHSL) Μηλολόνηθη (<i>Melolontha melolontha</i> – MELOME) Κηκιδόμυγες (<i>Dasineura mali</i> – DASYMA) Θρίπτες (<i>Thrips spp.</i> – THRISP)	30 – 50	100	30 – 50	Μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα	2 / 14
	Φυλλοδέτεες (<i>Adoxophyes orana</i> – CAPURE, <i>Archips rosanus</i> – CACORO)	35		35 – 50		
	Ψύλλα Αχλαδιάς	50		50		
	(<i>Psylla pyri</i> – PSYLPY)					
	Ψώρα Σαν Ζοσέ (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i> – QUADPE)	50 – 70	100	50 – 70	Το καλοκαίρι κατά κινητών μορφών	1
	Φυλλοδέτεες (<i>Adoxophyes orana</i> – CAPURE, <i>Archips rosanus</i> – CACORO) Ανάρσια, (<i>Anarsia lineatella</i> –	35		35 – 49		



Πυρηνόκαρπα Βερικοκιά PRNAR, Ροδακινιά PRNPS, - Νεκταρινιά PRNPS, Κερασιά PRNAV, Δαμασκηνιά PRNDO	ANARLI)					
	Ραγολέτιδα ή μύγα κερασίου (<i>Rhagoletis cerasi</i> – RHAGCE)	40 – 50	100 – 140	40 – 70	Μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα	1
	Μύγα μεσογείου, (<i>Ceratitis capitata</i> – CERTCA)	50		50 – 70		
	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> – MYZUPE, <i>Myzus cerasi</i> – MYZUCE, <i>Hyalopterus pruni</i> – HYALPR) Καρπόκαψα δαμασκηνιάς. (<i>Laspeyresia</i> <i>funebrana</i> – LASPFU)	30 – 50		30 – 70		
	Ψώρα Σαν Ζοσέ (<i>Quadraspidiotus</i> <i>perniciosus</i> – QUADPE)	50 – 70	100	50 – 70	Το καλοκαίρι κατά κινητών μορφών	1
Αμπέλι * VITVI	Ευδεμίδα (<i>Lobesia botrana</i> – POLYBO)	50 (1 γενεά) 50 – 70 (2η και 3η γενεά)	100	50 – 70	Μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα	3 / 14
	Κογχυλίδα (<i>Clysia ambiguella</i> – CLYSAM)	50 – 70		50 – 70		
	Τζιτζικάκια (<i>Empoasca spp.</i> – EMPOSP) Αφίδες Πυραλίδα (<i>Sparganothis</i> <i>pilleriana</i> – SPARPI)	50		50		
	Τσιγαρολόγος (<i>Byctiscus betulae</i> – BYCTBE) Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis spp.</i> – AGROSP)					
	Δάκος, (<i>Bactrocera</i> <i>oleae</i> – DACUOL)	50		50 – 70	Σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων τις παγίδες	



Ελιά OLVEU	Λεκάνιο, (<i>Saissetia oleae</i> –SAISOL) Θρίπες (<i>Thrips spp.</i> – THRISP)	50	100 – 140	50 – 70	Μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα	1
	Πυρηνοτρήτης, (<i>Prays oleae</i> – PRAYOL)	30 (ανθοβ.) 50 (καρποβ)		30 – 70	Στην έναρξη τις άνθησης (ανθόβια γενεά) και αμέσως μετά την καρπόδεση (καρπόβια γενεά) μεταξύ ωοθεσίας και εκκόλαψης των ωών και σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις φερομονικές παγίδες	
Φράουλα FRAVE	Αφίδες, (<i>Aphis spp.</i> – APHISP)	50	50 -100	25 – 50	Μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα	3 / 14
Κρεμμύδι ALLCE, Πράσο ALLAM, Καρότο DAUCA	Αφίδες, (<i>Aphis spp.</i> – APHISP) Θρίπας (<i>Thrips tabaci</i> – THRITB) Αλευρώδης (<i>Bemisia tabaci</i> – BEMITA) Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis spp.</i> – AGROSP)	-	40 – 50	30 – 50	Μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα.	3/ 14
Τομάτα	Πράσινο	50	60 – 100 (Υ)	30- 50 (Υ)	Μόλις	3 / 14 (Υ)

LYPES Πιπεριά CPSAN Μελιτζάνα SOLME (Υπαίθρου) Πιπεριά CPSAN (θερμοκηπίου)	σκουλήκι (<i>Helicoverpa armigera</i> – HELIAR) Σποντόπτερα (<i>Spodoptera spp.</i> – SPODSP) Δορυφόρος (<i>Leptinotarsa decemlineata</i> – LPTNDE) Αφίδες, (<i>Myzus persicae</i> – MYZUPE, <i>Aphis gossypii</i> – APHIGO, κ.α.)		60 – 140 (Θ)	30 – 70 (Θ)	εμφανιστούν τα πρώτα έντομα και επανάληψη ανάλογα με την ένταση τις προσβολής.	4 / 7 (Θ)
	Βρωμούσες, (<i>Nezara viridula</i> – NEZAVI)	30	60 – 100 (Υ) 60 – 140(Θ)	18 -30 (Υ) 18 – 42 (Θ)		
	Αλευρώδης, (<i>Trialeurodes vaporariorum</i> – TRIAVA)	70 (Θ)	60 – 140 (Θ)	42 – 70 (Θ)		
	Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis spp.</i> – AGROSP)	-	60 – 100 (Υ)	30- 50 (Υ)		
Τομάτα LYPES Μελιτζάνα SOLME (θερμοκηπίου)	Πράσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa armigera</i> – HELIAR) Σποντόπτερα (<i>Spodoptera spp.</i> – SPODSP) Δορυφόρος (<i>Leptinotarsa decemlineata</i> – LPTNDE) Αφίδες, (<i>Myzus persicae</i> – MYZUPE, <i>Aphis gossypii</i> – APHIGO, κ.α.)	50	60 – 100 (Θ)	30- 50 (Θ)	Μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα	3 / 7 (Θ)
	Βρωμούσες, (<i>Nezara viridula</i> – NEZAVI)	30	60 – 140 (Θ)	18 – 42 (Θ)		
Αγγούρι CUMSA (Υπαίθρου & θερμοκηπίου)	Πράσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa armigera</i> – HELIAR) Σποντόπτερα (<i>Spodoptera spp.</i> – SPODSP)	50	60 – 100 (Υ) 60 – 140 (Θ)	30- 50 (Υ) 30 – 70 (Θ)	Μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα	3 / 7



	Αφίδες, (<i>Aphis spp.</i> – APHISP)					
	Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis spp.</i> – AGROSP)	-	60 – 100 (Υ)	30- 50 (Υ)		
Λάχανο BRSOX	Πιερίδα, (<i>Pieris brassicae</i> – PIERBR), Μαμέστρα, (<i>Mamestra brassicae</i> – BARABR), Πλούζια (<i>Plusia gamma</i> – PYTOGA) Πράσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa armigera</i> – HELIAR) Σποντόπτερα (<i>Spodoptera spp.</i> – SPODSP) Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis spp.</i> – AGROSP), Αφίδες, (<i>Myzus persicae</i> – MYZUPE, κ.α.)	-	50	30 – 50	Μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα	2 / 14
	Πλουτέλλα, (<i>Plutella spp.</i> – PLUTSP)	-	50	50		
Μαρούλι LACSA (υπαίθρου)	Πράσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa armigera</i> – HELIAR) Σποντόπτερα (<i>Spodoptera spp.</i> – SPODSP) Άλτης, (<i>Chrysodeixis chalcites</i> – PLUSCH), Αφίδες, (<i>Aphis spp.</i> – APHISP Κ.α.)	50	50 – 100	25 – 50	Μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα	3 / 7
	Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis spp.</i> – AGROSP)	-		30 – 50		
Φύλλα Σέλινου APUGD, Ρόκα	Αφίδες, (<i>Aphis spp.</i> – APHISP Κ.α.)	50	70	35	Μόλις εμφανιστούν τα πρώτα	2 / 14



ERUVE	Σποντόπτερα (<i>Spodoptera spp.</i> – SPODSP) Μαμέστρα, (<i>Mamestra spp.</i> – MAMESP), Άλτης, (<i>Chrysodeixis chalcites</i> – PLUSCH)				έντομα	
	Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis spp.</i> – AGROSP)	-		30 – 50		
Μπιζέλι PIBSX	Αφίδα των μπιζελιών Σιτόνα, (<i>Sitona spp.</i> – SITNSP)	-	100	25	Μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα.	2 / 14
	Αφίδα των κουκιών Κάμπιες (<i>Laspeyresia spp</i> – LASPSL) Θρίπας (<i>Thrips tabaci</i> – THRITB) Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis spp.</i> – AGROSP)	-		30 – 50		
Όσπρια (Φασόλια PHSVX, Κουκιά DPXOD)	Πράσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa armigera</i> – HELIAR) Αφίδες, (<i>Myzus persicae</i> – MYZUPE, <i>Aphis spp.</i>) Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis spp.</i> – APHISP)	-	60	25 – 30	Μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα και έως την αρχή της άνθισης	2 / 14
Αγκινάρα CYUCA	Κασσίδα (<i>Cassida spp.</i> – CASSSP)	-	100	50	Μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα.	3 / 7
	Προντένια (<i>Spodoptera spp.</i> – SPODSP) Αφίδες	-		30 – 50		
Σπαράγγι ASPOF	Αφίδες Θρίπας (<i>Thrips tabaci</i> – THRITB)	-	100	30 – 50	Εφαρμογές μετά τη συγκομιδή, μόλις	2 / 7

					εμφανιστούν τα πρώτα έντομα.	
Μανιτάρια AGARBI	Δίπτερα Κολλέμβολα	30 – 50	100	30 – 50	Μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα.	1
Πατάτα SOLTU	Δορυφόρος, (<i>Leptinotarsa decemlineata</i> – LPTNDE)	-	60	50	Μόλις Εμφανιστούν τα πρώτα έντομα	3 / 14
	Σποντόπτερα, (<i>Spodoptera</i> sp. – SPODSP)	-		30 – 50		
Βαμβάκι GOSBA	Ρόδινο σκουλήκι, (<i>Pectinophora gossypiella</i> – PECTGO), Πράσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa armigera</i> – HELIAR)	-	30 -50	50 – 70	Μόλις Εμφανιστούν τα πρώτα έντομα	2 / 14
	Τζιτζικάκια (<i>Empoasca</i> spp. – EMPOSP)	-		50		
	Σποντόπτερα, (<i>Spodoptera</i> spp. – SPODSP), Θρίπας (<i>Thrips tabaci</i> – THRITB) Λύγκος (<i>Lygus</i> sp – LYGUSP) Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis</i> spp. – AGROSP)	-		30 – 50		
Ελαιοκράμβη BRSNN	Άλτης, (<i>Chaetocnema tibialis</i> – CHAETI) <i>Meligethes</i> sp – MELISP Αφίδες (<i>Brevicoryne Brassicae</i> – BRVCBR) Σκαθάρι (<i>Ceutorhynchus spp.</i> – CEUTSP)	-	40	30	Μόλις Εμφανιστούν τα πρώτα έντομα και έως την αρχή της άνθισης	1
Σόγια GLXMA	Άλτης, (<i>Chaetocnema tibialis</i> – CHAETI), Κοφτοσκούληκα	-	40	30	Μόλις Εμφανιστούν τα πρώτα έντομα	2 / 14



	(<i>Agrotis spp.</i> – AGROSP) Νεζάρα (<i>Nezara viridula</i> – NEZAVI)				και έως την αρχή της άνθισης	
	Αφίδες					
Ζαχαρότευτλα BEAVA	Άλτης, (<i>Chaetocnema tibialis</i> – CHAETI), Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis spp.</i> – AGROSP)	-	50	30 – 50	Μόλις Εμφανιστούν τα πρώτα έντομα	1
	Σκαθάρι (<i>Lixus spp</i> – LIXUSP) Κλεονός (<i>Cleonus mendicus</i> – CLEOMN)			50		
Καπνός NIOTA	Αφίδες Θρίπας (<i>Thrips tabaci</i> – THRITB) Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis spp.</i> – AGROSP) Επίτριξ (<i>Epitrix spp.</i> – EPIXSP)	-	50 – 100	30 – 50	Μόλις Εμφανιστούν τα πρώτα έντομα	3 / 7
Αραβόσιτος ** ZEAMX	Πυραλίδα, (<i>Ostrinia nubilalis</i> – PYRUNU), Σεζάμια, (<i>Sesamia spp.</i> – SESASP), Πράσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa armigera</i> – HELIAR) Σποντόπτερα, (<i>Spodoptera spp.</i> – SPODSP), Αφίδες Θρίπας (<i>Thrips tabaci</i> – THRITB) Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis spp.</i> – AGROSP)	-	60	30 – 50	Μόλις Εμφανιστούν τα πρώτα έντομα	3 / 7 - 14
	Διαβρώτικα (<i>Diabrotica virgifera</i> – DIABVI)	-		50	Μόλις Εμφανιστούν τα πρώτα έντομα	



Σιτάρι TRZSS, Κριθάρι HORVX	Αφίδες Θρίπας Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis spp.</i> – AGROSP)	-	20 - 40	25 – 30	Μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα.	1 – 2 / 21
<u>ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ</u> (Υπαίθρου & θερμοκηπίου, Φυτώρια)	Αφίδες, (<i>Myzus persicae</i> – MYZUPE), Θρίπες, (<i>Thrips tabaci</i> – THRITB) Αλευρώδης (<i>Bemisia tabaci</i> –BEMITA) Μηλολόνηθη (<i>Melolontha melolontha</i> – MELOME) Κάμπια γαρυφάλλου (<i>Cacoecimorpha pronubana</i> – TORTPR)	50	50 – 100	25 – 50	Μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα	3/ 7
	Φυλλοδέτεες (<i>Adoxophyes orana</i> – CAPURE, <i>Archips rosanus</i> –CACORO, <i>Pandemis spp.</i> – PANDSP)	35		17,5 – 35		
	Αλευρώδης, (<i>Trialeurodes vaporariorum</i> – TRIAVA)	70	70	50		

✓ **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**

- *Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων στα οποία έχει γίνει χρήση με το TOUR 2,5 EC.
- **Η εφαρμογή του προϊόντος στον αραβόσιτο οδηγεί στη μείωση των επίπεδων των μυκοτοξινών, ως αποτέλεσμα επιτυχούς αντιμετώπισης των εντόμων *Ostrinia spp.* Και *Sesamia spp*

✓ **ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:**

Ψεκασμός φυλλώματος.

✓ **ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:**

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα του φαρμάκου αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση

✓ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Οι κενές φιάλες συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας

✓ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Δεν είναι φυτοτοξικό τις συνιστώμενες καλλιέργειες, δόσεις και για τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες

✓ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

✓ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΪΓΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

Το σκεύασμα περιέχει deltamethrin, που ανήκει στην ομάδα 3 κατά IRAC.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

1. Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών, φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο.
2. Εφαρμογές μόνο όταν είναι απαραίτητο με βάση τα πιθανά υφιστάμενα όρια οικονομικής ζημιάς.
3. Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται τις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό.
4. Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές του προϊόντος. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης **προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.**
5. Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών-στόχων με τη γρήγορη μέθοδο τις αντικειμενοφόρου πλάκας, ειδικό σύστημα μικροδοκιμής, έτσι ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας.
6. Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.

✓ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρεϊπ Φρουτ, Νεραντζιά	30
Μηλιά Αχλαδιά	7
Βερικοκιά, Ροδακινιά- Νεκταρινιά Κερασιά, Δαμασκηνιά	7
Αμπέλι	7
Φράουλα	3
Ελιά	7

Κρεμμύδι, Καρότο	7
Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά (Υ, Θ)	3
Αγγούρι (Υ,Θ)	3
Λάχανο	7
Μαρούλι, Ρόκα	3
Φύλλα Σέλινου, Πράσο	7
Αγκινάρα , Μανιτάρια	3
Μπιζέλι	7
Σπαράγγι, Όσπρια (Φασόλι, Κουκιά), Ελαιοκράμβη, Σόγια	καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος
Βαμβάκι	30
Πατάτα	7
Σιτάρι, Κριθάρι, Αραβόσιτος, Ζαχαρότευτλα	30
Καπνός	7

✓ **ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ :**

Να μην εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τα φύλλα.

✓ **ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:**

Διατηρείστε το στην αρχική , απαραβίαστη συσκευασία του, σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, σε θερμοκρασίες κάτω των 40 οC. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

- **Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.**
- **ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από κάθε χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.**