

Πεδίο Εφαρμογής - Στόχος - Δόσης σκευασμάτου - Τρόπος και χρόνος εφαρμογής - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περιόδο| Μεσοδιάστημα εφαρμογών:

Επιτριβόδιον (Ποτακάλια, Μανταρίνι, Λεμονιά): Κοκκιεδό: Λεύκιο (Saissella olea), Κόκκινη ωάρια Aonidiella aurantii, και άλλα Κοκκιεδό ίώνες Lepidosaphes beeki, Parlatoria pergandei. Ψεκασμός με 35-75 κακ/100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 112,5 κακ. (μαζί 100-225 λίτρα ψεκ. υγρού). Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων κατά πραγματική τη 1^η γενεός, με την ενορχήση της κορτόβεσης έως την ωρίμωση του καρπού (ΒΒCH 71-89). Μηλιά, Αγαδιά, Βερικοκάς Κοκκιεδό (Quadraspidiotus perniciosus, Pseudococcidae pentagona). Ψεκασμός με 30 κακ/100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30 κακ. (μαζί 80-100 λίτρα ψεκ. υγρού).

Ροδακινή: Κοκκιεδό (Quadraspidiotus perniciosus, Pseudococcidae pentagona). Ψεκασμός με 30 κακ/100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 24-30 κακ. (μαζί 80-100 λίτρα ψεκ. υγρού).

Ελιά: Λεύκιο (Saissella olea). Ψεκασμός με 30 κακ/100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 37,5 κακ. (μαζί 100-125 λίτρα ψεκ. υγρού). Μηλιά, Αγαδιά, Βερικοκάς, Ροδακινή, Ελιά: Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων κατά πραγματική τη 1^η γενεός, από την έκπτυση των φύλων μέχρι την άνθηση (ΒΒCH 09-59).

Τομάτα (Ε), Αγγούρι (Ε): Ακεριώδες (Thrips tabaci), (Bemisia tabaci). Ψεκασμός με 75 κακ/100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-112,5 κακ. (μαζί) 100-150 λίτρα ψεκ. υγρού. Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων ακρωνίων, από την έκπτυση της τοξίνης έως την ωρίμωση του καρπού (ΒΒCH 50-89). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο| Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 2/10.

Βαμβάκι: Ακεριώδες (Bemisia tabaci). Ψεκασμός με 50 κακ. (μαζί) 50-80 λίτρα ψεκ. υγρού. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής πριν τα άνοιγμα των καρυδιών (ΒΒCH 78-79).

Επιτριβόδιον (Ποτακάλια, Μανταρίνι, Λεμονιά), Μηλιά, Αγαδιά, Βερικοκάς, Ροδακινή, Ελιά, Βαμβάκι: Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο| Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 1.

Παραπόρησης: 1) Η χρήση στη Ροδακινή (PRNP) περιλαμβάνει και τη Νεκταριά (PRNP). 2) Σε περίπτωση που ο πληθυσμός των ακρωνίων αύξερθει είναι σε αρχική επιπτώση, συνιστάται να προηγηθεί η χρήση καταλύκου ακρωνίων ώστε ο πληθυσμός πριν την εφαρμογή του σκευασμάτου. 3) Στην ελιά εμφανίζεται διπλεύσιμο υδράση κατά την Περιόδο Ολεάς (PAROL).

Ειδικές συνήθεις γεωργικής, φυτογένεσης ή περιβαλλοντικής υπό τις οποίες το σκευάσμα μπορεί να χρησιμοποιείται ή να αποκλίνεται: Το σκευάσμα περιέχει ρυγκώνια, ένα εντονότατο αποτύπωμα στην ομάδα 7C κατά την IRAC θαλαρίσια ανθεκτότητας: Για την εφαρμογή ανατίθεμα ανθεκτότητας, χρησιμοποιείται αυτό ή αποδειχθείται άλλο σκεύασμα που περιέχει δυ. ρυγκώνια σε εναλλαγή με άλλα εντονότατα με διαφορετικό τρόπο δράσης.

Χρονικό δάσσημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του συνθέτου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμογή το σκευάσμα: Μήνυε ειδικές στιγμές στην ψεκασμή περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το φυσκωτό υγρό στη φυλλιά επιφάνειας.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός πάνω στα καλύτερα.

Τρόπος παροχής σε ψεκαστικό υγρό: Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέτρη με νερό. Προσθέστε την αποτομήσιμη παρούσα του TONUS στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας και συμπληρώντας με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευτη.

Καθημερινός ψεκαστικός υποχρέωσης: Άμεσως μετά την εφαρμογή του TONUS αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα και το υπόλοιπο. Επανέλαβε σχαλάστε το βιτόνι και όλα τα μέρη του ψεκαστού με καθόρι νερό αφρίσοντας όλα τα οράτα υπεριεμάτων. Επανέλαβε τη διάκριση καθαρισμού για δευτερη φορά.

Συνέννοιστα: :-

Στοιχεία φυτοπεπτώτης, ειδικούτης ποικιλών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φύτα ή τα πρώτα τους: Δεν είναι φυτοπεπτός στις συστατικές καλλιέργειας και δύο είδη εφαρμογής στις Ελλήνικες ειδοφαρμακώμετρες συνήθειες. Συνήθειας αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευασμάτος: Φυλάσσεται στην άργητη, απαραβάτη συσκευασία του, σε μέρος έπαρη, δρόσερο και καλύ αεριζόμενο, μακριά από θερμότητα. Σε αυτές τις συνήθεις παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφείται ημερομηνία παρούσεως του.

Τελευταία επένδυση πριν τη συγκαμήση ή πριν τη διάβεση στην αγορά ήταν πρότυπο για μετασύλλεκτικές χρήσεις: Ποτακάλια, Λεμονιά, Μανταρίνι: 28 ημέρες, Αγγούρι (Ε): 14 ημέρες, Τομάτα (Ε): 3 ημέρες, Μηλιά, Αγαδιά, Ροδακινή / Νεκταρίνια, Βερικοκάς, Ελιά: Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευασμάτος (πριν την άνθηση). Βαμβάκι: Μή εφαρμόσουμε.

Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.

ΑΡ. ΠΑΡΤ/ΗΜ. ΠΑΡΑΓ./ΗΜ ΛΗΞ.: Βλέπε επί της συσκευασίας

TONUS

Εντομοκτόνο, Υγρό Γαλακτωματοποιητήσμο (ΕC)

Ρυγροχυμέν (Πυριπροξιφέν)

UFI: HPRX-PAV8-F301-8J9R

Εγγυημένη σύνθεση:

Δραστική συστασία: Ρυγροχυμέν 10% βιό

Βοηθητικές συστασίες: 88,9 % β/β

Αριθμός Αδειάσης Διάθεσης στην Αγορά (ΑΔΑ): 14692/18-03-2019

Το TONUS είναι εντομοκτόνο, ρυθμιστής ανάπτυξης εντομών για το έλεγχο μυζητικών εντομών.

Μημπτικής αρρώστης νεοτεράς των εντόμων, επίδρα στη μορφογένεση, την αναπαραγωγή και την ειδικευμένεση των εντόμων, ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξής τους κατά την εφαρμογή (υδ. προνύμων, νύμφη, ακμαίο) παρεμποδίζοντας την ομάδα εξέλιξη και κατεύκλικηση τους.

Το TONUS δρά σε όλα τα στάδια των εντόμων, είτε άμεσα (ωκοντό δράση) είτε έμμεσα αποτρέποντας το σχήματοποιητικόν εντόμων κατά την εφαρμογή του στα προνυμφικά στάδια.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Κάτοχος της άδειας: Galenika-Fitofarmacia d.o.o.
Trzaska cesta 515 I-513-1351
Brežiceva pri Ljubljani, Σλοβενία.

Παρασκευαστής σκευασμάτος: Galenika-Fitofarmacia a.d.
Batagrički drum bb, Βελιγράδι - Σερβία.

GALENIKA - FITOFARMACIJA

Πρώτες βαιβείσες-Αντίδοτο:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για ορικά λεπτά. Εάν υπάρχουν φράκτες επιπλέον, αφαιρέστε τους, ερέστε εις εύκαλυπτη. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Καλέστε αμέσως το KENTRO ΔΗΜΗΤΡΙΑΣΕΩΝ γιατρό.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΟΣΗΣ: Μεταφέρετε τον πελεκάνο στον καθόρι όπου αριθμείται η οικονομική μείωση της διασποράς κατά 50% για την καλλιέργεια των βαμβακιών. • Να αφίξετε μια αίσκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από την επιφανειακή ύδατος ή 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακρωνίων μείωσης της διασποράς κατά 50% για την καλλιέργεια της βαμβακιών. • Να αφίξετε μια αίσκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από την επιφανειακή ύδατος με ταυτόχρονη χρήση ακρωνίων μείωσης της διασποράς κατά 50% για την καλλιέργεια των βαμβακιών. • Να αφίξετε μια αίσκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από την επιφανειακή ύδατος με ταυτόχρονη χρήση ακρωνίων μείωσης της διασποράς κατά 50% για την καλλιέργεια των βαμβακιών. • Να αφίξετε μια αίσκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από την επιφανειακή ύδατος με ταυτόχρονη χρήση ακρωνίων μείωσης της διασποράς κατά 90% για την καλλιέργεια της είδης. • να αφίξετε μια αίσκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από την επιφανειακή ύδατος με ταυτόχρονη χρήση ακρωνίων μείωσης της διασποράς κατά 50% για την περιόδο προστασίας 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακρωνίων μείωσης της διασποράς κατά 95% για την καλλιέργεια των βαμβακιών. • Να αφίξετε μια αίσκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από την επιφανειακή ύδατος με ταυτόχρονη χρήση ακρωνίων μείωσης της διασποράς κατά 90% για την καλλιέργεια των βαμβακιών. • Να αφίξετε μια αίσκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από την επιφανειακή ύδατος με ταυτόχρονη χρήση ακρωνίων μείωσης της διασποράς κατά 90% για την καλλιέργεια των βαμβακιών. • Να αφίξετε μια αίσκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από την επιφανειακή ύδατος με ταυτόχρονη χρήση ακρωνίων μείωσης της διασποράς κατά 70% για καλλιέργειες θερμοκηπίου μη μόνης κατασκευασίας. • Επιπλέον για τις μέλισσες, Να για προστατέψετε τη προϊόν σε καλλιέργειας κατά την ανθροφορία του, ή κατά την περίοδο περιόδου που οι μέλισσες απλέγουν. Απομακρύνετε ή κλείστε τις κυψέλες των βαμβών πριν την εφαρμογή.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φλακές, δονούσια) ξεπλύνονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέτυπμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο φυτοπεπτό δοχείο) και στη συνέχεια αρύθματα καταστροφών προτρέπεται να τριπλάσιαση γίνεται στην επιφάνεια σταγόνηδα, σημύς, σενεφάρματα. Μην τρέπετε, πίνετε ή καπνίσετε, όταν χρησιμοποιείται αυτό το προϊόν. • Αποφεύγετε την αναντένηση σταγόνηδα, σημύς, σενεφάρματα. • Μην τρέπετε την προστατευτική γάλανη/μπλε σύσταση προστασίας για τα μέρα κατά την αιγαλεύση/φρέσκωσή της. «Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την εφαρμογή» στις καλλιέργειες υποθέματος. «Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία, μέσα απομείωση φόρμα εργασίας κατά την εφαρμογή στις καλλιέργειες του θερμοκηπίου». Σε περίπτωση επανεσθίση στην καλλιέργεια μέτρα τον ψεκαστή φορώντας μακρυμάνικο πουκάμισο, μακρύ παντελόνι και γάντια». Διάθεση στη περιεχομένη περίπτωση σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.



FARMA-CHEM SA

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
FARMA-CHEM SA

Β.Π.Ε. ΣΙΝΔΟΥ - Γ. ΖΩΝΗ - Τ.Θ.1026 - 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗλ.: 2310 569.630 έως 3 - FAX: 2310 797.047
registration@farmachem.gr - info@farmachem.gr
www.farmachem.gr

