



FARMA-CHEM SA

ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ | Γ' ΖΩΝΗ | Τ.Θ.1026
570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 569.630 έως 33
FAX: 2310 797.047
info@farmachem.gr
www.farmachem.gr



ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Alga 600

ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΗΣ

**Ουσία βοηθητική της ανάπτυξης των φυτών.
Υδατοδιαλυτή σκόνη 100% εκχυλίσματος φύκους του γένους
Sargassum**

Προέλευση: Leili Marine Bioindustry Inc
Αποκλειστική διάθεση για την Ελλάδα: FARMA - CHEM SA



ΣΥΝΘΕΣΗ:

**Οργανική ουσία 35-45% β/β
Αλγινικό οξύ 15% β/β
Αμινοξέα 4 % β/β
Φυσικές ορμόνες 600 ppm**

**Περιέχει Κάλιο (K_2O): 17-19% β/β
pH: 9-11**

“Νέα διαδικασία εκχύλισης μέσω ενζυμόλυσης”!



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Alga 600 είναι μία υδατοδιαλυτή σκόνη φύκους του γένους Sargassum το οποίο παράγεται μέσω μίας εξειδικευμένης και ήπιας διαδικασίας ενζυμόλυσης, με την οποία παραλαμβάνονται όλα τα οργανικά συστατικά του φύκους. Με την πρωτοποριακή διαδικασία παρασκευής προστατεύονται όλες οι φυτικές ορμόνες, τα αμινοξέα, το αλγινικό οξύ, οι βιταμίνες του φύκους και μεγιστοποιείται η ικανότητα δημιουργίας οργανικών συμπλόκων του σκευάσματος.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

- Ενισχύει τις κυτταροδιαιρέσεις
- Προωθεί τη διαφοροποίηση των οφθαλμών
- Περιορίζει την κυριαρχία της κορυφής
- Ενισχύει τη φωτοσύνθεση
- Επιταχύνει τις μεταβολικές διεργασίες των φυτών.



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ενισχύει την παραγωγή ανθοφόρων οφθαλμών, την καρπώδεση και περιορίζει τις καρποπτώσεις.
- Βελτιώνει το μέγεθος, το χρώμα των καρπών και τη συντήρησή τους μετά την συγκομιδή.
- Διεγείρει την ανάπτυξη της ρίζας.
- Ενισχύει την αντοχή των φυτών στο περιβαλλοντικό στρες.
- Βελτιώνει τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά του εδάφους.
- Ιδανικό για εφαρμογές σε φυτώρια, μετά τη μεταφύτευση και σε ανθοκομικές καλλιέργειες.



ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

Διαφυλλικές Εφαρμογές

Δενδροκομία: Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά), Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Κερασιά, Δαμασκηνιά, Βερικοκιά), Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά Μανταρινιά, Γκρέϊπ φρουτ, Λεμονιά Ελιά, Ακτινίδιο, Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά, Φυστικά, Καρυδιά, Φουντουκιά) Επιτραπέζιο,

Οινοποιήσιμο σταφύλι: Συνιστώνται ψεκασμοί πριν ή στο φούσκωμα των οφθαλμών, πριν την άνθηση, στην καρπώδεση και 2 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή. Δόση: 50-100 γρ./100 λίτρα νερό.

Κηπευτικά: Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Φράουλα, Καρπούζι, Πεπόνι, Αγγούρι, Κολοκύθι, Φασόλι, Μπιζέλι: Συνιστώνται ψεκασμοί στη μεταφύτευση, πριν την άνθηση, στην καρπώδεση και μετά από κάθε κοπή. Δόση: 50-75 γρ./100 λίτρα νερό.

Πατάτα, Κρεμμύδι, Καρότο: Συνιστώνται ψεκασμοί στο πλήρες φύτρωμα, κατά την έναρξη σχηματισμού των κονδύλων, βολβών και κατά τη διόγκωσή τους. Δόση: 50-100 γρ./100 λίτρα νερό.

Βαμβάκι: Συνιστώνται 2 ψεκασμοί, ο πρώτος στο φύτρωμα και ο δεύτερος στα πρώτα χτένια. Δόση: 50-100 γρ./100 λίτρα νερό.

Μηδική: Συνιστάται ένας ψεκασμός μετά από κάθε μαχαίρι. Δόση: 50-100 γρ./100 λίτρα νερό.

Σιτάρι (σκληρό, μαλακό), Κριθάρι: Συνιστάται ένας ψεκασμός στο τέλος του αδελφώματος και πριν την εμφάνιση της σημαίας. Δόση: 50-100 γρ./100 λίτρα νερό.

Χλοοτάπητας: Δόση: 50-100 γρ./στρ

Θερμοκηπιακές καλλιέργειες: Βλέπε τις αντίστοιχες καλλιέργειες υπαίθρου για το χρόνο εφαρμογής. Δόση: 50-100 γρ./100 λίτρα νερό.

Υδρολίπανση:

Εφαρμόζεται σε δόση 300-500 γρ./στρ. στα αντίστοιχα στάδια εφαρμογής των διαφυλλικών ψεκασμών.



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Οι προτεινόμενες δόσεις είναι καθαρά ενδεικτικές και μεταβάλλονται ανάλογα με τη θερμοκρασία, την ηλιοφάνεια, την επάρκεια νερού κ.τ.λ. Να αποφεύγεται η χρήση σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Οι εφαρμογές συστήνονται να γίνονται νωρίς το πρωί ή το απόγευμα. Μην υπερβαίνεται τις συνιστώμενες δοσολογίες. Συστήνεται η εφαρμογή του μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της ετικέτας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση είναι ευθύνη του αγοραστή.



ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Να μη συνδυάζεται με σκευάσματα όξινης αντίδρασης. Επικοινωνήστε με τους κατά τόπους γεωπόνους.



ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

Διατηρείστε το σε μέρος ξηρό και δροσερό.
Προφυλάξτε το προϊόν από την έκθεση στον ήλιο και πιθανές χαμηλές θερμοκρασίες