



FARMA-CHEM SA

ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ | Γ' ΖΩΝΗ | Τ.Θ.1026

570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ.: 2310 569.630 έως 33

FAX: 2310 797.047

info@farmachem.gr

www.farmachem.gr



ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

DIABLO SC

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

Ακαρεοκτόνο επαφής και στομάχου με δράση ωοκτόνο, προνυμφοκτόνο και νυμφοκτόνο.



ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Είναι συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC) με 25,87% β/ο (ή 24% β/β) δραστική ουσία (Hexythiazox) και 75,41% β/β βοηθητικές ουσίες.

Κάτοχος της άδειας: INDUSTRIAS AFRASA, S.A

Παρασκευαστής σκευάσματος: INDUSTRIAS AFRASA S.A.

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: FARMA-CHEM S.A.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.



ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο
		κ.εκ./στρέμμα	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ		
Εσπεριδοειδή Πορτοκαλιά CIDSΙ Μανταρινιά CIDRE Λεμονιά CIDLI Γκρέιπφρουτ CIDPA	Κόκκινος τετράνυχος <i>Ranonychus citri</i> METTCI Κίτρινος τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR <i>Eotetranychus carpini</i> EOTECA <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> Καφέ άκαρι των εσπεριδοειδών*** <i>Eutetranychus orientalis</i> EUTEOR	6-15	6	100-250	Με την εμφάνιση της προσβολής.	1
Αμυγδαλιά** PRNDU Φιστικιά** PIAVE Καρυδιά** IUGRE Καστανιά** CONSVA Φουντουκιά** CYLAV Κουκουναριά** PIUPN <i>Χρήσεις ήσσονος σημασίας</i>	Κίτρινος τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR	15	15	100	Μέχρι το τέλος της άνθισης και πριν το σχηματισμό του καρπού.	1
Μηλοειδή Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO	Κίτρινος τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR	16-20	20	80-100	Με την εμφάνιση της προσβολής, από την έναρξη της εκκόλαψης των χειμερινών αυγών, στο στάδιο της ρόδινης κορυφής.	1

Κυδωνιά** CYDOB Μουσμουλιά** MSPGE Ιαπωνική μουσμουλιά** EIOJA Αχλαδόμηλα (nashi)** PYUPC Χρήσεις ήσσονος σημασίας	Κίτρινος τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR	16-20	20	80-100	Με την εμφάνιση της προσβολής, από την έναρξη της εκκόλαψης των χειμερινών αυγών, στο στάδιο της ρόδινης κορυφής.	1
Κερασιά** PRNAV Δαμασκηλιά** PRNDO Χρήσεις ήσσονος σημασίας	Κίτρινος τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR	15	15	100	Με την εμφάνιση της προσβολής.	1
Αμπέλι (οινοποιήσιμα και επιτραπέζια σταφύλια)	Κίτρινος τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR	10-20	20	50-100	2-3 εβδομάδες μετά την άνθιση μόλις φανούν οι πρώτες κινητές μορφές ακάρεων.	1
Τριανταφυλλιά ROSSS (θερμοκήπιο)*	Κίτρινος τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR	10-20	20	50-100	Με την εμφάνιση της προσβολής.	1
Δρεπτά άνθη*	Κίτρινος τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR	10-20	20	50-100	Με την εμφάνιση της προσβολής.	1
Καλλωπιστικά/ Ανθοκομικά NNZZ (θερμοκήπιο)**	Κίτρινος τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR	10-20	20	50-100	Με την εμφάνιση της προσβολής.	1

✓ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Να χρησιμοποιείται πριν φτάσουν τα ακάρεα στο στάδιο του ακμαίου.
2. Έχει μακρά υπολειμματική διάρκεια, δύο μηνών και δεν απαιτείται περισσότερο από μια εφαρμογή το χρόνο.

*Το σκεύασμα έχει δοκιμαστεί στις ποικιλίες τριαντάφυλλων (Sunki, Samurai, Electron, Parade). Για την αποφυγή ανεπιθύμητων επιπτώσεων σε άλλες ποικιλίες τριανταφυλλιάς καθώς και στα υπόλοιπα δρεπτά άνθη συνιστάται η δοκιμή σε ένα μικρό αριθμό φυτών, πριν τη γενικευμένη χρήση του.

**Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις χρήσεις ήσσονος σημασίας: Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Καρυδιά, Καστανιά, Φουντουκιά, Κουκουναριά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά, Ιαπωνική μουσμουλιά, Αχλαδομηλιά, Κερασιά, Δαμασκηλιά και καλλωπιστικών/ανθοκομικών φυτών από τη χρήση του σκευάσματος. Για τη χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

***Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά του καφέ ακάρεως των εσπεριδοειδών στις καλλιέργειες των εσπεριδοειδών. Για τη χρήση αυτή, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

✓ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Ψεκασμός φυλλώματος.

✓ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Αραιώστε την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και προσθέστε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

✓ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, δύο (2) φορές με καθαρό νερό.

✓ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Τα κενά συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

✓ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής.

✓ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

-

✓ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΪΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:

Συνίσταται η εναλλαγή με σκευάσματα διαφορετικού τρόπου δράσης. Μετά την εφαρμογή του σκευάσματος, αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε ακαρεοκτόνο με δραστική ουσία clofentezine ή και το αντίθετο, στην ίδια καλλιεργητική περίοδο.

✓ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Πορτοκάλια Μανταρίνια Λεμόνια Γκρέιπ Φρουτ Κεράσια Δαμάσκηνα	14

<p>Αμύγδαλα Φιστίκια Καρύδια Κάστανα Φουντούκια Κουκουναρόσπορος</p>	<p>Καθορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος</p>
<p>Μήλα Αχλάδια Κυδώνια Μουσμουλιά Ιαπωνικά μούσμουλα Αχλαδόμηλο (nashi)</p>	<p>28</p>
<p>Σταφύλια Επιτραπέζια Σταφύλια Οινοποιήσιμα</p>	<p>21</p>

✓ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά. Σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες καλλωπιστικών και ανθοκομικών, μην εισέρχεστε στο θερμοκήπιο πριν περάσουν 10 ημέρες.

✓ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

Διατηρείται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

- *Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.*
- *ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από κάθε χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.*