



FARMA-CHEM SA

ΒΙΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ | Γ' ΖΩΝΗ | Τ.Θ.1026



570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ.: 2310 569.630 έως 33



FAX: 2310 797.047



info@farmachem.gr



www.farmachem.gr



ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

RULE 50 WG

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

Διασυστηματικό εντομοκτόνο κατά των αφίδων. Η δράση του εντοπίζεται στην εκλεκτική παρεμπόδιση της διατροφικής συμπεριφοράς των αφίδων με αποτέλεσμα τα έντομα να σταματούν αμέσως να τρέφονται και να πεθαίνουν σε 1-3 ημέρες μετά την εφαρμογή.



ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Είναι εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG) με 50 % β/β δραστική ουσία (flonicamid) και 47,92 % β/β βοηθητικές ουσίες.

Κάτοχος της άδειας: ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ

Παρασκευαστής: ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.

ΠΡΟΪΟΝ: ΤΕΡΡΕΚΙ

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.



ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο / Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες)
		γρ./ στρέμμα	γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ		
<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ</u> Πορτοκαλιές CIDSΙ Μανταρινιές CIDRE Λεμονιές CIDLI Γκρέιπφρουτ CIDPA Κιτριά CIDME Φράπες CIDGR Νεραντζιές CIDAU Περγαμόντο CIDAB	Αφίδες Εσπεριδοειδών <i>Aphis citricola</i> APHISI <i>Toxoptera auranti</i> TOXOAU <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <i>Myzus persicae</i> MYZUPE	10	3,5-10	100-300	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών ⁽¹⁾	2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες εφόσον απαιτείται
<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ</u> Ροδακινιές PRNPS	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Hyalopterus pruni</i> HYALPR <i>Brachycaudus helichrysi</i> ANURHE <i>Brachycaudus schwartzi</i> APPESW	14	8-14	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών ⁽¹⁾	2 εφαρμογές ανά 21 ημέρες εφόσον απαιτείται
<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ</u> Κερασιές PRNAV	Αφίδες <i>Myzus cerasi</i> MYZUCE <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Brachycaudus helichrysi</i> ANURHE <i>Brachycaudus schwartzi</i> APPESW <i>Hyalopterus pruni</i> HYALPR	14	8-14	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών ⁽¹⁾	2 εφαρμογές ανά 21 ημέρες εφόσον απαιτείται



<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ</u> Δαμασκηνιές PRNDO	Αφίδες <i>Hyalopterus pruni</i> HYALPR <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Brachycaudus helichrysi</i> ANURHE <i>Brachycaudus schwartzi</i> APPESW	14	8-14	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών ⁽¹⁾	2 εφαρμογές ανά 21 ημέρες εφόσον απαιτείται
<u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ</u> Μηλιές MABSD	Γκριζα αφίδα <i>Dysaphis plantaginea</i> DYSAPL <i>Dysaphis pyri</i> DYSAPY <i>Eriosoma lanigerum</i> ERISLA Πράσινη αφίδα <i>Aphis pomi</i> APHIPO	14	8-14	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών ⁽¹⁾	3 εφαρμογές ανά 21 ημέρες εφόσον απαιτείται
<u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ</u> Αχλαδιές PYUCO Αχλαδιές NASHI PYUPC Κυδωνιές CYDOB	Αφίδες Γκριζα αφίδα της αχλαδιάς <i>Dysaphis pyri</i> DYSAPY <i>Eriosoma lanigerum</i> ERISLA	14	8-14	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών ⁽¹⁾	3 εφαρμογές ανά 21 ημέρες εφόσον απαιτείται
<u>ΣΟΛΑΝΩΔΗ</u> Τομάτες LYPES Μελιτζάνες SOLME υπαίθρου	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Macrosiphum euphorbiae</i> MACSEU <i>Macrosiphum</i> sp. MACSSP <i>Aphis fabae</i> APHIFA	10	--	50-100	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών ⁽¹⁾	3 εφαρμογές ανά 14 ημέρες εφόσον απαιτείται
<u>ΣΟΛΑΝΩΔΗ</u> Τομάτες LYPES Μελιτζάνες SOLME θερμοκηπίου	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Macrosiphum euphorbiae</i> MACSEU <i>Macrosiphum</i> sp. MACSSP <i>Aphis fabae</i>	10	--	50-100	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών. ⁽¹⁾ (ιδιαίτερα στο θερμοκήπιο όταν το 5% των φύλλων έχει προσβληθεί από 1 ή περισσότερα	3 εφαρμογές max (1 φυλλώματος, 2 με στάγδην άρδευση) ανά 10-14 ημέρες εφόσον απαιτείται

	APHIFA				έντομα)	
<u>ΣΟΛΑΝΩΔΗ</u> Τομάτες LYPES Μελιτζάνες SOLME Θερμοκηπίου (εφαρμογές με στάγδην άρδευση)	Άλευρώδεις <i>Bemisia tabaci</i> BEMITA <i>Trialeurodes</i> <i>varporariorum</i> TRIAVA	16	--	200-500	Η πρώτη εφαρμογή γίνεται στα φύλλα ενάντια στις αφίδες. Σε αυτή την περίπτωση ο αριθμός εφαρμογών είναι max 3 με δύο επεμβάσεις στάγδην άρδευση και μία φυλλώματος	
<u>ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ</u> Αγγούρια CUMSA Αγγουράκια CUMSA Κολοκυθάκια CUUPG Θερμοκηπίου	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Macrosiphum</i> <i>euphorbiae</i> MACSEU <i>Macrosiphum</i> sp. MACSSP <i>Aphis fabae</i> APHIFA	10	--	50-100	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών. ⁽¹⁾ (ιδιαίτερα στο θερμοκήπιο όταν το 5% των φύλλων έχει προσβληθεί από 1 ή περισσότερα έντομα)	3 εφαρμογές ανά 14 ημέρες εφόσον απαιτείται
Σιτάρι TRZSS	Αφίδες <i>Aphis nasturtii</i> APHINA <i>Macrosiphum</i> <i>avenae</i> MACSAV <i>Macrosiphum</i> <i>dirhodum</i> MACSSP <i>Metopolophium</i> <i>dirhodum</i> METODR <i>Rhopalosiphum</i> <i>padi</i> RHOPPA	14	--	20-50	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών	2 εφαρμογές ανά 21 ημέρες εφόσον απαιτείται
Καπνός NIOTA	Αφίδες <i>Myzus</i> sp. MYZUSP <u>Χρήση ήσσονος</u> <u>σημασίας:</u> Θρίπες <i>Thrips tabaci</i> * THRITB	14	--	40-60	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών	2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες εφόσον απαιτείται
Καπνός** NIOTA (εφαρμογή με ριζοπότισμα με το	Αφίδες <i>Myzus nicotianae</i> MYZUNI <i>Myzus</i> sp.	14	--	40-60	Εφαρμογή κατά τη μεταφύτευση χωρίς την παρουσία	2 εφαρμογές max (1 εφαρμογή με ριζοπότισμα με



νερό της μεταφύτευσης) <i>Χρήση ήσσονος σημασίας</i>	MYZUSP <i>Aphis</i> sp. APHISP Θρίπες <i>Thrips tabaci</i> THRITB				μελισσών	το νερό της μεταφύτευσης και 1 εφαρμογή φυλλώματος μετά από 14 ημέρες) εφόσον απαιτείται
Βαμβάκι GOSHI	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> Λύγκος * <i>Lygus</i> sp. LYGUSP	7,5	--	50-80	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών ⁽¹⁾	2 εφαρμογές ανά 7-14 ημέρες εφόσον απαιτείται
Αρακάς (με λοβό)** PIBSX Υπαίθρου <u>Χρήση ήσσονος σημασίας</u>	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Aphis fabae</i> APHIFA	14	35-70	20-40	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής από το στάδιο του 6 ^{ου} ξεδωλωμένου φύλλου (BBCH 16) χωρίς την παρουσία μελισσών	1 εφαρμογή
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ZORNH Τριανταφυλλιές ROSSS υπαίθρου και θερμοκηπίου	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Macrosiphum</i> sp. MACSSP <i>Aphis fabae</i> APHIFA	14	--	50-100	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών - εντόμων. ⁽¹⁾ (ιδιαίτερα στο θερμοκήπιο όταν το 5% των φύλλων έχει προσβληθεί από 1 ή περισσότερα έντομα)	3 εφαρμογές ανά 14-21 ημέρες εφόσον απαιτείται
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΟΙ ΘΑΜΝΟΙ ZORNW					Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών	
Μαρούλι LACSA Σκαρόλες (πικρίδα)/ Πλατύφυλλα Αντίδια CICEN Ρόκα ERUVE Λυκοτρίβολο VLLLO Γαιοκάρδαμο	Αφίδες <i>Nasonovia ribisnigri</i> NASORN <i>Myzus</i> sp. MYZUSP <i>Macrosiphum</i> sp. MACSSP	2 mg σκ./φυτό (αντιστοιχεί σε 14 γρ. σκ./ στρ.)	--	--	Εμβάπτιση/ διαβροχή του δίσκου σποράς πριν την μεταφύτευση των νεαρών φυταρίων, από την ανάπτυξη του 1 ^{ου} φύλλου έως 6 ^{ου} φύλλου χωρίς την άνοιξη μέχρι	1 εφαρμογή



BARVE Κόκκινο σινάπι BRSJU	<i>Aphis gossypii</i> APHIGO				το τέλος του φθινοπώρου BBCH 11-16	
Μπιζέλι με λοβό PIBSX	Αφίδες <i>Acyrtosiphon pisum</i> ACYRON	14	--	20-60	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, από το στάδιο έκπτυξης του πρώτου πραγματικού φύλλου έως όταν το 10% των λοβών φτάσει το τυπικό μήκος του καρπού (την Άνοιξη, από Απρίλιο έως Οκτώβριο BBCH 11-71	1 εφαρμογή
Φασόλι με λοβό PHSVX	Αφίδες <i>Acyrtosiphon pisum</i> ACYRON <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> <i>Aphis fabae</i> * APHIFA	14	--	20-60	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, από το στάδιο έκπτυξης του πρώτου πραγματικού φύλλου έως όταν το 10% των λοβών φτάσει το τυπικό μήκος του καρπού (την Άνοιξη, από Απρίλιο έως Οκτώβριο BBCH 11-71	1 εφαρμογή
Όσπρια: Μπιζέλι PISBX Φασόλι PHSVX	Αφίδες <i>Acyrtosiphon pisum</i> ACYRON <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> <i>Aphis fabae</i> * APHIFA	14	--	20-60	Με την εμφάνιση της προσβολής, από το στάδιο έκπτυξης του πρώτου πραγματικού φύλλου έως όταν το 10% των λοβών φτάσει το τυπικό μήκος του καρπού (την Άνοιξη, από Μάρτιο έως Οκτώβριο BBCH 11-71	1 εφαρμογή
Φακή (όσπριο)** LENCU <u>Χρήση ήσσονος σημασίας</u>	Αφίδες <i>Acyrtosiphon pisum</i> ACYRON <i>Aphis fabae</i> APHIFA <i>Aphis</i> sp. APHISP <i>Macrosiphum</i> sp.	14	--	20-60	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, από το στάδιο έκπτυξης του 1 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως την πλήρη άνθηση (έχει ανοίξει το	1 εφαρμογή



	MACSSP <i>Myzus</i> sp. MYZUSP				50% των ανθέων) (την Άνοιξη, από Μάρτιο έως Οκτώβριο BBCH 11-65	
Λούπινο (όσπριο)** LUPAL Χρήση ήσσονος σημασίας	Αφίδες <i>Aphis</i> sp. APHISP <i>Macrosiphum</i> <i>albifrons</i> MACSAL	14	--	10-30	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, από το στάδιο έκπτυξης του 1 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως την πλήρη άνθηση (έχει ανοίξει το 50% των ανθέων) (την Άνοιξη, από Μάρτιο έως Οκτώβριο BBCH 11-65	1 εφαρμογή



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- 1) Η μία εφαρμογή μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας.
- 2) Σε περιοχές με υψηλά ποσοστά προσβολής ακολουθήστε πρόγραμμα ψεκασμών το οποίο να προβλέπει εναλλαγή προϊόντων με διαφορετικό τρόπο δράσης.
- 3) Για καλύτερα αποτελέσματα πρέπει να γίνεται καλή και ομοιόμορφη διαβροχή των φυτών.
- 4) Η εφαρμογή με εμβάπτιση/διαβροχή των δίσκων μηχανικά, με στάγδην άρδευση, πριν την μεταφύτευση να γίνεται 1 μέρα (μέγιστο) πριν την καθορισμένη ημερομηνία μεταφύτευσης. Η δόση η οποία θα εφαρμοστεί να μην ξεπερνά τα 2 mg σκευάσματος/φυτό.

* Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά του θρίπα στον καπνό (εφαρμογή με ψεκασμό), κατά του λύγκου στο βαμβάκι και κατά της αφίδας *Aphis fabae* στα φασόλι με λοβό και στα όσπρια φασόλι και μπιζέλι. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

** Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες καπνού (εφαρμογή με ριζοπότισμα), αρακά με λοβό, φακής και λούπινου από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν στην αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.



ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος ή εμβάπτιση/διαβροχή του δίσκου σποράς μαρουλιού και άλλων σαλατικών (μηχανικά με στάγδην άρδευση έως και 1 ημέρα πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία μεταφύτευσης).



ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα του φαρμάκου αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:

Ξέπλυμα με άφθονο νερό.



✓ **ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:**

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκάστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για διαχείριση τους ως επικίνδυνα απόβλητα.

✓ **ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:**

Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

✓ **ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:**

-

✓ **ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΪΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:**

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία flonicamid, η οποία ανήκει στην ομάδα 29 κατά IRAC. Προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας συνιστάται:

-η εναλλαγή με εντομοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα.

-Εφαρμογή πρακτικών ολοκληρωμένης διαχείρισης και προστασίας των ωφέλιμων αρθρόποδων, ώστε να περιοριστούν οι επεμβάσεις στις απολύτως απαραίτητες.

-Επεμβάσεις με RULE νωρίς, όταν ο πληθυσμός των αφίδων είναι σε χαμηλά επίπεδα.

-Οι εφαρμογές θα πρέπει να γίνονται στις συνιστώμενες δόσεις και μεσοδιαστήματα και να εξασφαλίζεται ότι επιτυγχάνεται ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας.

-Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με RULE. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα άλλων χημικών ομάδων που δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με το flonicamid.

- Επιτρέπεται η χρήση κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας (μία μόνο εφαρμογή) και κατά την περίοδο παραγωγής μελιτωμάτων (που προϋπάρχουν της εφαρμογής) σε ώρες που οι μέλισσες δεν είναι ενεργές.

✓ **ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:**

Καλλιέργεια (Κωδικός προϊόντος με βάση το Παράρτημα I του Καν. (ΕΚ) 396/2005)	Ημέρες
Εσπεριδοειδή	60
Μηλιές, Αχλαδιές, Κυδωνιές, Nashi	21
Ροδακινιές, Δαμασκηνιές, Κερασιές, Αρακάς (με λοβό)	14
Αγγούρια, Αγγουράκια, Κολοκυθάκια Θερμοκηπίου, Τομάτες, Μελιτζάνες (υπαίθρου και θερμοκηπίου)	1
Καπνός	7
Σιτάρι	28
Βαμβάκι	75

Μαρούλι (0251020), Σκαρόλες (πικρίδα)/ Πλατύφυλλα Αντίδια (0251030), Ρόκα (0251060), Λυκοτρίβολο (0251010), Γαιοκάρδαμο (0251050), Κόκκινο σινάπι (0251070)	49
Μπιζέλια με λοβό (0260030), Φασόλια με λοβό (0260010)	14
Μπιζέλια (όσπρια) (0300030), Φασόλια (όσπρια) (0300010), Φακή (όσπριο) (0300020), Λούπινο (όσπριο) (0300040)	Καθορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής

✓ **ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:**

- 6 ώρες στον αγρό και 8 ώρες στο θερμοκήπιο.

✓ **ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:**

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για τρία (3) χρόνια τουλάχιστον, όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

- *Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.*
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από κάθε χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.

