



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 22.04.2026
Αριθ. πρωτ: 99608

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Καραμάνου
Τηλέφωνο: 210 92 87 225
e-mail: dkaramanou@minagric.gr

Προς: BASF Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε
Παραδείσου 2 & Κηφισίας
Τ.Κ. 151 25, Μαρούσι
email: dimitris.theodosiou@basf.com

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 70202 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) FOCUS 10 EC (δ.ο. cycloxydim 10% β/ο), ως προς τις οδηγίες χρήσεις, το φάσμα δράσης, τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ της εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα, τις δηλώσεις προφύλαξης και τις πρώτες βοήθειες του σκευάσματος και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 - του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45),
 - του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
- Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 45 και 33 αυτού.
- Την αριθμ. 1985/19768/21.02.2017 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 70202 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) FOCUS 10 EC (cycloxydim 10% β/ο).
- Την από 12/2025 σχετική Έκθεση Αξιολόγησης του ΜΦΙ (ΕΜΠ 2448/29.12.2025).
- Το με αρ. πρωτ. 12862/330936/07.12.2020 «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά» έγγραφο της Υπηρεσίας.
- Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 2339/14.05.25).

7. Τις αριθ. πρωτ. 3679/94588/01.04.2024 και 14961/22.01.2026 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Τροποποιούμε τη με αριθ. **70202** άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **(ζιζανιοκτόνο) FOCUS 10 EC (δ.ο. cycloxydim 10% β/ο)** η οποία χορηγήθηκε την υπ. αριθ. πρωτ. 1985/19768/21.02.2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς τις οδηγίες χρήσεις, το φάσμα δράσης, τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ της εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα, τις δηλώσεις προφύλαξης και τις πρώτες βοήθειες του σκευάσματος και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

Τα σημεία **3,5,6,7, 11, 12, 13** και **17** διαμορφώνονται ως εξής:

3	<p>Οδηγίες χρήσης: Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.</p> <p><u>Τρόπος εφαρμογής:</u> 1) Καθολικός ψεκασμός με τη χρήση μπεκ τύπου σκούπας. Εφαρμογές νωρίς μεταφυτευτικά / μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας και πριν οι γραμμές σποράς κλείσουν, όταν τα αγρωστώδη είναι σε ζωηρή ανάπτυξη και μέχρι το αδέλφωμά τους. 2) Κατευθυνόμενος ψεκασμός ζιζανίων με χρήση τρακτέρ καλύπτοντας το 50% της συνολικής επιφάνειας του αγρού κατά την καλλιέργεια Ελιάς, Πορτοκαλιάς, Μανταρινιάς και Αμυγδαλιάς.</p> <p><u>Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:</u> Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού με την μισή ποσότητα νερού. Προσθέστε την απαραίτητη ποσότητα σκευάσματος υπό ανάδευση. Συμπληρώστε το ψεκαστικό με την υπόλοιπη ποσότητα νερού, συνεχίζοντας την ανάδευση.</p> <p><u>Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:</u> Πλύνετε τα ψεκαστικά μηχανήματα με νερό, αμέσως μετά το τέλος του ψεκασμού.</p> <p><u>Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:</u> Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας. Το προϊόν καταστρέφεται με κάψιμο σε ειδικούς καυστήρες για αγροχημικά (περίπου 1100°C για 2 δευτερόλεπτα).</p> <p>Συνδυαστικότητα: Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα σκευάσματα.</p>
----------	--

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./ στρέμμα	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Μηλιά (MABSD), Αχλαδιά (PYUCO), Κυδωνιά (CYDOB)	Αγρωστώδη Ζιζάνια	200 για <u>-Ευαίσθητα:</u> Μουχρίτσα (<i>Echinochloa crus-galli</i>), Αιματόχορτο (<i>Digitaria sanguinalis</i>), Βέλιουρας (<i>Sorghum halepense</i>), Σετάρια (<i>Setaria</i> spp.), Βρόμος (<i>Bromus</i> spp.), Πάνικο (<i>Panicum dichotomiflorum</i>), Φάλαρη (<i>Phalaris</i> spp.), Λεπτόχλοα (<i>Leptochloa fascicularis</i>), Φέστουκα (<i>Festuca</i> spp.), Φυτά-εθελοντές σιταριού, κριθαριού και βρώμης, Άγρια είδη κριθαριού (<i>Hordeum</i> spp.) και βρώμης (<i>Avena</i> spp.) <u>-Μετρίως ευαίσθητα:</u> Αλεπονουρά (<i>Alopecurus myosuroides</i>), Πολύανθη ήρα (<i>Lolium multiflorum</i>) Ή 400 για <u>-Ευαίσθητα:</u> Κόκκινο ρύζι (<i>Oryza rufipogon</i>), <u>-Μετρίως ευαίσθητα:</u> Αγριάδα (<i>Cynodon dactylon</i>) Ή	-	15-40	Κάνετε ανοιξιότικες – καλοκαιρινές εφαρμογές, μέχρι το στάδιο της πλήρους ανάπτυξης των καρπών.	1
Αμπέλι (VITVI) (επιτραπέζιο, οινοποιήσιμο, σταφίδα)					Κάνετε ανοιξιότικες – καλοκαιρινές εφαρμογές, μέχρι το πλήρες κλείσιμο των σταφυλιών.	1
Πατάτα (SOLTU)					Κάνετε εφαρμογές κατά την ανάπτυξη του υπέργειου τμήματος (BBCH 10-19)	1
Καρότο (DAUCS), Χρένο (ARWLA), Ραπανάκι (RAPSR), Σελινόριζα (APUGR), Παστινάκη (PAVSA), Λαγόχορτο (TROPS)					Κάνετε εφαρμογές από το στάδιο του 3 ^{ου} φύλλου ως την ανάπτυξη του 50% του ριζώματος.	1
Κρεμμύδι (ALLCE), Σκόρδο (ALLSA), Ασκαλώνιο (ALLAS), Φρέσκο κρεμμυδάκι (ALLFI), Πράσο (ALLPO)					Κάνετε εφαρμογές από το στάδιο του 5 ^{ου} φύλλου ως την ανάπτυξη του 50% του βολβού.	1
Τομάτα (LYPES), Πιπεριά (CPSAN), Μελιτζάνα					Κάνετε εφαρμογές από το στάδιο του 2 ^{ου} φύλλου ως την ανάπτυξη του 3 ^{ου} πλευρικού βλαστού.	1

(SOLME)		500 για -Μετρίως ευαίσθητα: Αγρόπυρο (<i>Agropyron repens</i>)				
Λευκό λάχανο (BRSOH), Λαχανάκια Βρυξελλών (BRSOF), Φυλλώδεις κράμβες (Κινέζικο λάχανο- BRSPK , Κόκκινο λάχανο- BRSOR)					Κάνετε εφαρμογές από το στάδιο του 3 ^{ου} φύλλου ως την ανάπτυξη του 50% του κεντρικού στελέχους.	1
Μαρούλι (LACSA), Σκαρόλα (CICEL), Λυκοτρίβολο (VLLLO), Κάρδαμο (LEPSA), Κόκκινο Σινάπι (BRSJU), Γαιοκάρδαμο (BARVE), Σπανάκι (SPQOL), Αντράκλα (POROL), Αρωματικά φυτά (3HERC)					Κάνετε εφαρμογές από το 3 ^ο ως το 9 ^ο φύλλο.	1
Φασόλια (φρέσκα με λοβό) (PHSVX), Φασόλι (ξερό) (PHSVX), Μπιζέλι (ξερό) (PIBSX), Φακές (LENCU), Λούπινα (LUPSS), Ρεβίθια (CIEAR)					Κάνετε εφαρμογές από το 3 ^ο σύνθετο φύλλο ως το στάδιο ανάπτυξης του 5 ^{ου} μεσογονατίου διαστήματος.	1
Ζαχαρότευτλο (BEAVA), Κτηνοτροφικό τεύτλο (BEAVC), Γογγύλι (BRSRR),					Κάνετε εφαρμογές από το στάδιο του 3 ^{ου} ζεύγους φύλλων ως την πλήρη ανάπτυξη της ροζέτας.	1

Παντζάρι (BEAVD)						
Βαμβάκι (GOSHI)					Κάνετε εφαρμογές από το 2 ^ο φύλλο ως το στάδιο έκπτυξης όλων των πλάγιων βλαστών.	1
Ελαιοκράμβη (BRSNN)					Κάνετε εφαρμογές από το 3 ^ο φύλλο ως το στάδιο ανάπτυξης του 5 ^{ου} μεσογονατίου διαστήματος.	1
Σόγια (GLXMA)					Κάνετε εφαρμογές από το 4 ^ο ως το 9 ^ο σύνθετο φύλλο.	1
Ηλίανθος (HELAN)					Κάνετε εφαρμογές από το 2 ^ο ως το 8 ^ο φύλλο.	1
Ελιά (OLVEU) (επιτραπέζια και ελαιοποιήσιμη)	Αγρωστώδη Ζιζάνια	200 για ετήσια: <u>-Ευαίσθητα ζιζάνια</u> Αγριοκρίθαρο (<i>Hordeum murinum</i>), Λεπτή Ήρα (<i>Lolium rigidum</i>), Σετάρια (<i>Setaria sp.</i>), Ή 400 για πολυετή: <u>--Μετρίως ευαίσθητα:</u> Αιματόχορτο (<i>Digitaria sanguinalis</i>), Αγριάδα (<i>Cynodon dactylon</i>)	-	20-40	Κατευθυνόμενος ψεκασμός, καλύπτοντας το 50% της συνολικής επιφάνειας του αγρού. Ανοιξιάτικες – καλοκαιρινές εφαρμογές μέχρι το στάδιο που οι καρποί έχουν φτάσει στο 60% του τελικού τους μεγέθους (έως BBCH 76).	1
Πορτοκαλιά (CIDSΙ), Μανταρινιά (CIDRE)	Αγρωστώδη Ζιζάνια	200 για ετήσια: <u>-Ευαίσθητα ζιζάνια</u> Λεπτή Ήρα (<i>Lolium rigidum</i>), Σετάρια (<i>Setaria s.p.</i>), Ή 400 για πολυετή: <u>-Μετρίως ευαίσθητα</u> Αγριάδα (<i>Cynodon dactylon</i>)	-	20-40	Κατευθυνόμενος ψεκασμός, καλύπτοντας το 50% της συνολικής επιφάνειας του αγρού. Ανοιξιάτικες – καλοκαιρινές εφαρμογές από το τέλος της άνθισης μέχρι το στάδιο που οι καρποί έχουν φτάσει στο 60% του τελικού τους μεγέθους. (BBCH 69-76)	1
Αμυγδαλιά (PRNDU)	Αγρωστώδη Ζιζάνια	200 για <u>-Ευαίσθητα:</u>	-	20-40	Κατευθυνόμενος ψεκασμός,	1

		<p>Μουχρίτσα (<i>Echinochloa crus-galli</i>), Αιματόχορτο (<i>Digitaria sanguinalis</i>), Βέλιουρας (<i>Sorghum halepense</i>), Σετάρια (<i>Setaria</i> spp.), Βρόμος (<i>Bromus</i> spp.), <u>-Μετρίως ευαίσθητα:</u> Αλεπονουρά (<i>Alopecurus myosuroides</i>), Πολύανθη ήρα (<i>Lolium multiflorum</i>)</p> <p>Ή</p> <p>400 για <u>-Ευαίσθητα:</u> Κόκκινο ρύζι (<i>Oryza rufipogon</i>), <u>-Μετρίως ευαίσθητα:</u> Αγριάδα (<i>Cynodon dactylon</i>)</p>			καλύπτοντας το 50% της συνολικής επιφάνειας του αγρού. Ανοιξιότικες – καλοκαιρινές εφαρμογές από το τέλος της άνθισης μέχρι το στάδιο που οι καρποί έχουν φτάσει στο 60% του τελικού τους μεγέθους. (BBCH 69-76)	
<p>Παρατηρήσεις:</p> <p>1) Στάδιο/ύψος ζιζανίων: έως 15-20 εκατοστά για τα ετήσια και έως 15 εκατοστά για τα πολυετή</p> <p>2) Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή στις ποικιλίες ελιάς, Καλαμών και Κορωνέικη. Στις ποικιλίες αυτές δεν είναι αποδεδειγμένη η απουσία φυτοτοξικότητας.</p> <p>3) Για τις επιτραπέζιες ελιές επιτρέπεται η συλλογή τους μόνο από το δένδρο.</p> <p>4) Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή στις πεσμένες στο έδαφος ελιές.</p> <p>Οι ακόλουθες χρήσεις θα χορηγηθούν όταν καθοριστούν στον κανονισμό 396/2005 MRIs σύμφωνα με τις παρακάτω ΟΓΠ. Ο κάτοχος της έγκρισης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια αρχή.</p>						
Πορτοκαλιά (CIDSΙ), Μανταρινιά (CIDRE)	Αγρωστώδη Ζιζάνια	(ως εγκρίθηκαν)	-	20-40	Κατευθυνόμενος ψεκασμός κάτω από τα δέντρα, καλύπτοντας το 50% της συνολικής επιφάνειας του αγρού. Ανοιξιότικες – καλοκαιρινές εφαρμογές μέχρι το στάδιο που οι καρποί έχουν φτάσει στο 60% του τελικού τους μεγέθους. (Έως το BBCH 76)	1
Αμυγδαλιά (PRNDU)	Αγρωστώδη Ζιζάνια	(ως εγκρίθηκαν)	-	20-40	Κατευθυνόμενος ψεκασμός κάτω από τα δέντρα, καλύπτοντας το 50% της συνολικής επιφάνειας του	1

					αγρού. Ανοιξιάτικες – καλοκαιρινές εφαρμογές μέχρι το στάδιο που οι καρποί έχουν φτάσει στο 60% του τελικού τους μεγέθους. (Έως το BBCH 76)
--	--	--	--	--	---

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

- **Απαγορεύεται η εφαρμογή του σκευάσματος με χρήση ψεκαστικών μέσων χειρός (αυλός) ή επινώτιου ψεκαστήρα.**
- -Σε περίπτωση που οι γειτονικές καλλιέργειες είναι αγρωστώδεις και έχουν φυτρώσει κατά τον χρόνο εφαρμογής του Focus 10 EC, τηρήστε μια απόσταση ασφαλείας 1-5 μέτρων από αυτές.
- -Στις προτεινόμενες χρήσεις και δόσεις, το Focus 10 EC δεν έχει καμία αρνητική επίδραση στα μέρη του φυτού που αποτελούν πολλαπλασιαστικό υλικό. Στις πλώδεις καλλιέργειες που προορίζονται για την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού, το Focus 10 EC πρέπει να εφαρμόζεται πριν την αρχή της άνθισης.

Διαχείριση ανθεκτικότητας

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική cycloxydim, η οποία ανήκει στην ομάδα 1 κατά HRAC. Συνιστάται η εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα ή/και εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα), προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, είναι δυνατή η φύτευση/σπορά όλων των δικοτυλήδων φυτών. Για τη φύτευση/σπορά αγρωστώδων καλλιεργειών πρέπει να περάσουν 4 εβδομάδες από την εφαρμογή του προϊόντος.

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

Όταν εφαρμόζονται προγράμματα αμειψισποράς, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός.

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Μην εισέρχεστε στη ψεκασμένη καλλιέργεια πριν στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από την φυλλική επιφάνεια.

11 Δηλώσεις Προφύλαξης:

P102: Μακριά από παιδιά.
 P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.
 P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
 P202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.
 P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς.
 P264: Πλύνετε με άφθονο νερό σαπούνη προσεκτικά μετά το χειρισμό.
 P271: Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
 P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ενδύματα, μέσα

ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο και προστατευτικά γάντια κατά την ανάμειξη/φόρτωση του σκευάσματος.

Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και προστατευτικά γάντια κατά την εφαρμογή του σκευάσματος.

Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε μακρύ παντελόνι, μακρυμάνικο πουκάμισο και γάντια.

SP1: Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

SPe2: Για να προστατέψετε τα υπόγεια νερά, μην εφαρμόζετε το προϊόν το φθινόπωρο σε οπωρώνες και σε χλοοτάπητα. Εφαρμόστε στην ελαιοκράμβη μία φορά κάθε τρία χρόνια.

SPe3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη-στόχους να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τη μη γεωργική γη ή χρησιμοποιήστε ακροφύσια μειωμένης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%.

SPe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη.

12 Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο

P308+313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

P312: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό, αν αισθανθείτε αδιαθεσία.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τον ρουχισμό. Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα. Εφόσον προκύψουν δυσκολίες ζητήστε ιατρική βοήθεια. Επιδείξτε το δοχείο, την ετικέτα και/ή το δελτίο δεδομένων ασφαλείας στον γιατρό.

P304 + P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

P301 + P310+P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

Ξεπλύνετε το στόμα και πιείτε άφθονο νερό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Ποτέ μην προκαλείτε εμετό ή δίνετε οτιδήποτε από το στόμα εάν το θύμα δεν έχει τις αισθήσεις του ή έχει σπασμούς.

P302 + P352+ P332+P313+P362+P364: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:

Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

P305 + P351 + P338+ P337+P313 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:

Ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Αν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: συμβουλευτείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210- 77 93 777

13

Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Πεδίο εφαρμογής	Ημέρες
Πατάτα, Φασόλι (ξηρό), Μπιζέλι (ξηρό), Φακές, Λούπινα, Ρεβίθια, Σόγια	56
Τομάτα, Μελιτζάνα, Λαχανάκια Βρυξελλών, Αμπέλι (επιτραπέζιο, οινοποιήσιμο, σταφίδα), Φυλλώδεις κράμβες (Κινέζικο λάχανο, Κόκκινο λάχανο), Φρέσκο κρεμμυδάκι, Πράσο	42
Καρότο, Ραπανάκι	35
Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Φασόλια (φρέσκα με λοβό), Κρεμμύδι, Σκόρδο, Ασκαλώνιο, Σπανάκι, Λευκό Λάχανο, Αντράκλα, Αρωματικά φυτά	28
Πιπεριά, Μαρούλι, Σκαρόλα, Λυκοτρίβολο, Κάρδαμο, Κόκκινο Σινάπι, Γαιοκάρδαμο	21
Βαμβάκι	Δεν ορίζεται
Παντζάρι, Σελινόριζα, Χρένο, Πασινάκη, Λαγόχορτο, Ελαιοκράμβη, Ζαχαρότευτλο, Κτηνοτροφικό τεύτλο, Γογγύλι, Ηλίανθος, Ελιά (επιτραπέζια και ελαιοποιήσιμη), Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Αμυγδαλιά	Ορίζεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει να προσκομίσει στην ΣΕΑ τα ακόλουθα :

1. Τουλάχιστον 2 πειράματα φυτοτοξικότητας στη χώρα μας τα οποία να υποστηρίζουν την ασφαλή χρήση του σκευάσματος σε μία τουλάχιστον από τις ποικιλίες ελιάς, Καλαμών ή Κορωνέικη.

II. Ετικέτα σκευάσματος

- Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
- Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
- Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. πρωτ. 1985/19768/21.02.2017 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ