CAPME 80WG

ΕΝΑΙΩΡΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟΙ ΚΟΚΚΟΙ (WG)

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Δρα σε πολλαπλά σημεία.

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 60537 / 08.06.2016
Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος: Δραστική ουσία: Captan 80% (β/β) - Βοηθητικές ουσίες 15,3 % β/β
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

• Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Περιέχει τη δραστική ουσία Captan. • Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. • Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. • Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου. • Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

• Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / επισκεφθείτε γιατρό.
Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μη προκαλέστε εμετό. Μην χορηγείται τίποτα από το στόμα.
Σε **περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και ζητείστε ιατρική συμβουλή.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Δηλώσεις προφύλαξης:
• Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
• Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
• Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.
• Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη, συγκεντράσεις σταγονιδίων / εκνεφώματα.
• Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
«Φοράτε γάντια, ολόσωμη φόρμα εργασίας, μάσκα και γυαλιά κατά την ανάμειξη/φόρτωση και γάντια και ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την εφαρμογή».
«Σε περίπτωση επανεισόδου μετά τον ψεκασμό θα πρέπει να φοράτε γάντια, μακρύ παντελόνι και πουκάμισο με μακριά μανίκια».
«Όταν η καλλιέργεια γειτνιάζει με κατοικημένη περιοχή, να αφήνετε ζώνη ασφαλείας 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% για την προστασία των κατοίκων και τυχόν παρεβρισκόμενων».

• Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
• Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
• Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.
• Για να προστατέψτε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε από τα επιφανειακά ύδατα: • μία αμέσωση ζώνη προστασίας 15 μέτρων αν χρησιμοποιηθεί συμβατικός εξοπλισμός ή 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 50% στις καλλιέργειες Μηλιάς, Αχλαδιάς, Κυδωνιάς, Μουσμουλιάς και Αχλαδομηλιάς.
• μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 90% ή αέρκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων εκ των οποίων τα 20 μέτρα να είναι φυτική ζώνη ανάσχεσης σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 75% ή αέρκαστη ζώνη προστασίας 40 μέτρων εκ των οποίων τα 20 μέτρα να είναι φυτική ζώνη ανάσχεσης σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 50% ή αέρκαστη ζώνη προστασίας 50 μέτρων εκ των οποίων τα 20 μέτρα να είναι φυτική ζώνη ανάσχεσης στις καλλιέργειες Ροδακινιάς, Βερικοκιάς, Δαμασκηνιάς και Κερασιάς σε πρώιμες εφαρμογές.
• 10 μέτρα φυτικής ζώνης ανάσχεσης σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 90% ή 20 μέτρα φυτικής ζώνης ανάσχεσης σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 75% ή αέρκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων εκ των οποίων τα 20 να είναι φυτική ζώνη ανάσχεσης σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 50% ή αέρκαστη ζώνη προστασίας 40 μέτρων εκ των οποίων τα 20 μέτρα να είναι φυτική ζώνη ανάσχεσης στις καλλιέργειες Ροδακινιάς, Βερικοκιάς, Δαμασκηνιάς και Κερασιάς σε όψιμες εφαρμογές.

Φάσμα δράσης:

Πεδίο Εφαρμογής/Στόχος/Δόσεις σκευάσματος/Τρόπος και χρόνος εφαρμογής/ Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες:

Μηλιά, Αχλαδιά: Για Φουζικλάδιο (*Venturia inaequalis, V. pirina*), Γλοιοσπόριο (*Gloeosporium spp.*), Φαιά σήψη (*Monilia sp.*). από την εμφάνιση των ταξανθίων έως οι καρποί αποκτήσουν μέγεθος 10 mm (πρώτη καρπόπτωση) (BBCH 51 - 71). Δόση: 188 γραμ./στρέμμα ή 125 γραμ./100 Λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού: 100-150 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4 με μεσοδιάστημα 10 ημέρες.

Κυδωνιά*, Μουσμουλιά*, Αχλαδομηλιά*, (Χρήσεις ήσσονος Σημασίας): Για Φουζικλάδιο (*Venturia inaequalis, V. pirina*), Γλοιοσπόριο (*Gloeosporium sp.*), Φαιά σήψη (*Monilia sp.*), Σεπτορίωση (*Mycosphaerella sp.*). Εφαρμογές από την εμφάνιση των ταξανθίων έως οι καρποί αποκτήσουν μέγεθος 10 mm (πρώτη καρπόπτωση) (BBCH 51 - 71). Δόση: 188 γραμ./στρέμμα ή 125 γραμ./100 Λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού: 100-150 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4 με μεσοδιάστημα 10 ημέρες.

Ροδακινιά: Για Εξάωσκος (*Taphrina deformans*). Εφαρμογές από το στάδιο της διόγκωσης των οφθαλμών έως οι καρποί να αποκτήσουν το 50% του τελικού μεγέθους (BBCH 51-75). Δόση: 180 – 300 γραμ./στρέμμα ή 300 γραμ./100 Λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού: 60-100 Λίτρα/στρέμμα. Για Φαιά σήψη (*Monilia sp.*). Εφαρμογές από την αρχή μέχρι το τέλος της ανθοφορίας (BBCH 60-69). Δόση: 180-210 γραμ./στρέμμα ή 150-175 γραμ./100 Λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού: 120 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 με μεσοδιάστημα 14 ημέρες.

Βερικοκιά: Για Φαιά σήψη (*Monilia sp.*). Εφαρμογές από την αρχή μέχρι το τέλος της ανθοφορίας (BBCH 60-69). Δόση: 180-210 γραμ./στρέμμα ή 150-175 γραμ./100 Λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού: 120 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 με μεσοδιάστημα 14 ημέρες.

Δαμασκηνιά * (Χρήση ήσσονος Σημασίας): Για Φαιά σήψη (*Sclerotinia laxa*), Κορύνεο (*Stigmina carpophila*). Εφαρμογές από την αρχή της βλάστησης έως το τέλος της άνθησης (BBCH 51-69). Για Εξάωσκος (*Taphrina deformans*). Μια εφαρμογή πριν τη διόγκωση των οφθαλμών (BBCH 31-50). Δόση: 300 γραμ./στρέμμα ή 150 γραμ./100 Λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού: 100-200 Λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4 με μεσοδιάστημα 10 ημέρες.

Κερασιά* (Χρήση ήσσονος Σημασίας): Για Φαιά σήψη (*Sclerotinia laxa*), Κορύνεο (*Stigmina carpophila*). Εφαρμογές από την αρχή της βλάστησης έως το τέλος της άνθησης (BBCH 51-69). Δόση: 225 γραμ./στρέμμα ή 150 γραμ./100 Λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού: 100-150 Λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 με μεσοδιάστημα 7 ημέρες.

Παρατηρήσεις:
1. Εφαρμόζεται προληπτικά.
2. Στην Ροδακινιά – Βερικοκιά, στις όψιμες εφαρμογές η μεγίστη επιτρεπτή δόση είναι 180 γραμ./στρ. 3. Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, να ακολουθήσετε τα Προγράμματα των Γεωργικών Προειδοποιήσεων.
*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες Κυδωνιά, Μουσμουλιά, Αχλαδομηλιά, Δαμασκηνιά και Κερασιά από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές απουλήσεις που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτούγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας.

Το σκεύασμα περιέχει captan που ανήκει στην ομάδα M04 κατά FRAC. Λόγω του τρόπου δράσης του captan (πολλαπλά σημεία) και της χαμηλής πιθανότητας ανάπτυξης ανθεκτικότητας, το CAPME 80 WG έχει σημαντική θέση σε προγράμματα καταπολέμησης ασθενειών. Παρόλα αυτά συνίσταται **η εναλλαγή με μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.**

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει απενδύσει το ψεκαστικό πάνω στα φυτά

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες. Να μην χρησιμοποιείται το σκεύασμα στις ποικιλίες μηλιάς Stark, Delicious, Stayman Renetta del Canada, Winesap και στις ποικιλίες αχλαδιάς Butirra 'Anjou, Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienna, ΚΟΝΤΟΥΛΑ και ΚΡΥΣΤΑΛΛΙ.

Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμοί φυλλώματος με καλή διαβροχή των φυτών.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύστε την συνιστώμενη δόση σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε πλήρως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με καθαρό νερό τρεις φορές.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: : Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες, σακίδια) μαζί με τα καπάκι, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Το σκεύασμα εφαρμόζεται μόνο του.

Προστασία καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:
Μηλιά, Αχλαδιά, Ροδακινιά, Βερικοκιά Κυδωνιά, Μουσμουλιά, Αχλαδομηλιά: 21 Ημέρες Δαμασκηνιά, Κερασιά: Δεν εφαρμόζεται. Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος: έως το τέλος της άνθησης όπου η επέμβαση πραγματοποιείται πριν τον σχηματισμό του εδώδιμου μέρους.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:
Στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής.

"Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελματία χρήστη εφόσον ζητηθεί"

ΑΡ. ΠΑΡΤ./ΗΜ. ΠΑΡΑΓ./ΗΜ. ΛΗΞ.: βλέπε επί της συσκευασίας

Καθαρό Βάρος: **1500 γραμ.**

Κάτοχος της άδειας:
Sharda Cropchem España S.L. Edificio Atalayas Business Center, Camil Condomina nº 3, 12th Floor, 30006 Murcia – Ισπανία regn@shardaintl.com.

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
SHARDA BALKAN ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ Μον. Ε.Π.Ε., Μοναστηρίου 9, Τ.Κ. 54627, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 6946144719.

Διανομέας:
FARMA-CHEM SA
ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ - Γ' ΖΩΝΗ - Τ.Θ.1026
570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 569.630 έως 3
FAX: 2310 797.047
info@farmachem.gr
www.farmachem.gr

Παρασκευαστής σκευάσματος:
SHARDA CROPCHEM LIMITED,
Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West), Mumbai – 400056, Ινδία

Μέλος του ECCA european crop care association

ISO 9001 Η FARMA-CHEM SA Εφαρμόζει Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

FARMA-CHEM SA

ΕΓΚΡ.: 17/06/2022