

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

• **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. • Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητείστε ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε γιατρό μετά από σοβαρή έκθεση. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.

ΑΡ. ΠΑΡΤΗΜ. ΠΑΡΑΓ.ΗΜ ΛΗΕ.:
Βλέπε επί της συσκευασίας

200202

Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε αραβόσπο, τομάτα και πατάτα. Απορροφάται από το φύλλωμα και από τις ρίζες των ζιζανίων. Μετακινείται στα ακραία μεριστώματα βλαστού και ρίζας και εμποδίζει την ανάπτυξη των ζιζανίων προκαλώντας την νέκρωση τους.



ΠΡΟΣΟΧΗ

• Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Περιέχει γη διατόμων (CAS n. 61790-53-2). • Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στην αναπνοή. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.



Περιεχόμενο: 120 κ. εκ.

Rim 25WG

Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 70428 /07.09.2021

Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: rimsulfuron 25% β/β - Βοηθητικές ουσίες: 74,49% β/β

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.

UFI: 1SSD-XWHN-W602-JQP7

Κάτοχος της άδειας:

Sharda Cropchem España S.L., Edificio Atalayas,
Business Center Cantil Condominia n1 3,
12th Floor, 30006 Murcia, Ισπανία.
e-mail: regn@shardaintl.com

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
SHARDA BALKAN AΓΡΟΦΑΡΜΑΚΑ ΜΟΝ. Ε.Π. Ε.,
Μοναστηρίου 9, Θεσσαλονίκη,
Τηλ.: 2310 521045



FARMA-CHEM SA



Διανομή:

FARMA-CHEM SA

ΒΙ.Π.Ε. ΣΙΝΔΟΥ - Γ. ΖΩΝΗ - Τ.Θ.1026

570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ: 2310 569.630 έως 3 - FAX: 2310 797.047

registration@farmachem.gr - www.farmachem.gr

ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΟΙΓΤΕ ΕΛΘ

Δηλώσεις προφύλαξης:

- Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
- Αποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή και προστασία για μάτια/πρόσωπο κατά την ανάμιξη/φόρτωση. Σε περίπτωση επανεξασόδου στην καλλιέργεια φοράτε μακριμάνικο πουκάμισο και μακριά παντελόνι.
- Διάθεση περιεχομένου/υπεριέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
- Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.)
- Για να προστατέψετε τους υδράθριους οργανισμούς να μην εφαρμόζετε σε μη αποστραγγιζόμενα εδάφη με pH μεγαλύτερο από 7,5 και κλίση μικρότερη του 0,5% για πράσινη καλλιέργεια της πατάτας (Απρίλιο).
- Για να προστατέψετε τους υδράθριους οργανισμούς να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα - **5 μέτρων** για την τομάτα και τον αραβόσιτο - **15 μέτρων** για την πατάτα
- Για να προστατέψετε τα φυτά μη-στόχους να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας από μη γεωργική γη - **10 μέτρων** σε συνδυασμό με την χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του φυτοφατικού νέφους κατά **50%** ή - **5 μέτρων** σε συνδυασμό με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του φυτοφατικού νέφους κατά **75%**.

Τρόπος εφαρμογής: Καθαρός φυτοκασμός με όλο φυτοκαστικό υγρό ανά στρέμμα ανάλογα με την καλλιέργεια, πίεση 2 - 3 atm και μικρό τύπου ακούρας.

Τρόπος παρασκευής φυτοκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του φυτοκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του φυτοκαστικού υγρού υπό ανάδευση. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Συνιστά η εφαρμογή αμέσως μετά την προετοιμασία του φυτοκαστικού υγρού και υπό συνεχή ανάδευση κατά τη διάρκεια του φυτοκασμού.

Καθαρισμός φυτοκαστήρα: Αδειάστε τελείως το φυτοκαστικό δοχείο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του φυτοκαστικού. Ξεπλύνετε το δοχείο και όλα τα εξαρτήματα του φυτοκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλύνονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύσιμο (τα νερά του ξεπλύματος το ρίχνουμε στο φυτοκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρίπτυχο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, ανατιθενται σε σημείο συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: –**ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΣΤΟΧΟΣ-ΔΟΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Για Τομάτα, Πατάτα, Αραβόσιτο για αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια με 6 γρήπρέμια. Μιας μεταρρυπαντικά όταν η καλλιέργεια βρίσκεται στο στάδιο των 2 έως 8 φύλλων ΒΒCH 12-18. 1 εφαρμογή.

Όγκος φυκ. υγρού (λίτρο /στρ.): Για τομάτα 10-40. Για Πατάτα: 20-60. Για Αραβόσιτο: 10-50.

Παρατηρήσεις: 1. Τα αποτελέσματα είναι καλύτερα όταν τα περισσότερα ζιζάνια έχουν φυτρώσει και βρίσκονται σε μικρό στάδιο και σε ζιζνή ανάπτυξη. 2. Σε μεταρρυπανόμενη τομάτα, ο φυτοκασμός να πραγματοποιείται αφού η καλλιέργεια έχει ξεπεράσει το μεταρρυπαντικό σοκ.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ: Ευαίσθητα αγρωστώδη: Αγριάδα (*Cynodon dactylon*), Αγριαβρώμη (*Avena sterilis*), Αγρόσυρο/Ευμνος (*Elymus pruris*), Μουρίτσα (*Echinochloa crus-galli*), Πόα κοινή (*Poa annua*), Σιτάρι (*Setaria spp.*), Ευαίσθητα πλατύφυλλα: Αγριομελιζόνα (*Xanthium strumarium*), Αγριοκαμπανάκι (*Abutilon theophrasti*), Αγριοπανός (*Nolã anensis*), Βλήτο πλαγιστό (*Asteris spicatus*), Βλήτο τραχύ (*Atractylis liliifolia*), Γαλιτσόγκα (*Galinsoga spp.*), Ηλιάνθος (*Helianthus annuus*), Ηλιοτρόπιον κοινό (*Heliotropium europaeum*), Βιάδα (*Thespis anense*), Καμύλλη (*Cirsium discolor*), Μέντα (*Mentha spp.*), Πολύγωνο (*Polygonum conopodium*), Στελλάρα (*Stellaria media*), Χαμηλό (*Melilotus spp.*), Μερικώς ευαίσθητα αγρωστώδη: Αμυγδαχόρι (*Digitaria sanguinalis*), Βόλιουρας (*Sorghum halepense*), Κριθάρι (*Hordeum vulgare*), Μερικώς ευαίσθητα πλατύφυλλα: Άγριο σινάρι (*Shiraz anensis*), *Αγριοκαμπανάκι (*Solanum nigrum*), Αγριοπεπρό (*Polygonum persicaria*), Καπνόχορτο (*Fumaria officinalis*), Τσίτουλας (*Datura stramonium*)

* Μόνο στο στάδιο των κοτυληδόνων

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το σκεύασμα περιέχει ήπιευση που ανήκει στην ομάδα 2 κατά HRAC. Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κ.λπ.) και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων. Να μην εφαρμόζεται όταν φυσικά εάν αναμένεται βροχή εντός 3 ωρών σε καλλιέργειες που υποφέρουν από προσβολές εντόμων ή ασθενειών, έλλοια, χαμηλές θερμοκρασίες κ.λπ. σε περίπτωση θερμοκρασιών κάτω των 10-12°C ή πάνω των 25-26°C σε καλλιέργεια καλαμποκού ή πατάτας που προορίζεται για παραπαραγωγή σε ποικιλίες γλυκού καλαμποκού.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και: - σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: -, σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Πριν τη σπορά πρέπει να πραγματοποιηθεί άρωμα. Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, συνιστάται περίοδος αναμονής τουλάχιστον 120 ημερών για τη σπορά μπιζελιών και 60 ημερών για τη σπορά ανοιχτόκρη κριθαριού, ζαχαρότευλων και ηλιάνθου. - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει πλήρως το φυτοκαστικό υγρό πάνω στα φυτά. **Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαίσθητος ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στο φυτό ή το προϊόντα τους:** Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συστηματικές χρήσεις και δόσεις. Μπορεί να παρατηρηθούν παροδικά συμπτώματα χλωρωσης χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη και απόδοση των καλλιεργειών.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις: Μη εφαρμογή.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχή του σκευάσματος, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

* Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελματία χρήστη εφόσον ζητηθεί

ΑΡ. ΠΑΡΤΗΜ. ΠΑΡΑΓ.ΗΜ ΛΗΕ: ΒΑτίτε επί της συσκευασίας