

Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμόζεται με ψεκασμού κοντά στο έδαφος, σε λωρίδες που καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού, από το φθινόπωρο έως τις αρχές της άνοιξης, με ακριβεία τύπου σκούπας και πίεση 2 - 3 Atm.

Τρόπος προσεκτικής ψεκαστικής υγρού: Ανακινείστε καλά τη φιάλη ή το δοχείο, πριν τη χρήση. Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο μεγάλη μέση νερού και προσθέτε τη συνιστώμενη ποσότητα ακευάσματος. Προσθέτε το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδειξη. Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται υπό συνεχή ανάδειξη.

Καθαρισμός ψεκαστηρά: Άμεσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τα δελτία του ψεκαστικού βιτρίνα. Καθαρίστε σχηματικά το βιτρίνα και όλα τα μεριά του ψεκαστηρά, γεμίζοντας το βιτρίνα με νερό (τουλάχιστον 10% του συνολικού όγκου του) και αδειάζοντας το βιτρίνα μέσω του ψεκαστηρά αυτηριπλαβυνόμενων ακρούσων και βρυγμάνων και γραμμών ψεκασμού. Επαναλαμβάνετε την διαδικασία 2 φορές.

Οδηγίες για την ασφαλή απόφαση του φυτοπροστατευτικού πράσινος και της αισιοδοσίας: τα κενά μέσα αισιοδοσίας, ξετυλνόνταν υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξετύλιγμα (τα νερά του ξετυλνόματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και με συνεχές αρότρο καταστρέφονται προηγουμένως με τρόπιμα για τη διασφάλιση της μη περιστρέψη χρήσης, να εναποτελέσουν σε σημεία αισιοδοσίας για ανακύκλωση ή ανάπτυξη ενέργειας.

Συνδικαλιστικό: Να μην αισιοδοσείται με άλλα φυτοπροστατευτικά πράσινα. Εφαρμόζεται μόνο του Πεδίου εφαρμογής Στάχος/Διάσεις αισιοδοσίας/Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής:

Επειρεύοντας: Πορτοκαλιά, Μανταρίνια, Λεμονιά, Γκρέιπ φρουτ, Κίτρο. Για Επίτοιχη πλαταύφυλλα και αγρωστώδη ζάχαρα\* με 62,5 κεκ. σκ./πτρ. και σύγκ. ψεκ. υγρού 20-50 λίτρα/πτρ. Ψεκασμούς κοντά στο έδαφος, σε λωρίδες που καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού, από το φθινόπωρο έως τις αρχές της άνοιξης και μέχι των 30 Απριλίου.

Μηλούδι: Μηλιά, Αχλαδία, Κυδωνία, Μουσουράδια, Αχλαδοβύρλιμη. Για Επίτοιχη πλαταύφυλλα και αγρωστώδη ζάχαρα\* με 62,5 κεκ. σκ./πτρ. και σύγκ. ψεκ. υγρού 20-50 λίτρα/πτρ. Ψεκασμούς κοντά στο έδαφος σε λωρίδες που καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού, από το φθινόπωρο έως τις αρχές της Άνοιξης, κατά το λήφθαρο. (ΒΣΦΗ 00). Μην εφαρμόζεται το σκεύασμα μετά τις 30 Απριλίου.

Ελιές: Για Επίτοιχη πλαταύφυλλα και αγρωστώδη ζάχαρα\* με 62,5 κεκ. σκ./πτρ. και σύγκ. ψεκ. υγρού 20-50 λίτρα/πτρ. Ψεκασμούς κοντά στο έδαφος σε λωρίδες που καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού, από το φθινόπωρο έως τις αρχές της Άνοιξης, κατά το λήφθαρο. (ΒΣΦΗ 00). Μην εφαρμόζεται το σκεύασμα μετά τις 30 Απριλίου.

Λαχανικά: Για Επίτοιχη πλαταύφυλλα και αγρωστώδη ζάχαρα\* με 62,5 κεκ. σκ./πτρ. και σύγκ. ψεκ. υγρού 20-50 λίτρα/πτρ. Ψεκασμούς κοντά στο έδαφος σε λωρίδες που καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού, από το φθινόπωρο έως τις αρχές της Άνοιξης, κατά το λήφθαρο. (ΒΣΦΗ 00). Μην εφαρμόζεται το σκεύασμα μετά τις 30 Απριλίου.

Μέγιστος ορίσμας εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο για όλες τις καλλιέργειες: 1 ανά καλλιεργητική περίοδο.

#### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ:

1. Εφαρμόζεται με ψεκασμού κοντά στο έδαφος, σε λωρίδες που καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού.

2. Η συνολική ποσότητα 1 δ.έτσος δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 15 γραμ. δ.στρ.

3. Για τις επιπτώσεις ελεύς επιπρέπει η αυλανή τους μόνο από το δέντρο.

4. Να μη ωλεύονται ελές από το έδαφος προκειμένου να αποφεύγονται υπολείμματα.

5. Καταπολεμούμενα ζάχαρα:

Ευοιστήρη ζάχαρα (>85%): Βίτια (*Amaranthus blitoides*), (*Amaranthus retroflexus*), Καλεντούλιο (*Calendula arvensis*), Λουπουδιά (*Chenopodium album*), Πεπτοκόδιο (*Convolvulus arvensis*), (*Convolvulus althaeoides*), (*Diplatys erucoides*), (*Diplatys muralis*), Μουρτιά (*Echinocloa crus-galli*), Αναρριχημένο πολύγωνο (*Fallopia convolvulus*), Ήρες (*Lolium multiflorum subsp. *giganteum**), (*Lolium giganteum*), Μολύβδια (*Melica sylvestris*), Κονιά πόδι (*Poa annua*), Πολυκόπιο (*Polygonum aviculare*), Αντάρια (*Pojaria olereacea*), Μαρτιώδια (*Sonchus vulgaris*)

Μέγιστος εισιτήριο ζάχαρα (70-85%): Σούχος (*Sonchus sp.*)

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, ποινήσιμες υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλείεται:

Διαγράφηση Ανθεκτικότητας:

Το σκεύασμα περιέχει χειρωνιστικό, ένα ζάχαντοκάντο που ανήκει στην ομάδα E κατά HRAC. Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συντατάται η εναλλαγή ζάχαντοκάντων με διαφορετικό τρόπο δράσης ή/και εναλλακτικές μεθόδους αντιμετώπισης ζάχαντων (μηχανική μεθόδος, καλλιεργητικά μέτρα).

Χρονική διάστημα αποφάσεως μετέντενσης και σπόρων ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν. Στο ίδιο χρώμα μπορεί να παραπομπέψεται, ο εξής καλλιέργειας:

- τομάτα, βρόκιν, λαχανόπετυστα μετά την παρέλευση 2 χρόνων και 4 μηνών (840 ημέρων).

- κρεμμύδι μετά την παρέλευση 4 χρόνων και 8 μηνών (1680 ημέρων).

- ελαιοκαρπή μετά την παρέλευση 1 χρόνου και 6 μηνών (540 ημέρων).

Χρονική διάστημα αποφάσεως μετέντενσης και προβάσεως που ανήκει στην ομάδα ή των ζώνων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμογή το σκεύασμα: Μην εισέρχεται στον αγρό για 7 μήνες μετά την εφαρμογή του σκεύασμάτος.

Στοιχεία φυτοποδοκόπτης, ευαισθητής ποικιλία και κάθε άλλης παρενέργειας στο φυτό ή τα προϊόντα τους: Σε ευαισθητές καλλιέργειες, μπορεί να προκληθεί φυτοποδοκόπτητα που στανοποιάζει στον ίδιοκτοριανό του ψεκαστικού υγρού. Στα ηλιαχτικά μπορεί να παραπτηρίζουν παρούσια συμπτώματα φυτοποδοκόπτης (χλωρώσης).

# Smerch

Γαλακτωματοποιητικό υγρό (EC)

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 70362 / 25.11.2019

Εγγυημένη σύνθεση:

Δραστική ουσία: οξυfluorfen 24 % β/ο, Βοηθητικές ουσίες: 76,6% β/β

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. - ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων πλαταύφυλλων και αγρωστώδων ζιζανίων, προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά.

Εφαρμόζεται με ψεκασμό κοντά στο έδαφος, σε λωρίδες που καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού, από το φθινόπωρο έως τις αρχές της Άνοιξης, κατά το λήφθαρο. (ΒΣΦΗ 00). Μην εφαρμόζεται το σκεύασμα μετά τις 30 Απριλίου.

Ελιές: Για Επίτοιχη πλαταύφυλλα και αγρωστώδη ζάχαρα\* με 62,5 κεκ. σκ./πτρ. και σύγκ. ψεκ. υγρού 20-50 λίτρα/πτρ. Ψεκασμούς κοντά στο έδαφος σε λωρίδες που καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού, από το φθινόπωρο έως τις αρχές της Άνοιξης, κατά το λήφθαρο. (ΒΣΦΗ 00). Μην εφαρμόζεται το σκεύασμα μετά τις 30 Απριλίου.

Μηλούδι: Για Επίτοιχη πλαταύφυλλα και αγρωστώδη ζάχαρα\* με 62,5 κεκ. σκ./πτρ. και σύγκ. ψεκ. υγρού 20-50 λίτρα/πτρ. Ψεκασμούς κοντά στο έδαφος σε λωρίδες που καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού, από το φθινόπωρο έως τις αρχές της Άνοιξης, κατά το λήφθαρο. (ΒΣΦΗ 00). Μην εφαρμόζεται το σκεύασμα μετά τις 30 Απριλίου.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

• Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποτης και διεισδύσης στις αντανευστικές οδούς.

• Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθίσμα. • Μπορεί να προκαλέσει υπηλία ή ζάχαρη. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

• Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει δέρματος ή οκάσιο. • Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες βοηθίες – Αντιδότο:

• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό. ΜΗΝ προκαλέστε εμετό.

• Εάν δεν υποστούσε ο σφαλμένος ερεθίσματος: Σύμπλευση ηλεκτρόλιτης

• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΘΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Επέλυση προστατική με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί εποιητή, αφαιρέστε τους. Σύρθαντε τα μάτια στον ελαφρύ υγρό.

• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΘΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με αέρινο νερό και αποτούντε.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΘΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΤΟΜΑ: Μεταφέρετε το παθόνα στον καβαρό αέρα και αφήστε τον ξεκουράστε σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

Αντιδότο: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδότο. Σε περίπτωση δηλητηρίασης ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 - 7793777

#### Δηλώσεις προφύλαξης:

• Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

• Απορρίψετε ή αναπτύξετε σταγνωμένα/έκνεψα.

• Μην τρώετε, πίνετε ή καπνίζετε σταν χρησιμότερα.

• Μην παίνετε τα ωράκια στη σκευασία του.

• Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς μπορείτε μια αιφέκαση ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά υδάτινα.

• Φρούτα καταπλήκτη προστατευτικά μάσκα κατά την ανάμεξη/φόρτωση.

Σε περίπτωση επανεύρεσης στην καλλιέργεια σαρώνετε σε πάνεια για φρέσκια προστατευτική ενέμασια και γάντια.

• Διάβεβηση του περιεχομένου/υπερέκτη σαρώνετε σε πάνεια για φρέσκια προστατευτική ενέμασια.

• Μην παίνετε τα ωράκια στη σκευασία της.

• Για να προστατέψετε την αράχη προστατευτική ενέμασια σαρώνετε μετά την επέλυση.

• Φρούτα καταπλήκτη προστατευτικά μετά την επέλυση.

• Μην παίνετε τα ωράκια στη σκευασία της.

• Σε περίπτωση παρατηρήσεων σε συνδυασμό με την εργασία απορρίψετε τη σκευασία της.

• Για να προστατέψετε την αράχη προστατευτική ενέμασια σαρώνετε μετά την επέλυση.

• Μην παίνετε τα ωράκια στη σκευασία της.

• Σε περίπτωση παρατηρήσεων σε συνδυασμό με την εργασία απορρίψετε τη σκευασία της.

• Για να προστατέψετε την αράχη προστατευτική ενέμασια σαρώνετε μετά την επέλυση.

• Μην παίνετε τα ωράκια στη σκευασία της.

• Σε περίπτωση παρατηρήσεων σε συνδυασμό με την εργασία απορρίψετε τη σκευασία της.

• Για να προστατέψετε την αράχη προστατευτική ενέμασια σαρώνετε μετά την επέλυση.

• Μην παίνετε τα ωράκια στη σκευασία της.

• Σε περίπτωση παρατηρήσεων σε συνδυασμό με την εργασία απορρίψετε τη σκευασία της.

• Για να προστατέψετε την αράχη προστατευτική ενέμασια σαρώνετε μετά την επέλυση.

• Μην παίνετε τα ωράκια στη σκευασία της.

• Σε περίπτωση παρατηρήσεων σε συνδυασμό με την εργασία απορρίψετε τη σκευασία της.

• Για να προστατέψετε την αράχη προστατευτική ενέμασια σαρώνετε μετά την επέλυση.

• Μην παίνετε τα ωράκια στη σκευασία της.

• Σε περίπτωση παρατηρήσεων σε συνδυασμό με την εργασία απορρίψετε τη σκευασία της.

• Για να προστατέψετε την αράχη προστατευτική ενέμασια σαρώνετε μετά την επέλυση.

• Μην παίνετε τα ωράκια στη σκευασία της.

• Σε περίπτωση παρατηρήσεων σε συνδυασμό με την εργασία απορρίψετε τη σκευασία της.

• Για να προστατέψετε την αράχη προστατευτική ενέμασια σαρώνετε μετά την επέλυση.

• Μην παίνετε τα ωράκια στη σκευασία της.

• Σε περίπτωση παρατηρήσεων σε συνδυασμό με την εργασία απορρίψετε τη σκευασία της.

• Για να προστατέψετε την αράχη προστατευτική ενέμασια σαρώνετε μετά την επέλυση.

• Μην παίνετε τα ωράκια στη σκευασία της.

• Σε περίπτωση παρατηρήσεων σε συνδυασμό με την εργασία απορρίψετε τη σκευασία της.

• Για να προστατέψετε την αράχη προστατευτική ενέμασια σαρώνετε μετά την επέλυση.

• Μην παίνετε τα ωράκια στη σκευασία της.

• Σε περίπτωση παρατηρήσεων σε συνδυασμό με την εργασία απορρίψετε τη σκευασία της.

• Για να προστατέψετε την αράχη προστατευτική ενέμασια σαρώνετε μετά την επέλυση.

• Μην παίνετε τα ωράκια στη σκευασία της.

• Σε περίπτωση παρατηρήσεων σε συνδυασμό με την εργασία απορρίψετε τη σκευασία της.

• Για να προστατέψετε την αράχη προστατευτική ενέμασια σαρώνετε μετά την επέλυση.

• Μην παίνετε τα ωράκια στη σκευασία της.

• Σε περίπτωση παρατηρήσεων σε συνδυασμό με την εργασία απορρίψετε τη σκευασία της.

• Για να προστατέ