



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 22.06.2026
Αριθ. πρωτ: 161868

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Καραμάνου
Τηλέφωνο: 210 92 87 225
e-mail: dkaramanou@minagric.gr

Προς: Biocontrol Technologies, S.L., Ισπανίας
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας της
εταιρείας
Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. -
AGRIBIZ
Μιχαλακοπούλου 157, 115 27, Αθήνα)
e-mail: info@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. 61060 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) T34 BIOCONTROL (δ.ο. *Trichoderma asperellum* strain T34 12 % β/β), ως προς την κατηγορία και τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης, και τις συνθήκες αποθήκευσης του σκευάσματος»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 - του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).
 - του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
- Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 45 και 37,4 αυτού.
 - (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Την από 06/2025 σχετική έκθεση αξιολόγησης της Γαλλίας.
- Την αριθμ. 10586/293441 π.ε. /16.02.2022 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 61060 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) T34 BIOCONTROL (δ.ο. *Trichoderma asperellum* strain T34 12 % β/β),, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Το με αριθμ. πρωτ. 12862/330936/07.12.2020 «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά» έγγραφο της Υπηρεσίας.
- Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε

Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β’ 2339/14.05.25).

7. Τις αρ. πρωτ. 11529/326893/25.10.2023 και 75564/26.03.2026 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. **61060** άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **(μυκητοκτόνο) T34 BIOCONTROL (δ.ο. *Trichoderma asperellum* strain T34 12 % β/β)**, η οποία χορηγήθηκε με την υπ. αριθ. πρωτ. 10586/293441 π.ε. /16.02.2022, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς την κατηγορία και τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης, και τις συνθήκες αποθήκευσης του σκευάσματος.

Τα σημεία **4**, **5**, και **14** διαμορφώνονται ως εξής:

4 Κατηγορία και
τρόπος δράσης:

Το T34 BIOCONTROL είναι μυκητοκτόνο με ζωντανούς μικροοργανισμούς για την αντιμετώπιση της σκληρωτινίασης σε υπαίθρια καλλιέργεια: μαρουλιού και φυλλωδών λαχανικών, του πύθιου σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες: τομάτας, πιπεριάς, μελιτζάνας, κολοκυθιού, κολοκύθας, αγγουριού, πεπονιού και καρπουζιού και της φουζαρίωσης σε θερμοκηπιακή καλλιέργεια γαρυφάλλου. Αποτελείται από στελέχη του μύκητα *Trichoderma asperellum* στέλεχος T34, που δρουν ανταγωνιστικά στους εδαφογενείς φυτοπαθογόνους μύκητες, προστατεύοντας τις καλλιέργειες.

Μετά την εφαρμογή του σκευάσματος, ο μύκητας *Trichoderma asperellum* στέλεχος T34, δημιουργεί αποικίες στο έδαφος και στη ριζόσφαιρα των φυτών, οι οποίες ανταγωνίζονται τα παθογόνα σε θρεπτικά στοιχεία και χώρο. Επίσης δρα με παρασιτισμό των σκληρωτινών **και μυκηλίων** και ενεργοποιεί την αντίσταση του φυτού. Η εφαρμογή του T34 BIOCONTROL είναι προληπτική, πριν τον αποικισμό των φυτοπαθογόνων μυκήτων στη ριζόσφαιρα των φυτών.

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
Μαρούλι (Υ) LACSA Λυκοτρίβολο (Υ) VLLLO Σκαρόλες (πικρίδα) (Υ)/ πλατύφυλλα αντίδια (Υ) CICEL Κάρδαμο (Υ)& άλλα βλαστάρια & φύτερες (Υ) LEPSA Γαιοκάρδαμο (Υ) BARVE Ρόκα (Υ) ERUVE Κόκκινο σινάπι (Υ) BRSJU	Σκληρωτινίαση (<i>Sclerotinia</i> sp. - SCLESP)	10 γρ./m ³ υποστρώματος ⁽¹⁾	<u>Σε φυτώρια και</u> <u>σπορεία:</u> Ανάμιξη με το υπόστρωμα ανάπτυξης πριν τη σπορά ή τη μεταφύτευση.	1

Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβανομένων ειδών κράμβης) (Υ) Σπανάκι (Υ) SPQOL Ανδράκλα (Υ) POROL Σέσκουλα (Υ)/φύλλα τεύτλων (Υ) BEAVF αμπελόφυλλα και παρεμφερή είδη VITVI νεροκάρδαμο (Υ) NAAOF ραδίκια witloof (Υ) CICIF Φραγκομαϊντανός (Υ) ANRCE Σχοινόπρασο (Υ) ALLSC Φύλλα σέλινου (Υ) APUGS Μαϊντανός (Υ) PARCR Φασκόμηλο (Υ) SALOF Δενδρολίβανο (Υ) RMSOF Θυμάρι (Υ) THYVU Βασιλικός (Υ) και βρώσιμα άνθη (Υ) OCIBA Μέντα η πιπερώδης (Υ) MENPI Δάφνη (Υ)/ δαφνόφυλλα (Υ) LURNO Δρακόντιο (Υ)/ Εστραγκόν (Υ) ARTDR				
Μαρούλι (Υ) LACSA Λυκοτρίβολο (Υ) VLLLO Σκαρόλες (πικρίδα) (Υ)/ πλατύφυλλα αντίδια (Υ) CICEL Κάρδαμο (Υ)& άλλα βλαστάρια & φύτερες (Υ) LEPSA Γαιοκάρδαμο (Υ) BARVE	Σκληρωτινίαση (<i>Sclerotinia sp.</i> - SCLESP)	0,5 γρ./ m² (θεωρώντας βάθος 5 cm)⁽²⁾	<u>Σε φυτώρια και σπορεία:</u> Ομοιόμορφος ψεκασμός στην επιφάνεια του υποστρώματος πριν ή μετά τη σπορά ή τουλάχιστον 1 εβδομάδα πριν από τη μεταφύτευση.	1

Ρόκα (Υ) ERUVE Κόκκινο σινάπι (Υ) BRSJU Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβανομένων ειδών κράμβης) (Υ) Σπανάκι (Υ) SPQOL Ανδράκλα (Υ) POROL Σέσκουλα (Υ)/φύλλα τεύτλων (Υ) BEAVF αμπελόφυλλα και παρεμφερή είδη VITVI νεροκάρδαμο (Υ) NAAOF ραδίκια witloof (Υ) CICIF Φραγκομαϊντανός (Υ) ANRCE Σχοινόπρασο (Υ) ALLSC Φύλλα σέλινου (Υ) APUGS Μαϊντανός (Υ) PARCR Φασκόμηλο (Υ) SALOF Δενδρολίβανο (Υ) RMSOF Θυμάρι (Υ) THYVU Βασιλικός (Υ) και βρώσιμα άνθη (Υ) OCIBA Μέντα η πιπερώδης (Υ) MENPI Δάφνη (Υ)/ δαφνόφυλλα (Υ) LURNO Δρακόντιο (Υ)/ Εστραγκόν (Υ) ARTDR				
Μαρούλι (Υ) LACSA Λυκοτρίβολο (Υ) VLLLO Σκαρόλες (πικρίδα) (Υ)/ πλατύφυλλα αντίδια (Υ) CICEL Κάρδαμο (Υ) & άλλα βλαστάρια & φύτερες (Υ)	Σκληρωτινίαση (<i>Sclerotinia sp.</i> - SCLESP)	25 γρ./στρέμμα ⁽³⁾	<u>Στον αγρό:</u> Εφαρμόστε στο έδαφος μέσω του συστήματος της στάγδην άρδευσης κατά την μεταφύτευση και επανάληψη μετά από μια εβδομάδα.	2/7

LEPSA Γαιοκάρδαμο (Υ) BARVE Ρόκα (Υ) ERUVE Κόκκινο σινάπι (Υ) BRSJU Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβανομένων ειδών κράμβης) (Υ) Σπανάκι (Υ) SPQOL Ανδράκλα (Υ) POROL Σέσκουλα (Υ)/φύλλα τεύτλων (Υ) BEAVF αμπελόφυλλα και παρεμφερή είδη VITVI νεροκάρδαμο (Υ) NAAOF ραδίκια witloof (Υ) CICIF Φραγκομαϊντανός (Υ) ANRCE Σχοινόπρασο (Υ) ALLSC Φύλλα σέλινου (Υ) APUGS Μαϊντανός (Υ) PARCR Φασκόμηλο (Υ) SALOF Δενδρολίβανο (Υ) RMSOF Θυμαρί (Υ) THYVU Βασιλικός (Υ) και βρώσιμα άνθη (Υ) OCIBA Μέντα η πιπερώδης (Υ) MENPI Δάφνη (Υ)/ δαφνόφυλλα (Υ) LURNO Δρακόντιο (Υ)/ Εστραγκόν (Υ) ARTDR			(BBCH 12-49)	
Τομάτα (Θ) LYPES Πιπεριά (Θ) CPSAN Μελιτζάνα (Θ) SOLME	Πύθιο (<i>Pythium</i> <i>aphanidermatum</i> - PYTHAP)	10 γρ./m ³ υποστρώματος ⁽¹⁾	<u>Σε φυτώρια και</u> <u>σπορεία:</u> Ανάμιξη με το υπόστρωμα ανάπτυξης πριν τη σπορά ή τη	1

			μεταφύτευση.	
Τομάτα (Θ) LYPES Πιπεριά (Θ) CPSAN Μελιτζάνα (Θ) SOLME	Πύθιο (<i>Pythium</i> <i>aphanidermatum</i> - PYTHAP)	0,5 γρ./ m ² (θεωρώντας βάθος 5 cm) ⁽²⁾	<u>Σε φυτώρια και σπορεία:</u> Ομοιόμορφος ψεκασμός στην επιφάνεια του υποστρώματος πριν ή μετά τη σπορά ή τουλάχιστον 1 εβδομάδα πριν από τη μεταφύτευση.	1
Τομάτα (Θ) LYPES Πιπεριά (Θ) CPSAN Μελιτζάνα (Θ) SOLME	Πύθιο (<i>Pythium</i> <i>aphanidermatum</i> - PYTHAP)	10 γρ./m ³ υποστρώματος ⁽⁴⁾	<u>Στο θερμοκήπιο:</u> Εφαρμογή στο υπόστρωμα με άρδευση μετά τη μεταφύτευση και επανάληψη κάθε 2-3 μήνες μέχρι οι πρώτοι καρποί να αποκτήσουν το τελικό τους μέγεθος. (BBCH 10-79)	1-6/60-90
Κολοκυθάκι (Θ) CUUPE Κολοκύθα (Θ) CUUMA Αγγούρι (Θ) CUMSA Πεπόνι (Θ) CUMME Καρπούζι (Θ) CITLA	Πύθιο (<i>Pythium</i> <i>aphanidermatum</i> - PYTHAP)	10 γρ./m ³ υποστρώματος ⁽¹⁾	<u>Σε φυτώρια και σπορεία:</u> Ανάμιξη με το υπόστρωμα ανάπτυξης πριν τη σπορά ή τη μεταφύτευση.	1
Κολοκυθάκι (Θ) CUUPE Κολοκύθα (Θ) CUUMA Αγγούρι (Θ) CUMSA Πεπόνι (Θ) CUMME Καρπούζι (Θ) CITLA	Πύθιο (<i>Pythium</i> <i>aphanidermatum</i> - PYTHAP)	0,5 γρ./ m ² (θεωρώντας βάθος 5 cm) ⁽²⁾	<u>Σε φυτώρια και σπορεία:</u> Ομοιόμορφος ψεκασμός στην επιφάνεια του υποστρώματος πριν ή μετά τη σπορά ή τουλάχιστον 1 εβδομάδα πριν από τη μεταφύτευση.	1
Κολοκυθάκι (Θ) CUUPE Κολοκύθα (Θ) CUUMA Αγγούρι (Θ)	Πύθιο (<i>Pythium</i> <i>aphanidermatum</i> - PYTHAP)	10 γρ./m ³ υποστρώματος ⁽⁴⁾	<u>Στο θερμοκήπιο:</u> Εφαρμογή στο υπόστρωμα με άρδευση μετά τη μεταφύτευση και	1-6/60-90

CUMSA Πεπόνι (Θ) CUMME Καρπούζι (Θ) CITLA			επανάληψη κάθε 2-3 μήνες μέχρι οι πρώτοι καρποί να αποκτήσουν το τελικό τους μέγεθος. (BBCH 10-79)	
Γαρύφαλλο (Θ) DINCA	Φουζαρίωση (<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>dianthi</i> - FUSADI)	10 γρ./m ³ υποστρώματος ⁽¹⁾	<u>Σε φυτώρια και σπορεία:</u> Ανάμιξη με το υπόστρωμα ανάπτυξης πριν τη σπορά, τη ριζοβολία ή τη μεταφύτευση.	1
Γαρύφαλλο (Θ) DINCA	Φουζαρίωση (<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>dianthi</i> - FUSADI)	0,5 γρ./m ² (θεωρώντας βάθος 5cm) ⁽²⁾	<u>Σε φυτώρια και σπορεία:</u> Ομοιόμορφος ψεκασμός στην επιφάνεια του υποστρώματος πριν ή μετά τη σπορά ή τουλάχιστον 1 εβδομάδα πριν από τη μεταφύτευση.	1
Γαρύφαλλο (Θ) DINCA	Φουζαρίωση (<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>dianthi</i> - FUSADI)	0,01 γρ./1 λίτρο νερού ⁽⁵⁾	<u>Στο θερμοκήπιο:</u> Εμβάπτιση ριζών πριν τη μεταφύτευση. (BBCH 12-19)	1
Γαρύφαλλο (Θ) DINCA	Φουζαρίωση (<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>dianthi</i> - FUSADI)	10 γρ./m ³ υποστρώματος ⁽⁴⁾	<u>Στο θερμοκήπιο:</u> Εφαρμογή στο υπόστρωμα με άρδευση μετά τη μεταφύτευση και επανάληψη κάθε 2-3 μήνες.	1-6/60-90
Φράουλα (Υ) (FRAVE) Μούρα και μικροί καρποί: Βατόμουρα (Υ) (RUBFR) Καρποί ασπροβατομουριάς (Υ) (RUBCA) Σμέουρα (ερυθρά και κίτρινα) (Υ) (RUBID) Μύρτιλλα (Υ)	Φυτόφθορα <i>Phytophthora cactorum</i> (PHYTCC) <i>Phytophthora cinnamomi</i> (PHYTCN) Πύθιο <i>Pythium</i> spp. (1PYTHG)	1 γρ./λίτρο νερού	<u>Εμβάπτιση ριζών</u> πριν τη μεταφύτευση, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. (BBCH 10-19)	1*
		0,5 γρ. /m ² υποστρώματος ⁽⁹⁾ (με βάθος 5cm)	<u>Εφαρμογή στο φυτώριο:</u> Ψεκασμός του υποστρώματος καλλιέργειας (δίσκους ή γλαστράκια φυτωρίων)	

(VACCO, VACAR, VACAN, VACVG, VACMY) Μύρτιλλα μακρόκαρπα (Υ) (VACMA) Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, μαύρα ή άσπρα) (Υ) (RIBNI, RIBRU) Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, πράσινα, κίτρινα) (Υ) (RIBUC) Καρποί αγριοτριανταφυλλιάς (Υ) (ROSCN) Μούρα (Υ) (MORNI) Αζάρολος (μεσογειακά μούσμουλα) (Υ) (CSCAZ) Καρποί κουφοξυλιάς (Υ) (SAMNI)			πριν τη μεταφύτευση, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. (BBCH 10-19)	
		50 γρ /στρ. ⁽¹⁰⁾	Στον αγρό: Εφαρμόζεται στη φύτευση και κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας μέσω στάγδην άρδευσης (BBCH 10-89)	12* / 30

Παρατηρήσεις :

Εφαρμόζεται προληπτικά με τους εξής τρόπους:

1) Ενσωμάτωση σε υπόστρωμα

Εφαρμόστε το T34 BIOCONTROL, σε δόση 10 γρ./m³ υποστρώματος πριν από τη σπορά, διαλύοντας 10 γρ./100 λίτρα νερού και εφαρμόζοντας 0,1 λίτρα διαλύματος σε 1 λίτρο υποστρώματος.

2) Ψεκάσμος υποστρώματος

Εφαρμόστε το T34 BIOCONTROL, ψεκάζοντας σε δόση 0,5 γρ./m² επιφάνειας υποστρώματος πριν ή μετά τη σπορά ή τουλάχιστον 1 εβδομάδα πριν από τη μεταφύτευση, διαλύοντας 10 γρ./100 λίτρα νερού και εφαρμόζοντας με ψεκάσμο, 5 λίτρα διαλύματος/m² υποστρώματος.

3) Με ριζοπότισμα ή μέσω του συστήματος της στάγδην άρδευσης

Εφαρμόστε το προϊόν στο έδαφος με ριζοπότισμα ή με στάγδην άρδευση σε δόση 25 γρ./στρέμμα κατά την μεταφύτευση. Προσθέστε 25 γρ. του T34 BIOCONTROL σε 250-1.000 λίτρα νερού και εφαρμόστε σε 1 στρέμμα. Επαναλάβετε με την ίδια δοσολογία τουλάχιστον 1 εβδομάδα μετά την μεταφύτευση.

4) Με άρδευση του υποστρώματος

Εφαρμόστε το προϊόν στο υπόστρωμα, μέσω του συστήματος άρδευσης, σε δόση 10 γρ./m³ υποστρώματος, διαλύοντας 10 γρ./100 λίτρα νερού και εφαρμόζοντας 0,1 λίτρα διαλύματος σε 1 λίτρο υποστρώματος.

5) Με εμβάπτιση των ριζών

Πριν τη μεταφύτευση, εμβάπτιστε τις ρίζες των φυταρίων για αρκετές ώρες ή καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας σε διάλυμα με συγκέντρωση 0,01 γρ./1 λίτρο νερού.

6) Η μέγιστη συγκέντρωση του T34 BIOCONTROL δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 γρ./ 1 λίτρο νερού.

7) Μετά από απολύμανση, υποκαπνισμός, ηλιοαπολύμανση ή βιοαπολύμανση του εδάφους, θα πρέπει να αφήσετε ικανό διάστημα πριν την εφαρμογή του T34 BIOCONTROL.

8) Όταν το T34 BIOCONTROL εφαρμόζεται μέσω του συστήματος της στάγδην άρδευσης, εφαρμόστε το στην προτελευταία άρδευση της ημέρας, για να διασφαλίσετε ότι δεν θα παραμείνουν υπολείμματα σκευάσματος στο σύστημα άρδευσης, να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος

έκπλυσης προς το τέλος της άρδευσης και να εξασφαλίζεται καλή διάχυση του προϊόντος γύρω από το ριζικό σύστημα των φυτών.

9) Ψεκάσμος του υποστρώματος

Εφαρμόστε το σκεύασμα ψεκάζοντας σε δόση 0,5 γρ /m² επιφάνειας υποστρώματος πριν τη μεταφύτευση, διαλύοντας 10 γρ./ 100 λίτρα νερού και εφαρμόζοντας με ψεκάσμο ή διαβροχή του υποστρώματος, 5 λίτρα διαλύματος /m² υποστρώματος.

10) Μέσω του συστήματος στάγδην άρδευσης

Εφαρμόστε το προϊόν στο έδαφος με στάγδην άρδευση με δόση 50 γρ./στρέμμα προϊόντος διαλύοντας το σε 200 - 600 λίτρα/στρέμμα νερό.

***Μετά την εφαρμογή του φυτοπροστατευτικού προϊόντος με εμβάπτιση των ριζών ή με ψεκάσμο του υποστρώματος καλλιέργειας στο φυτώριο στην καλλιέργεια της φράουλας και των μούρων και μικρών καρπών, μπορούν να ακολουθήσουν εφαρμογές στον αγρό μέσω της στάγδην άρδευσης της καλλιέργειας.**

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε μέρος ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο και σε θερμοκρασία 4°C παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του. Μην καταψύχετε το σκεύασμα.

II. Ετικέτα σκευάσματος

- Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
- Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
- Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. πρωτ. 10586/293441π.ε./16.02.2022 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ κ.α.α.**

ΧΡ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ