

**Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:**

ΣΕ ΠΕΡΙΤΤΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφρονο νερό. ΣΕ ΠΕΡΙΤΤΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Σπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακί σπορίων, αφαιρέστε τους αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να φτιάχνετε. ΣΕ ΠΕΡΙΤΤΩΣΗ ΚΑΤΑΓΩΣΗΣ: Σπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε έμετο. ΣΕ ΠΕΡΙΤΤΩΣΗ ΕΣΠΙΝΟΗΣ: Μασάριστε τον παρόντα στον καθαρό αέρα. Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.  
ΤΗΛ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΑΣΕΩΝ: 210-7793777

**Δηλώσεις επενδυνότητας:** Επιδράει για τους υδρόφιους οργανισμούς με μακροχρόνιες σπυρίαιες. Πράξιμο Azadirachtin. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις.

Για να αποφύγετε τους ενδύλους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**Δηλώσεις προφύλαξης:** Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. - Να φοράτε προστατευτικό γάντι/ προστατευτικό ενδύμα/ μέσα σπορίων προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. - Να φοράτε πάντα γάντια κατά τη χρήση. - Δόση του παραγόμενου/ παράσιτου σύμφωνα με την ετικέτα/ κωδέξιο. - Μην αναμιγνύετε με άλλα σκευάσματα.

Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην καθαρίζετε τον εξωτερικό φερμαγόν κωνό σε σπασμένο ύδατο. Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λάσπες σπασίματος και τους δρόμους). Για να προστατέψετε τους υδρόφιους οργανισμούς να αφηρέτε από το σπασμένο ύδατο - μια σφαιρική ζώνη προστασίας 30 μέτρων σε των οποίων το 20 μέτρο να είναι φυτική ζώνη απόχλησης για πρώτες εφαρμογές ή 20 μέτρα φυτική ζώνη απόχλησης για άμεγες εφαρμογές σε καλλιέργειες μηλοδύλων και πυρροκαρπών. - μια φυτική ζώνη απόχλησης 20 μέτρων σε καλλιέργειες καλλιτεχνικών. - μια φυτική ζώνη απόχλησης 10 μέτρων σε καλλιέργειες ταμπάκ, πιπεριάς, μελιτζάνας, αγγουριού και καλαμποκιού. Για να προστατέψετε το ανθρώπινο μη στόμαχο να αφηρέτε μια σφαιρική ζώνη προστασίας από μη γεωργική γη:

- 10 μέτρων σε συνδυασμό με χρήση ακροαριών μείωσης της διασποράς του φυλαστικού κατά 80% σε καλλιέργειες μηλοδύλων και πυρροκαρπών. - 5 μέτρων σε συνδυασμό με χρήση ακροαριών της διασποράς του φυλαστικού κατά 30% σε καλλιέργειες καλλιτεχνικών.

Επιτομικό σπορίο και σπόγγου με δραστικότητα δράση. Η δραστική του ουσία είναι προϊόν σπυρίαιας των σπορίων του τροπικού φυτού *Azadirachta indica*, δέντρο του Νότιου (Neem). Δρα μέσω σπορίων και ανάπτυξης ως μυκητιακής ανάπτυξης, παραβιάζοντας στην εξέλιξη των σπορίων στο στάδιο σπυρίαιας. Παράλληλα, παρεμποδίζει την σύνθεση αβύσσων (ορμόνη που λέγεται την έκθεση). Έχει επίσης αντιτροφικές και αντιβιολογικές ιδιότητες.

Παρασκευαστής σκευάσματος Trifolio-M GmbH, Dr-Hans-Wilhelmi-Weg 1, D-35633 Lahnau, Γερμανία.

Κάτοχος της άδειας Trifolio-M GmbH, Dr-Hans-Wilhelmi-Weg 1, 35633 Lahnau, Γερμανία, Contact person: Dr. Kerstin Jung, Tel: +49 6441 209 77 27, E-mail kerstin.jung@trifolio-m.de.

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: ANTHESIS ΙΚΕ, Εμ. Μπενάκη 8, 14561 Κηφισιά - Αθήνα, Τηλ: +30 210 8012367, Φαξ: +30 210 6233196, E-mail info@antthesis.gr.

 Περιεχόμενο: 30 κ.εκ.

# azagreen

Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ):  
14802 / 06.05.2022

Προορίζεται για ερασιτεχνική χρήση.

Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:  
Δραστική ουσία: Azadirachtin A 1 % β/β  
Βοηθητικές ουσίες: 96% β/β



**FARMA-CHEM SA**

Διανομή:  
ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ  
ΒΙΛΕ ΣΥΝΔΟΥ - Γ ΖΩΝΗ - Τ.Θ.1026  
570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
ΤΗΛ: 2310 569.630 έως 3 - FAX: 2310 797.047 -  
info@farmachem.gr

ΕΣΚΛΕΙΣΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΟΙΞΤΕ ΕΛΑΤ

ΑΡ. ΠΑΡΤ/ΗΜ. ΠΑΡΑΓ./ΗΜ ΛΗΞ.: Βλέπε επί της συσκευασίας

#### Οδηγίες χρήσης:

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής φυλλακτικού υγρού: Ανακινείτε καλά πριν από τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του φυλλακτικού μηχανήματος σε ποσοστό 30-50%. Προσθέστε στο φυλλακτικό την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος και συμπληρώστε με νερό ακολουθώντας οδηγίες. Για καλύτερα αποτελέσματα, το pH του φυλλακτικού υγρού θα πρέπει να διαφέρει όλο (pH 4,5-6). Η εφαρμογή θα πρέπει να γίνει αμέσως μετά την παρασκευή του φυλλακτικού υγρού και υπό αμεση ανάδραση.

Τρόπος καθαρισμού του εξοπλισμού: Αδειάστε πλήρως το φυλλακτικό βυθό. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Επλάμστε το φυλλακτικό βυθό και όλα τα εξαρτήματα του φυλλακτικού τρις (3) φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Το κενό μίγμα συσκευασίας φτιάχνεται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό βήξιμο (το νερό του βήξιματος το ρίχνουμε στο δοχείο ψεκασμού) και στη συνέχεια αφού καταπραυνούν προηγουμένως με τρίπτυχο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης αποσπώνται σε σημείο συλλογής για ανακύκλωση ή απόκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα -

Φάσμα δράσης:

Πεδίο Εφαρμογής:Σταχυοειδούς σκευάσματος Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:

Τομάτο (Υ), Πιπερά (Υ), Μελιτζάνα (Υ) Για θρίπες (*Frankliniella occidentalis*, Πηριε βιάσι, Πηριε αρ.), Πρόσνη σκουλήρι (*Helicoverpa armigera*), Σπονδυλόπαρα (*Spodoptera exigua*) με 2-3 κιλ/10 τμ και όλο φυλλακτικό υγρού 500-1500 κιλ/10 τμ. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής μέχρι το 50% των καρπών να έχουν υμώματα (μέχρι BBCH 85).

Τομάτο (Θ), Πιπερά (Θ), Μελιτζάνα (Θ) Για Αλευρίδας (*Toxicarodes uronatorum*, *Bemisia tabaci*), θρίπες (*Frankliniella occidentalis*, Πηριε βιάσι, Πηριε αρ.), Φυλλοκίττας (*Tuta absoluta*, *Litotrypa* αρ.), με 2-3 κιλ/10 τμ και όλο φυλλακτικό υγρού 500-1500 κιλ/10 τμ. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής

μέχρι το 50% των καρπών να έχουν υμώματα (μέχρι BBCH 85).

Μελιτζάνα (Υ+Θ): Για Δορυφόρο (*Leptothorax acanthoides*) με 2-3 κιλ/10 τμ και όλο φυλλακτικό υγρού 500-1500 κιλ/10 τμ. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής μέχρι το 50% των καρπών να έχουν υμώματα (μέχρι BBCH 85).

Αγγούρι (Θ), Κολοκυθάκι (Θ) Για Αφίδας (*Aphis gossypii*, *Mysus persicae*), Αλευρίδας (*Toxicarodes uronatorum*, *Bemisia tabaci*), θρίπες (*Frankliniella occidentalis*, Πηριε βιάσι, Πηριε αρ.) με 2-3 κιλ/10 τμ και όλο φυλλακτικό υγρού 500-1500 κιλ/10 τμ. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής μέχρι το 50% των καρπών να έχουν υμώματα (μέχρι BBCH 85).

Ροδιανάκι, Βερδικιά: Για Αφίδας (*Mysus persicae*), θρίπες (*Frankliniella occidentalis*, Πηριε αρ.) με 2-3 κιλ/10 τμ και όλο φυλλακτικό υγρού 500-1500 κιλ/10 τμ. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής (μέχρι BBCH 85).

Μηλιά: Για Αφίδας (*Aphis pomi*), *Dysaphis plantaginis*, *Erissone larivora* με 2-3 κιλ/10 τμ και όλο φυλλακτικό υγρού 500-1500 κιλ/10 τμ. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής (μέχρι BBCH 85).

Καλλυμτσικό (Υ): Για Αφίδας (*Aphis gossypii*, *Mysus persicae*), Αλευρίδας (*Toxicarodes uronatorum*, *Bemisia tabaci*), θρίπες (*Frankliniella occidentalis*, Πηριε βιάσι, Πηριε αρ.), Πρόσνη σκουλήρι (*Helicoverpa armigera*), Σπονδυλόπαρα (*Spodoptera exigua*) με 2-3 κιλ/10 τμ και όλο φυλλακτικό υγρού 500-1500 κιλ/10 τμ. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής (μέχρι BBCH 85).

Καλλυμτσικό (Θ): Για Αφίδας (*Aphis gossypii*, *Mysus persicae*), Αλευρίδας (*Toxicarodes uronatorum*, *Bemisia tabaci*), θρίπες (*Frankliniella occidentalis*, Πηριε βιάσι, Πηριε αρ.), Φυλλοκίττας (*Litotrypa* αρ., *Phytomyza* αρ.) με 2-3 κιλ/10 τμ και όλο φυλλακτικό υγρού 500-1500 κιλ/10 τμ. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής (μέχρι BBCH 85).

Μήγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο με μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες για όλες τις καλλιέργειες: 3/7-10

#### Παρατηρήσεις:

1. Να εφαρμόζεται κατά τις δραστηριότητες και σκαρπών της ημέρας.
2. Να φοράτε σπουδαίο αέθριο.
3. Η δόση μεταξύ 200 - 300 κιλ ανά στρέμμα εξαρτάται από το στάδιο της προσβολής.
4. Πριν τη χρήση του σκευάσματος στο καλλυμτσικό να πραγματοποιηθεί δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρή κλίμακα για τον έλεγχο φυτοφθορίας.

Ειδικές συνθήκες γεωργικής φυτογνώσης ή παθολογολογικής υπό τις οποίες το σκευάσμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποδοθεί:

Διατήρηση ανθεκτικότητας: Το σκευάσμα περιέχει τη δραστική ουσία Azadirachtin-A, που ανήκει στην ομάδα (JN – compounds of unknown or uncertain MoA) κατά IRAC. Το προϊόν δεν είναι συμβατό με προϊόντα πολύ όλης (π.χ όλης αργήλου) ή πολύ αλκαλικής αντίδρασης (π.χ. πολυβασικό ασβέστη, βερδικιάς πούδος κ.λπ.)

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκευάσμα: 24 ώρες

Σταχυοειδούς φυτοφθορίας, ευαίσθητος ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στο φυτό ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοφθόρο όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με το αναγραφόμενο στην ετικέτα του.

Τελειώσα επιβίβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη δόξαση στην αγορά όταν πρόκειται για μεταποιητικές χρήσεις:

Τομάτο (Υ+Θ), Μελιτζάνα (Υ+Θ), Πιπερά (Υ+Θ), Αγγούρι (Θ), Κολοκυθάκι (Θ), Ροδιανάκι, Βερδικιά, Μηλιά, Καλλυμτσικό (Υ+Θ): 3 ημέρες

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Να αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο και μακριά από άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για ένα (1) χρόνο.

ΑΡ. ΠΑΡΤ/ΗΜ. ΠΑΡΑΓ/ΗΜ ΛΗΞ.: Βλέπε επί της συσκευασίας