

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία mesosulfuron-methyl και ανήκει στην ομάδα των σουλφονυλ ουρίων (μηχανισμός δράσης: ομάδα HRAC): Β. Δρα παρεμποδίζοντας το ένζυμο ALS, συνθέτωση του οξεγαλακτικού. Είναι δασυστηματικό μεταφωτρωτικό ζζανιοκτόνο, για την καταπολέμηση ορισμένων αγρωστωδών ζζανίων στα σιτηρά. Η απορρόφηση στα φυτά γίνεται κυρίως μέσω των φύλλων, αλλά είναι δυνατή και μέσω των ριζών. Τα αποτελέσματα από την χρήση του προϊόντος επί των ζζανίων εμφανίζονται λίγες μέρες μετά την εφαρμογή με ποσότητα της ανάπτυξης, εμφάνιση γλωκκωμάτων κηλίδων και νέκρωση των βλαστών. Τα ευαίσθητα ζζανία ξεραίνονται πλήρως 4-6 εβδομάδες μετά την εφαρμογή.

Τρόπος εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός του φυλλώματος των ζζανίων με ακροφύσια τύπου ακούσιες με 20-40 λίτρα νερό ανά στρέμμα.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Τα ψεκαστικά μηχανήματα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από υπολείμματα άλλων προϊόντων. Συνιστούμε να καθαρίζετε τον ψεκαστήρα σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης των προϊόντων που χρησιμοποιήθηκαν.

- Ανακατέψτε καλά το μπουκάλι πριν την χρήση.

- Γεμίστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος στο δοχείο ψεκασμού με γέμισμα από 1/4 έως 1/2 της μέγιστης χωρητικότητας.

- Γεμίστε την αναμειγνύουσα ποσότητα νερού υπό συνεχή ανάδευση.

- Προσθέστε τη συνιστώμενη δόση του επηρεαζοδραστικού OLliWAR.

Κατά την διάρκεια του ψεκασμού θα πρέπει ο αναδευτήρας να είναι σε συνεχή λειτουργία.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Για να αποφευχθούν ζημιές σε επόμενες καλλιέργειες, αμέσως μετά από ψεκασμό, ξεπλύνετε σχολαστικά το ψεκαστικό μηχάνημα, ακολουθώντας την εξής διαδικασία:

1. Αδειάστε το βυτίο.

2. Αραιώστε τα υλικά υπολείμματα που παραμένουν στο ψεκαστικό μηχάνημα με νερό, σε αναλογία 1:10 και ψεκάστε την καλλιέργεια που έχει γίνει ψεκασμός, με το μίγμα να βρίσκεται υπό συνεχή ανάδευση.

3. Ξεπλύνετε τα τοιχώματα του εσωτερικού του βυτίου με νερό, έως ότου γεμίσει το 20% της χωρητικότητας του ψεκαστικού δοχείου. Προσθέστε το καθαριστικό. Ενεργοποιήστε τον αναδευτήρα για 2 λεπτά στη συνιστώμενη αδειάσει του δοχείου.

4. Γεμίστε ξανά το βυτίο με νερό περίπου έως το 20% της χωρητικότητας του ψεκαστικού δοχείου και ενεργοποιήστε τον αναδευτήρα για 2 λεπτά. Στη συνέχεια αδειάσει το δοχείο.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του υποστηρικτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα υλικά συσκευασίας ξεπλύνονται υπό πίεση ή γίνεται τρίψιμο ξεπλύματος (για νερά του ξεπλύματος τα ριχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενος με τρίψιμο για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, ενισχυόμενοι σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: -

Πεδία εφαρμογής/Στόχος/Δόσεις σκευάσματος/Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:

Τριτοβάθμια: Για ευαίσθητα ζζανία: **Αλεπονουρά (Alopecurus myosuroides):** με 15-20 γρ./στρέμμα με προώθηση 60-80 κ.εκ OLliWAR και όγκο ψεκ. υγρού 20-40 λίτρα/στρέμμα.

Χειμερινό Σπάρδι (μαλακό): Για μετρίως ευαίσθητα ζζανία: **Κονή Πλόα (Poa annua):** με 15 γρ./στρέμμα με προώθηση 60 κ.εκ OLliWAR και όγκο ψεκ. υγρού 20-40 λίτρα/στρέμμα. Για ευαίσθητα ζζανία: **Αλεπονουρά (Alopecurus myosuroides):** με 15-25 γρ./στρέμμα με προώθηση 60-100 κ.εκ OLliWAR και όγκο ψεκ. υγρού 20-40 λίτρα/στρέμμα.

Για ευαίσθητα ζζανία: **Αγριοβρόμη (Avena fatua)** και για μετρίως ευαίσθητα ζζανία: **Ήρα (Lolium sp):** με 15-20 γρ./στρέμμα με προώθηση 60-80 κ.εκ OLliWAR και όγκο ψεκ. υγρού 20-40 λίτρα/στρέμμα.

Σιταλή: Για ευαίσθητα ζζανία: **Αγριοβρόμη (Avena fatua)**, **Αλεπονουρά (Alopecurus myosuroides)** και για μετρίως ευαίσθητα ζζανία: **Ήρα (Lolium sp):** με 15-20 γρ./στρέμμα με προώθηση 60-80 κ.εκ OLliWAR και όγκο ψεκ. υγρού 20-40 λίτρα/στρέμμα.

Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Κατευθυνόμενος επί του εδάφους ψεκασμός την άνοιξη, από την αρχή του αδελφώματος έως ότου ο δεύτερος κόμπος είναι τουλάχιστον 2 εκ. πάνω από τον πρώτο κόμμο. (BBCH 20-32).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο για όλες τις καλλιέργειες: 1

Παρατηρήσεις:

1. Το σκεύασμα εφαρμόζεται σε συνδυασμό με το επηρεαζοδραστικό σκεύασμα OLliWAR, σύμφωνα με τις συνιστώμενες δόσεις.

2. Καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν γίνονται ψεκασμοί σε νεαρά φυτά ζζανίων στο στάδιο έντονης ανάπτυξης σε συνθήκες που ευνοούν την έντονη ανάπτυξη.

3. Η θερμοκρασία, υψήλη υγρασία του αέρα και του εδάφους επιταχύνουν τη δράση του προϊόντος ενώ η ξηρασία και άλλες δυσμενείς συνθήκες για την ανάπτυξη των ζζανίων δυσχεραίνουν την καταπολέμηση.

Altivate 6WG

Εναιωρηματοποιησιμο κόκκοι (WG)

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ/ΥπΑΑΤ): 70438 / 23.11.2021

Εγγυημένη σύνθεση:

Δραστική ουσία: mesosulfuron-methyl 6 % β/β,

metenpyr-diethyl (αντιφωτοτοξική ουσία): 12% β/β, Βοηθητικές ουσίες: 81,56 % β/β.

Είναι δασυστηματικό μεταφωτρωτικό ζζανιοκτόνο, για την καταπολέμηση ορισμένων αγρωστωδών ζζανίων στα σιτηρά. Η απορρόφηση στα φυτά γίνεται κυρίως μέσω των φύλλων, αλλά είναι δυνατή και μέσω των ριζών.



ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Για να αποφεύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

H FARMACHEM SA εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας.

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

ΦARMA-ΧΗM Α.Β.Ε.Ε.

ΒΙ.Π.Ε. Σίνδου, Γ' Ζώνη, Σίνδος,

Θεσσαλονίκη 57022, Τ.Θ. 1026

Τηλ.: 2310 569630-33

Fax: 2310 797047

E-mail: info@farmachem.gr

FARMA-CHEM SA

ΑΡ. ΠΑΡΤ/ΗΜ. ΠΑΡΑΓ/ΗΜ ΛΗΞ.: Βλέπε επί της συσκευασίας

Δηλώσεις προφύλαξης:

- Φυλάσσετε κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
- Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Διάθεση του περιεχομένου/περιεκτα σύμφωνα με τη εθνική νομοθεσία.
- Φοράτε ολοκληρωμένο εξοπλισμό κατά την φόρτωση/ανάμειξη και εφαρμογή του σκευάσματος. Σε περίπτωση επανεισοδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο, μακριά παντελόνι.
- Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά. Αποφύγετε τη ρύπανση μέσω των συστημάτων αποστράγγισης νερών από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τους δρόμους).
- Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων.
- Για να προστατέψετε τα φυτά μη-στόχους να αφήσετε μια απόσταση ζώνη 3 μέτρων.

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

ΓΕΝΙΚΑ: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Απαράδεκτο αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΣΠΟΝΗΣ: Μεταφέρετε τον πιθανό από το χώρο της έκθεσης, στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Απαιτείται τεχνική ανίχνηση σε περίπτωση αναπνευστικής ανεπάρκειας.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: πλύντε αμέσως καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. Βγάλτε όλα τα μολυσμένα, εμπιστευμένα ρούχα, ζητήστε ιατρική συμβουλή σε περίπτωση ερεθισμού του δέρματος (ερυθρότητα, κλπ.).

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε καλά με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά, ζητήστε ιατρική συμβουλή, εάν είναι απαραίτητο.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣ: Ξεπλύνετε καλά το στόμα με νερό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείξτε τη συσκευασία ή/και την ετικέτα και τις οδηγίες χρήσης, όπου είναι δυνατόν. Ποτέ μην δίνετε τίποτα από το στόμα σε ένα άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Μην προκαλέτε εμετό εκτός μετά από εντολή ενός γιατρού.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή βερβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί να αποσκευαστεί:

Να μην εφαρμόζεται σε καταπονημένους ή εξασθενημένους καλλιέργειες.

Διαχείριση ανεπιθύμητων: Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία mesosulfuron-methyl, η οποία ανήκει στην ομάδα 2 κατά HRAC. Να εφαρμόζονται διαδοχικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζζανίων (μηχανική, μηχανική μέθοδος, καλλιεργητική μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζζανιοκτόνων (ζζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανεπιθύμητων.

Χρονική διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεστε στον ψεκασμένο αγρό πριν να έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

Τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μεταλλευτικές χρήσεις: Χειμερινό Σπάρδι μαλακό, Σιταλή, Τριτοβάθμια: -

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον, εάν διατηρηθεί στην αρχική του κλασική συσκευασία σε θερμοκρασία όχι πάνω από 30°C μακριά από φωτιά ή άλλες πηγές θερμότητας σε ξηρό και δροσερό χώρο.

"Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελματία χρήστη εφόσον ζητηθεί"

Καθαρό βάρος: 500 γραμ.