

**Εγγυημένη σύνθεση: Δραστική ουσία: Flazasulfuron 25% β/β, Βοηθητικές ουσίες: 73,41% β/β**

**ΕΝΑΙΩΡΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟΙ ΚΟΚΚΟΙ (WG)**  
Flazasulfuron

**ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΩΣΤΩΔΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

**ΠΡΟΣΟΧΗ H410:** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: P405+P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. **P270:** Μη τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

**P501:** Διάθεση περιεχομένου/περίεκτ σύμφωνα με τοπικούς κανονισμούς.

**ΕΥΗ401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.



Κατοχος της άδειας - Υπεύθυνος κυκλοφορίας: ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ, ΒΙ.Π.Ε.Θ. Σίνδος, 570 22 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 569630-3, Fax: 2310 797047, E-mail: registration@farmachem.gr



**ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 200 ΓΡ**

Ημερ. Παραγωγής (Man. Date) / Αρ. Παρτίδας (Batch No.): Βλέπε στην επιφάνεια της συσκευασίας



**SP1:** Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένεται τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα / Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιβόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους). **SPe3:** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς: - να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα: 10 μέτρων, σε αμπέλι και ελιά, 10 μέτρων, με φυτική κάλυψη, σε εσπεριδοειδή, 20 μέτρων, με φυτική κάλυψη, σε ακαλιέργειες εκτάσεις. **SPe2:** Να μην εφαρμόζεται σε εδάφη με κλίση μεγαλύτερη του 4%. **SPe3:** Σε ακαλιέργειες εκτάσεις, για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους, να αφήσετε μίαν αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη ή να χρησιμοποιήσετε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%.

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε καλά τα προβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση κατάποσης: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την επικέτα. Μην προκαλέστε εμετό. Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον ασθενή από το χώρο της έκθεσης. **Αντιδοτό:** Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. **ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777.**

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλυσμα (να νερό του ξεπλύματος το ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή με σκίσιμο (φιάλες, κουτιά), για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Διαχείριση ανθεκτικότητας: Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδο αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και: i. σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: Δεν απαιτείται, ii. σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Δεν απαιτείται, iii. της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Να μην εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό.

**Φυτοτοξικότητα:** Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στη επικέτα του

σκεύασματος.  
**Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:** Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής όταν αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

**Κατηγορία και τρόπος δράσης:** Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση επίσημων και πολυετών πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων, προφυτρωτικά ή νωρίς, μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, σε αμπέλι, ελιά, εσπεριδοειδή και ακαλιέργειες εκτάσεις. Απορροφάται από το φύλλωμα και τις ρίζες των ζιζανίων, μετακινείται μέσω της αποπλάστικής και συμπλαστικής οδού και συγκεντρώνεται στους νεαρούς μεριστωματικούς ιστούς, παρεμποδίζοντας την ανάπτυξη τους.

**ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (ΛΕΜΟΝΙΑ, ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ (ΚΑΜΗΤΙΝΕΣ), ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ, ΓΚΡΕΪΦ ΦΡΟΥΤ, ΚΙΤΡΑ, κ.α.):** Για Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια, Πολυετή ζιζάνια δόση 16 γρ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 20 – 40 λίτρα/στρ. Κατευθυνόμενος ψεκασμός στη γραμμή φύτευσης ή τοπικά, καλύπτοντας επιφάνεια έως το 1/3 της συνολικής έκτασης του αγρού. Εφαρμόζεται προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, την άνοιξη – καλοκαίρι. Μία (1) εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο.

**ΕΛΙΑ:** Για Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια, Πολυετή ζιζάνια δόση 16 γρ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 20 – 40 λίτρα/στρ. Κατευθυνόμενος ψεκασμός στην γραμμή φύτευσης ή τοπικά, καλύπτοντας επιφάνεια έως το 1/3 της συνολικής έκτασης του αγρού. Εφαρμόζεται προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το φθινόπωρο έως και την άνοιξη. Μία (1) εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο.

**ΑΜΠΕΛΙ:** Για Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια, Πολυετή ζιζάνια δόση 16 γρ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 10 – 40 λίτρα/στρ. Κατευθυνόμενος ψεκασμός στην γραμμή φύτευσης ή τοπικά, καλύπτοντας επιφάνεια έως το 1/3 της συνολικής έκτασης του αγρού. Εφαρμόζεται προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, στο τέλος του χειμώνα ή στις αρχές της άνοιξης. Μία (1) εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο.

**ΑΚΑΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ (ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ, ΠΛΑΤΕΙΕΣ, ΠΛΑΙ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ, ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΝΕΛ, ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ):** Για Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια, Πολυετή ζιζάνια δόση 20 γρ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 10 – 40 λίτρα/στρ. Εφαρμόζεται προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά των ζιζανίων. Μία (1) εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο.

**Παρατηρήσεις:**

- Καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται με προφυτρωτικές εφαρμογές.
- Τα ζιζάνια είναι ευαίσθητα μέχρι το στάδιο των 4 φύλλων ή έως τα 10 εκ ύψος.
- Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. Αποφύγετε τη διασπορά του ψεκαστικού νέφους σε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.

**Καταπολεμούμενα ζιζάνια:**  
**Ευαίσθητα ζιζάνια (>85%):** Αγρωστώδη: Αγριοβρώμη (*Avena fatua*), Αγριοβρώμη (*Bromus stentis*), Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*), Ήρα (*Lolium spp.*), Πόα (*Poa annua*), Σέταριες (*Setaria verticillata*, *S. Viridis*, *S. Pumila*). Πλατύφυλλα: Βλήθο: (*Amaranthus retroflexus*), Καλεντούλα (*Calendula arvensis*), Καμήλα (*Capsella bursa-pastoris*), Λουβρούδι (*Chenopodium album*), Κόνυδα (*Conyza (Erigeron) canadensis*), Αγριοκαρότο (*Daucus carota*), Άγρια ρόκα (*Diplotaxis erucoides*), Καπνόχορτο (*Fumaria spp.*), Γεράνι (*Geranium dissectum*, *G. rotundifolium*), Λάμιο (*Lamium spp.*), Μολόχα (*Malva spp.*), Αντράκλια (*Portulaca oleracea*), Μαρκόπουλο (*Senecio vulgaris*), Στελλάρινα (*Stellaria media*), Στόφυνος (*Solanum nigrum*), Αγριορόδι (*Taraxacum officinale*), Τριφύλλι (*Trifolium spp.*), Τσουκνίδα (*Urtica spp.*).

**Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια (> 70% < 85%):** Περιτλοκάδα (*Convolvulus arvensis*), Κύπερη (*Cyperus spp.*), Γαλατσίδα (*Euphorbia spp.*), Ζωχοί (*Sonchus arvensis*, *S. oleraceus*), Βερβόνικα (*Veronica persica*).

**Τελευταία επίμβαση πριν τη συγκομιδή (σε ημέρες):** Εσπεριδοειδή, Ελιά: 45 ημέρες. Αμπέλι: 75 ημέρες.

**Τρόπος εφαρμογής:** κατευθυνόμενος ψεκασμός προφυτρωτικά ή νωρίς, μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, χωρίς να έλθουν σε επαφή τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος με το φύλλωμα, τους τρυφερούς βλαστούς, τις παραφυάδες ή τη επουλωμένες πληγές κλαδέματος των καλλιεργειών. Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας και ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 2 ατμόσφαιρες (30 PSI).

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού.

**Καθαρισμός ψεκαστήρα:** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

**ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ**  
Το παρόν σκεύασμα κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά βάσει της άδειας παράλληλης εισαγωγής ΥΠΑΑΤ με αρ. πρωτ. 10165/290819/15.11.2023. Είναι πανομοιότυπο με το σκεύασμα MINSK, το οποίο ήδη κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά δυνάμει της με αριθ. 70246 / 18.10.2017 έγκρισης κυκλοφορίας.