

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανανήστε καλά το δοχείο/φιάλη πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την αναδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυνματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Πεδίο Εφαρμογής-Στόχος-Δόσεις-Τρόπος και χρόνος εφαρμογής-Μέγ. αριθμός εφαρμ/ ανά καλλιέργ.περ. -Μεσοδιάστ. Εφαρμογών σε ημέρες:

Φράουλα (Υ): Για **Πιδίο** (*Podosphaera aphanis*) με 40 κ.εκ. σκ. /στρέμμα σε όγκο ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών από την ανάπτυξη του καρπού έως τη συγκομιδή (BBCH 70-89). **Αγγούρι (Υ), Κολοκυθάκι (Υ):** Για **Πιδίο** (*Erysiphe cichoracearum*, *Sphaerotheca fuliginea*) με 40 κ.εκ. σκ. /στρέμμα σε όγκο ψεκ. υγρού 50-120 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμοί όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών όταν οι πρώτοι καρποί στο κύριο στέλεχος έχουν το τυπικό μέγεθος και σχήμα (BBCH 70-71). **Πεπόνι (Υ), Καρπούζι (Υ):** Για **Πιδίο** (*Erysiphe cichoracearum*, *Sphaerotheca fuliginea*) με 40 κ.εκ. σκ. /στρέμμα σε όγκο ψεκ. υγρού 50-120 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμοί, όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών, όταν οι πρώτοι καρποί στο κύριο στέλεχος έχουν το τυπικό μέγεθος και σχήμα έως την πλήρη συγκομιδή (BBCH 70-89). Επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής. **Καπνός:** Για **Πιδίο** (*Erysiphe cichoracearum*) με 50 κ.εκ. σκ. /στρέμμα σε όγκο ψεκ. υγρού 20-100 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών από την ανάπτυξη των πλάγιων βλαστών έως τη συγκομιδή (BBCH 20-99).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιερητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες για όλες τις καλλιέργειες: 2/10-14.

Παρατηρήσεις:

1. Να μην εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της άνθησης των καλλιεργειών (BBCH 60-69) σε φράουλα και κολοκυθοειδή, για να αποφευχθούν υπολείμματα στο μέλι.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Το σκεύασμα περιέχει penconazole που ανήκει στην ομάδα 3 κατά FRAC.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Εφαρμόστε το προϊόν προληπτικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενειών και αποφύγετε τις θεραπευτικές εφαρμογές. Συνιστάται η εναλλαγή με μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

Τα συγκομιζόμενα προϊόντα από την καλλιέργεια της φράουλας να μην χρησιμοποιούνται σε διαδικασίες μεταποίησης.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό από τα φύλλα.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις.

Penco

Υγρό Γαλακτωματοποίηση (EC)

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 61206/ 30.05.2025

Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: penconazole 10% β/ο - Βοηθητικές ουσίες: 89,53% β/β

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση για την καταπολέμηση του ωιδίου σε διάφορες καλλιέργειες. Η δραστική ουσία ανήκει στη ομάδα των τριαζολών (DMIs) και δρα παρεμποδίζοντας την βιοσύνθεσης της εργοστερόλης.



UFI: MCPY-JH1X-NY0G-CW2E

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- Υποπνο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.
- Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Παρασκευαστής σκευάσματος:
SHARDA CROPCHEM LIMITED

Κάτοχος της άδειας: Sharda Cropchem España S.L.
Edificio Alaylas Business Center,
Camí Condomina nº 3, 12th Floor,
30006 Murcia - Ισπανία
E-mail: regn@shardaint.com

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
SHARDA BALKAN ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΜΟΝ. Ε.Π. Ε.
Μοναστηρίου 9, 54627 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 521045
E-mail: athinasarakini@gmail.com



Εργαστήριο συσκευασίας του σκευάσματος:
FARMA-CHEM SA
ΒΙΛΠΕ, ΣΙΔΑΟΥ - Γ' ΖΩΝΗ - Τ.Θ.1026
Μοναστηρίου 9, 54627 Θεσσαλονίκη
ΤΗΛ.: 2310 569.630 έως 3 - FAX: 2310 797.047
info@farmachem.gr - www.farmachem.gr

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.**

Δηλώσεις προφύλαξης:

Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά

Μη τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Εφοδιάστε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

«Φοράτε γάντια, ολόσωμη φόρμα εργασίας και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο κατά την ανάμιξη /φόρτωση και προστατευτικά γάντια και ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την εφαρμογή».

«Σε περίπτωση επανεξόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε γάντια, μακρύ παντελόνι και μακριά μανίκι ποκάμισο».

Διάθεση του περιεχομένου/περιεκτή σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

Για να προστατέψετε τα υπόγεια νερά μην εφαρμόζετε το προϊόν σε όξινα εδάφη.

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση κατάποσης: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις: Καπνός: 14 ημέρες. Φράουλα (Υ), Αγγούρι (Υ), Κολοκυθάκι (Υ), Πεπόνι (Υ), Καρπούζι (Υ): 3 ημέρες.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Αποθηκεύεται στην αρχική του απαράβιαστη συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από την έκθεση σε ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΑΡ. ΠΑΡΤ/ΗΜ. ΠΑΡΑΓ.: Βλέπε επί της συσκευασίας



Περιεχόμενο: 1 Λίτρο