

Τρίτοιο εφαρμογή: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.

Τρίτοιο παρασκευάζει ψεκαστικό υγρό εφαρμογής: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα του αρχικού αναλύτη. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό αναμειγνύοντας την ανάδραση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αδειάζετε τελείως το ψεκαστικό βυθίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυθίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. Πριν το ξαναχρησιμοποιήσετε ξεπλύνετε καλά με άφθονο νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Το κενό υλικό συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκόνη, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποδογίανται όλα σε σημείο συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνιστάσεις: Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.

Πεδίο Εφαρμογής/ Στόχος/ Δόσεις σκευάσματος/ Τρίτοιο και χρόνος εφαρμογής:

Μήλα: Για αφίδες, Γκριζά αφίδα (*Dysaphis plantaginea*), Πρόσθια αφίδα (*Aphis pomi*). Δόση με 14 γρ./ στρ. ή 8-14 γρ./100 λίτρα φεκ. υγρού. Όγκος φεκ. Υγρού: 100-150 λίτρα/ στρ. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, χωρίς την παρουσία μελισσών.⁽¹⁾ Μέγιστος αριθμ. εφαρμογών ανά καλλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): 3 εφαρμογές ανά 21 ημέρες, εφόσον απαιτείται. **Αχλάδι:** **Αφίδες:** Γκριζά αφίδα της **αχλάδας** (*Dysaphis rho*). Δόση με 14 γρ./ στρ. ή 8-14 γρ./100 λίτρα φεκ. υγρού. Όγκος φεκ. Υγρού: 100-150 λίτρα/ στρ. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, χωρίς την παρουσία μελισσών.⁽¹⁾ Μέγιστος αριθμ. εφαρμογών ανά καλλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): 3 εφαρμογές ανά 21 ημέρες, εφόσον απαιτείται. **Ροδιανά:** **Αφίδες** (*Mycus persicae*), (*Hyalopterus persici*). Δόση με 14 γρ./ στρ. ή 8-14 γρ./100 λίτρα φεκ. υγρού. Όγκος φεκ. Υγρού: 100-150 λίτρα/ στρ. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, χωρίς την παρουσία μελισσών.⁽¹⁾ Μέγιστος αριθμ. εφαρμογών ανά καλλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): 2 εφαρμογές ανά 21 ημέρες, εφόσον απαιτείται. **Αγγούρι (Θ), Αγγουράκι (Θ), Κολοκυθάκι(Θ): Αφίδες** (*Aphis gossypii*). Δόση με 10 γρ./ στρ. Όγκος φεκ. Υγρού: 50-100 λίτρα/ στρ. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, χωρίς την παρουσία μελισσών.⁽¹⁾ (Ιδιαίτερα στο θερμοκήπιο όταν το 5% των φυλλών έχει προσβληθεί από 1 ή περισσότερα έντομα). Μέγιστος αριθμ. εφαρμογών ανά καλλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): 3 εφαρμογές ανά 14 ημέρες, εφόσον απαιτείται.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- 1) Η μία εφαρμογή μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας.
- 2) Σε περιοχές με υψηλά ποσοστά προσβολής ακολουθήστε πρόγραμμα ψεκασμών το οποίο να προβλέπει εναλλαγή προϊόντων με διαφορετικό τρόπο δράσης.
- 3) Για καλύτερα αποτελέσματα πρέπει να γίνεται καλή και αμοιβαία διαβροχή των φυτών.
- 4) Η χρήση στη Ροδιανά περιλαμβάνει και τη Νεκτορίνα.

Ειδικές συνθήκες γεωργικής φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποσπαστεί: Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το σκεύασμα περιέχει τη δ.α. flonicamid, η οποία ανήκει στην ομάδα 29 κατά IRAC.

Προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας συνιστάται:

- Η εναλλαγή με εντομοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα.
- Εφαρμογή πρακτικών ολοκληρωμένης διαχείρισης και προστασίας των ωφέλιμων αρθροπόδων, ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις στις απώλειες παραγωγής.
- Επιβεβαιώστε με το σκεύασμα νωρίς, όταν ο πληθυσμός των αφίδων είναι σε χαμηλά επίπεδα.
- Οι εφαρμογές θα πρέπει να γίνονται στις συνιστώμενες δόσεις και μεσοδιαστήματα και να ερρασιάζονται ότι επιτυγχάνεται αμοιβαία καλύψη της φυλλώσης επιφανείας.
- Να αποφευχθούν οι διαδικασίες εφαρμογής με το σκεύασμα.
- Επιτρέπεται η χρήση κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας (μόνο μόνο εφαρμογή) και κατά την περίοδο παραγωγής μελιών (που προλαμβάνουν της εφαρμογής) σε ώρες που οι μελισσές δεν είναι ενεργές.

Χρόνος διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσφασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: 6 ώρες στον αγρό και 6 ώρες στο θερμοκήπιο.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στο φυτό ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκατεστημένες καλλιέργειες για τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.

MA-CHEM[®] FARM

SEDEF[®]

Εναιωρηματοποίηση κόκκοι (WG)



Εντομοκτόνο

Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: flonicamid 50% ββ
Βοηθητικές ουσίες: 49% ββ

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 14924/ 21.07.2025

Διασυστηματικό εντομοκτόνο κατά των αφίδων. Η δράση του εντοπίζεται στην εκλεκτική παρεμπόδιση της διατροφικής συμπεριφοράς των αφίδων με αποτέλεσμα το έντομο να σταματήσει σίττον και να πεθαίνει σε 1-3 ημέρες μετά την εφαρμογή.

URI: Q5J3-8N01-W80N-XYJA

Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- Περιέχει Disodium maleate. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
- Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Κάτοχος της άδειας: Galenika-Fitofarmacia d.o.o
Tazaska cesta 515
T.K. 1351 - Brezovica pri Ljubljani, Σλοβενία
Τηλ: +381 11 3072 363
Fax: +381 11 3072 310
E-mail: djana.erakovic@fitofarmacia.rs

Παρασκευαστής σκευάσματος:
GALENIKA FITOFARMACIJA A.D.



GALENIKA - FITOFARMACIJA



Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
FARMA-CHEM SA
BILJE, ZINADY - Γ' ΖΩΝΗ -
T. 61026 - 570 22 9633/ΑΘΗΝΑ
THA.: 2310 569.830 έως 3 - FAX: 2310 797.047
info@farmachem.gr - www.farmachem.gr

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

Σε περίπτωση ΕΠΙΦΑΝΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε.
Εάν δεν υπάρχει ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
Σε περίπτωση κατάποσης: Ψήνηστε αμέσως καλή σιελόβληση και δώστε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μη χορηγήσετε τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τη συνείδησή του.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφηστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλύνετε τις περιοχές του δέρματος στις οποίες έπασε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό με άφθονο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπασε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό. Πλύντε τα πριν το ξαναφορέσετε.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7753777.

Δηλώσεις προειδοποίησης:

Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
Μην πίνετε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
Πλύνετε τα χέρια, τους βράχιους και το πρόσωπο σχολαστικά μετά τη χειραγώγηση.
Να φοράτε προστατευτικό γάντι/ προστατευτικό ενδυμασία/ μέσο στήσης/ προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
«Φοράτε γάντια, ολόκληρη προστατευτική ενδυμασία και γυαλιά ή μάσκα προσώπου κατά τη διάρκεια της αντιμετώπισης/εφαρμογής και ολόκληρη προστατευτική ενδυμασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
Φοράτε γάντια και ολόκληρη προστατευτική ενδυμασία εάν η εφαρμογή γίνεται με τραπεζάκι καμπίνα.
Φοράτε γάντια, γυαλιά ή μάσκα προσώπου και ολόκληρη προστατευτική ενδυμασία εάν η εφαρμογή γίνεται με ψεκαστήρα πλάτης ή αέρα.
Φοράτε ολόκληρη προστατευτική ενδυμασία κατά τον καθαρισμό του εξοπλισμού ψεκασμού.
Σε περίπτωση επανεξέτασης στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό, φοράτε ολόκληρη προστατευτική ενδυμασία.»
Διάθεση του περιεχομένου/περίεκτη σκευάσματος με την εθνική νομοθεσία.
ΜΗΝ ΡΥΠΑΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΑ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.
(Μην πλύνετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επαγγελματικά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιδοπυρικές επιφανείες και τους δρόμους).
Για να διασφαλίσετε τους υδροβιολογικούς οργανισμούς να αφήσετε μόνον ασφαλή ζωή προστασίας 5 μέτρων από τα επαγγελματικά ύδατα.
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο παρουσίας μελισσών.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μεταλλολεπτικές χρήσεις:
Μήλα, Αχλάδι: 21 ημέρες. [Ροδιανά, Νεκτορίνα: 14 ημέρες]. Αγγούρια (Θ), Αγγουράκι (Θ), Κολοκυθάκι (Θ): 1 ημέρα.
Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για τρία (3) χρόνια τουλάχιστον, όταν αποθηκεύεται στην αρχική συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, ομοιορροικό και καλά αεριζόμενο.

H FARMA-CHEM SA
εφαρμόζει πιστοποιημένο
σύστημα διαχείρισης ποιότητας.

ΑΡ. ΠΑΡΤ/ΗΜ. - ΠΑΡΑΓ/ΗΜ ΑΜΕ.:
Βλέπε επί της συσκευασίας



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
300gr