

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύπτει τις φυλλικές επιφάνειες.

Τρόπος παρασκευής φυεκατοικού υγρού: Γεμίστε το βυτίο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος υπό συνεχή ανάδραση. Συμπληρώστε το βυτίο με νερό και συνεχίστε την ανάδραση σε όλη την διάρκεια του ψεκασμού.

Καθαρισμός φυεκατοικού μηχανήματος: Καθαρίστε και βγάλτε με καθαρό νερό τον εξοπλισμό ψεκασμού τρεις (3) φορές με καθαρό νερό αμέσως μετά την εφαρμογή. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόθεση του φυεκατοικού προϊόντος και τις συσκευασίες: Το νερό υλικά συσκευασίας βγάλονται από πίσω με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό βήμα (από νερό του βγάλματος τα ρίχνουμε στο φυεκατοικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστράφουν προηγούμενα με τρίψιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, ενσωματώνονται στα σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Ενσωματώσεις: Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα φυεκατοοικολογικά προϊόντα.

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Μικροκτόνο με προληπτική και κατά περίπτωση θεραπευτική δράση που παρεμποδίζει την βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και τη σποριογένεση. Το pyraclostrobin παρεμποδίζει την κυτταρική αναπνοή στη θέση Qo του συμπλόκου III της αναπνευστικής αλυσίδας και εμποδίζει αποτελεσματικά και διακριματικά κίνηση ενώ το boscalid παρεμποδίζει την κυτταρική αναπνοή αλλά σε διαφορετική θέση δράσης (συμπλόκο II) και εμφανίζει διασυσταμιακή κίνηση.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Πεδίο Εφαρμογής-Επίλογος-Δόσεις-Τρόπος και χρόνος εφαρμογής-Μέγ. αριθμός εφαρμ/ ανά καλλιμ.πρ. - Μεσοδίατ. Εφαρμογών σε ημέρες:

Ροδιόνα, Βερκοκό, Δαμασκηνά: Για Μονόλια (Monilinia laxa) με 60-75 γρ. σκ. Ισπάρμια ή 60-75 γρ/ 100 λίτρα φεκ. Υγρο σε όλο φεκ. υγρού 100 λίτρα/στρέμμα. Για Οξίδο (Sphaerotheca pannosa) με 60 γρ. σκ. Ισπάρμια ή 60 γρ/ 100 λίτρα φεκ. Υγρο σε όλο φεκ. υγρού 100 λίτρα/στρέμμα. Από την έναρξη της άνθησης έως την πτώση των πετάλων και κατά την ανάπτυξη των καρπών. Μείγος αριθμός εφαρμογών ανά καλλεργητική περίοδο: Μεσοδίατμια εφαρμογών σε ημέρες: Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδίατμια 7-14 ημέρες ερσον αποστασία.

Κεράσι: Για Μονόλια (Monilinia laxa) με 60-75 γρ. σκ. Ισπάρμια ή 60-75 γρ/ 100 λίτρα φεκ. Υγρο σε όλο φεκ. υγρού 100 λίτρα/στρέμμα. Για Οξίδο (Sphaerotheca pannosa) με 60 γρ. σκ. Ισπάρμια ή 60 γρ/ 100 λίτρα φεκ. Υγρο σε όλο φεκ. υγρού 100 λίτρα/στρέμμα. Από την έναρξη της άνθησης έως την πτώση των πετάλων. Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδίατμια 7-10 ημέρες ερσον αποστασία.

Φρούλα (Θ'): Για Βορφή (Botrytis cinerea) με 135-150 γρ. σκ. Ισπάρμια ή 135-150 γρ/ 100 λίτρα φεκ. Υγρο σε όλο φεκ. υγρού 100 λίτρα/στρέμμα. Για Οξίδο (Sphaerotheca neculata) με 75-100 γρ. σκ. Ισπάρμια ή 75-100 γρ/ 100 λίτρα φεκ. Υγρο σε όλο φεκ. υγρού 100 λίτρα/στρέμμα. Από την έναρξη της άνθησης μέχρι την ωρίμανση των καρπών. Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδίατμια 5-7 ημέρες ερσον αποστασία.

Καρύτο (Μ'): Για Οξίδο (Erysiphe heraclei) με 60-80 γρ. σκ. Ισπάρμια ή 100 γρ/ 100 λίτρα φεκ. Υγρο σε όλο φεκ. υγρού 80 λίτρα/στρέμμα. Για Αλετριάρα (Albitaria aspera) με 60-80 γρ. σκ. Ισπάρμια ή 70 γρ/ 100 λίτρα φεκ. Υγρο σε όλο φεκ. υγρού 80 λίτρα/στρέμμα. Κατά την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος. Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδίατμια 10-14 ημέρες ερσον αποστασία.

Τομάτο (Υ+Θ'), Πιπέρι (Υ+Θ'): Για Βορφή (Botrytis cinerea) & Οξίδο (Leveillula taurica) με 100-150 γρ. σκ. Ισπάρμια ή 100-150 γρ/ 100 λίτρα φεκ. Υγρο σε όλο φεκ. υγρού 100 λίτρα/στρέμμα. Εφαρμ. ψεκασμών με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας. Η μεγαλύτερη δόση θα πρέπει να εφαρμόζεται κάτω από έντονες συνθήκες προσβλήσης. Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδίατμια 7-10 ημέρες ερσον αποστασία.

Μαρούλι (Υ'): Για Βορφή (Botrytis cinerea) & Σκληρυντία (Sclerotinia sclerotiorum) με 60-75 γρ. σκ. Ισπάρμια ή 120-150 γρ/ 100 λίτρα φεκ. Υγρο σε όλο φεκ. υγρού 50 λίτρα/στρέμμα. Στην περίοδο της έντονης ανάπτυξης της καλλιέργειας. Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδίατμια 7-10 ημέρες ερσον αποστασία.

Επιτρέφει: Για Σκουριά (Puccinia asparagi) με 75-100 γρ. σκ. Ισπάρμια ή 75-100 γρ/ 100 λίτρα φεκ. Υγρο σε όλο φεκ. υγρού 100 λίτρα/στρέμμα. Από την έναρξη της άνθησης μέχρι τη γήρανση του υπέρωτου τμήματος. Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδίατμια 10-15 ημέρες ερσον αποστασία.

Κραμβούδι (Μ), Σιτάρι (Μ'): Για Βορφή (Botrytis cinerea) & Περονόσπορο (Peronospora destructor) με 150 γρ. σκ. Ισπάρμια ή 150 γρ/ 100 λίτρα φεκ. Υγρο σε όλο φεκ. υγρού 100 λίτρα/στρέμμα. Από το στάδιο της πλήρους της βλάστης των φύλλων μέχρι την ανάπτυξη του ανέμου στέλεχος. Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδίατμια 10-14 ημέρες ερσον αποστασία.

Αμυγδαλιά: Για Μονόλια (Monilia spp.) & Ερυσίκο (Pirhonia debilians) με 100 γρ. σκ. Ισπάρμια ή 67-100 γρ/ 100 λίτρα φεκ. Υγρο σε όλο φεκ. υγρού 100-150 λίτρα/στρέμμα. Από την αρχή της άνθησης μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν το τελικό τους μέγεθος. Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδίατμια 10-15 ημέρες ερσον αποστασία.

Φασόλι: Για Κερατοσπόρο (Botryosphaeria dothidea) με 75-100 γρ. σκ. Ισπάρμια ή 50-100 γρ/ 100 λίτρα φεκ. Υγρο σε όλο φεκ. υγρού 100-150 λίτρα/στρέμμα. Από την αρχή της άνθησης μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν το τελικό τους μέγεθος. Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδίατμια 10-15 ημέρες ερσον αποστασία.

Κουκιά (επίλογος Υ): Φασόλια με λοβό και χωρίς λοβό (επίλογος (Μ'): Για Βορφή (Botrytis cinerea) & Σκληρυντία (Sclerotinia spp.), Σκουριά (Uromyces spp.) με 100-150 γρ. σκ. Ισπάρμια ή 100-385 γρ/ 100 λίτρα φεκ. Υγρο σε όλο φεκ. υγρού 40-100 λίτρα/στρέμμα. Από την εμφάνιση του σου φύλλου μέχρι και το τέλος της άνθησης. Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδίατμια 10 ημέρες ερσον αποστασία.

Μπιζέλιο με λοβό και χωρίς λοβό (επίλογος (Μ'): Για Ασκοχυτία (Ascochyta blight), Οξίδο (Erysiphe spp.), Περονόσπορο (Peronospora spp.), Σκληρυντία (Sclerotinia spp.) με 100-150 γρ. σκ. Ισπάρμια ή 100-385 γρ/ 100 λίτρα φεκ. Υγρο σε όλο φεκ. υγρού 40-100 λίτρα/στρέμμα. Από την εμφάνιση του σου φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση. Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδίατμια 10 ημέρες ερσον αποστασία.

Επιτρέφει: Για Ανθράκωση (Colletotrichum spp.), Περονόσπορο (Peronospora spp.), Κλειδοσπόρο (Gibberellum spp.) με 75-100 γρ. σκ. Ισπάρμια ή 75-250 γρ/ 100 λίτρα φεκ. Υγρο σε όλο φεκ. υγρού 40-100 λίτρα/στρέμμα. Από την εμφάνιση του σου φύλλου, μέχρι το φυτό να αποκτήσει το τελικό του μέγεθος. Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδίατμια 7-10 ημέρες ερσον αποστασία.

Βοσκάλος (Θ'): Για Σκληρυντία (Sclerotinia spp.) & Βορφή (Botrytis cinerea) με 150 γρ. σκ. Ισπάρμια ή 150-375 γρ/ 100 λίτρα φεκ. Υγρο σε όλο φεκ. υγρού 40-100 λίτρα/στρέμμα. Από την εμφάνιση του σου φύλλου, μέχρι το 70% της ανάπτυξης των φύλλων του φυτού. Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδίατμια 10 ημέρες ερσον αποστασία.

Καλλυμματικό Τριαντάφυλλο (Θ'): Για Οξίδο με 80-150 γρ. σκ. Ισπάρμια ή 150-375 γρ/ 100 λίτρα φεκ. Υγρο σε όλο φεκ. υγρού 40-100 λίτρα/στρέμμα. Από την εμφάνιση του σου φύλλου, μέχρι το τέλος της άνθησης. Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδίατμια 10 ημέρες ερσον αποστασία.

MostrO

Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι (WG)

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 61240/ 16.01.2026

Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:
Δραστικές ουσίες: boscalid: 26,7% β/β & pyraclostrobin: 6,7% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 65,75% β/β

Μικροκτόνο με προληπτική και κατά περίπτωση θεραπευτική δράση που παρεμποδίζει την βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και τη σποριογένεση. Το pyraclostrobin παρεμποδίζει την κυτταρική αναπνοή στη θέση Qo του συμπλόκου III της αναπνευστικής αλυσίδας και εμφανίζει αποτελεσματικά και διακριματικά κίνηση, ενώ το boscalid παρεμποδίζει την κυτταρική αναπνοή αλλά σε διαφορετική θέση δράσης (συμπλόκο II) και εμφανίζει διασυσταμιακή κίνηση.



ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.

UFI A8M-ΥR7Q-HN05-RN74

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
- Πολύ τοξικό για τους υφρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Για να αποφεύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.



Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
FARMA-CHEM SA
ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ - Γ' ΖΩΝΗ - Τ.Θ. 1026
570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ: 2310 569.630 έως 3 - FAX: 2310 797.047
info@farmachem.gr - www.farmachem.gr



Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

- **Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:** Αποφύγετε επαφή με τα μάτια, το δέρμα και τα ρούχα. Εάν εμφανιστούν προβλήματα ζητήστε ιατρική συμβουλή! Δείτε την συσκευασία/ετικέτα στον γιατρό.
- **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΤΗΣΗΣ:** Καλύψτε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδυναμία. Ξεπλύνετε άμεσα το στόμα. Μετά να πιείτε αβιόνο νερό. Μην προκαλείτε έμετο και μην δίνετε τίποτα από το στόμα αν αισθανθείτε να εισαχθείτε ή έχει σταματήσει.
- **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το φυεκατοικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός παραμένει, ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.
- **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΣΠΙΝΟΜΗΣ:** Κρατήστε τον ασθενή ήρεμο, απομακρύνετε τον σε καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
- **ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777**

Δηλώσεις ασφαλείας:

- Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.
- Μολύνετε τη χυμινή ποσότητα.
- Διάνοξη του περιεχομένου πακέτου σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
- Φοράτε γάντια κατά την αντιμετώπιση και κατά την εφαρμογή στον αγρό.
- Κατά την εφαρμογή του σκευάσματος σε θερμοκήπια φοράτε σύστημα προστατευτικό ενδυμασία και γάντια. Σε περίπτωση επανεξόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια.
- Μη ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής από σε επαγγελματικό ύδατο. Να απορριβείτε ή ριπώνετε μόνο των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιάστρες, ερυσίκο και τους άρροιας.
- Για να προστατέψετε τους υφρόβιους οργανισμούς να αφήσετε με απόσταση (ώριμ) προσποσία:
- **30 μέτρων ή 15 μέτρων** με ακριβώς μεμονωμένη διασποράς (75%) από τα επαγγελματικά ύδατα για την αμυγδαλιά, τη φασόλι.
- **10 μέτρων** από τα επαγγελματικά ύδατα για τα (επίλογος) και • **5 μέτρων** από τα επαγγελματικά ύδατα για τις υπόλοιπες καλλιέργειες.

Παρατηρήσεις:

- * Όσο είναι παρόντα και τα δύο παθογόνα, συνιστάται η μεγαλύτερη δόση.
- 1) Η χρήση στη ροδιόνα (PRNAR) περιλαμβάνει και τη νεανερία (PRPNP).
- 2) Προληπτικές εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών.
- 3) ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι μεγάλες δόσεις στο εκαπύριο να εφαρμόζονται με τις χυμίνες δόσεις φυεκατοικού υγρού και αντίστροφα.

Ειδικές συνθήκες γενετικής, φυτογένης ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκτηθεί:

- **Διακριτική ανθεκτικότητα:** Το σκεύασμα περιέχει τις δραστικές boscalid και pyraclostrobin, οι οποίες ανήκουν στις ομάδες 7 και 11, αντίστοιχα κατά FRAC. Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται: η εναλλαγή με μολυσματικά που δεν ανήκουν σε αυτές τις ομάδες εφαρμοστέα το σκεύασμα προληπτικά στο πρώτο στάδιο ανάπτυξης των ασθενειών και περιορίσει τις θεραπευτικές εφαρμογές. Μείγος αριθμός εφαρμογών ανά καλλεργητική περίοδο: 2-3.
- **Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπινου ή του ζώου στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:** Μην εισέρχεται σε αγρούς που έχει γίνει εφαρμογή μέχρις ότου στεγνώσει το φυεκατοικό διάλυμα από την καυόμενη φυτογένη επιφάνεια.
- **Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις. Στα κοινά συνιστάται δοκιμή φυτοτοξικότητας.

Τελικώς επίβλεψη πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μεταυλματικές χρήσεις: Αμυγδαλιά, Φασόλι 28 ημέρες, Καρότο (Μ), Κραμβούδι (Μ), Σιτάρι (Μ), Σπανάκι, Αρωματικό φυτό Βοσκάλος (Θ): 14 Ημέρες, Κεράσι, Ροδιόνα, Νεκροκάρπιο, Βερκοκό, Δαμασκηνά, Μαρούλι (Μ), Κουκιά (επίλογος) (Μ), Φασόλια (με λοβό και χωρίς λοβό) (επίλογος) (Μ), Μπιζέλιο (με λοβό και χωρίς λοβό-αρσάκι) (επίλογος) (Μ): 7 Ημέρες, Φρούλα (Θ), Τομάτο (Υ+Θ), Πιπέρι (Υ+Θ): 3 Ημέρες, Σπαράγγι (Μ): Μη εφαρμοστέο (>120 ημέρες), Καλλυμματικό (Θ): Μη εφαρμοστέο.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο ήπιο, προστατευμένο και καλά αεριζόμενο μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

ΑΡ. ΠΑΡΤΗΜ. ΠΑΡΑΓ/ΗΜ ΛΗΕ.: Βλέπε επί της συσκευασίας
Καθαρό Βάρος: 500 γραμμ.