

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας.

Τρόπος παρασκευής διαλύματος εφαρμογής: Γεμίστε το βυτίο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέτετε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος υπό συνεχή ανάδευση. Συμπληρώνετε το βυτίο με νερό και ανακινούμε την ανάδευση σε όλη την διάρκεια του ψεκασμού.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο δοχείο εφαρμογής) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Μυκητοκτόνο μίγμα boscalid (ομάδα καρβοξαμικά) και pyraclostrobin (ομάδα QoI παρεμποδιστές), για την καταπολέμηση του φουζιλιάδιου και του Ωιδίου σε μήλα και του Φουζιλιάδιου και της καστανής κηλίδωσης σε αχλάδια με προληπτική και θεραπευτική δράση. Παρεμπόδιση της αύξησης του μυκηλίου καθώς και της παραγωγής των κονιδίων. Σε βιοχημικό επίπεδο το pyraclostrobin παρεμποδίζει την κυτταρική αναπνοή στη θέση Qo του συμπλόκου III του κυτοχρωμικού υποσυστήματος και εμbranίζει διαπλασματική κίνηση ενώ το boscalid επίσης παρεμποδίζει την κυτταρική αναπνοή αλλά στο επίπεδο του συμπλόκου II.

Πεδίο εφαρμογής/Στόχος/Δόσεις σκευάσματος/Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής:

Μηλιά για Φουζιλιάδιο (*Venturia inaequalis*), Ωίδιο (*Podosphaera leucotricha*) με 80 γρ σκ./ στρέμμα ή 53-80 γρ/100 λίτρα ψεκ. Υγρού. Όγκος ψεκ. Υγρού: 100-150 λίτρα/στρέμμα. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Προληπτικές εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 3/10-14.

Αχλάδια για Φουζιλιάδιο (*Venturia pyrina*), Καστανή κηλίδωση (*Stemphylium vesicarium*) με 80 γρ σκ./ στρέμμα ή 53-80 γρ/100 λίτρα ψεκ. Υγρού. Όγκος ψεκ. Υγρού: 100-150 λίτρα/στρέμμα. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Προληπτικές εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 3/10-14.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1) Ο μέγιστος όγκος ψεκαστικού υγρού να εφαρμοάζεται με τη μικρότερη δόση ανά 100 λίτρ. νερό. Σε κάθε περίπτωση η δόση στο στρέμμα να είναι 80 γρ.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας Το σκεύασμα περιέχει τις δραστικές BOSCALID και pyraclostrobin, οι οποίες ανήκουν στις ομάδες 7 και 11, αντίστοιχα κατά FRAC. Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας ουσιαστά:

η εναλλαγή με μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτές τις ομάδες.

εφαρμόστε το σκεύασμα προληπτικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενειών και περιορίστε τις θεραπευτικές εφαρμογές.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3.

Twinkle

Εναιωρηματοποιησιμοι Κόκκοι (WG)

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 61235/ 08.12.2025

Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστικές ουσίες: boscalid 25,2 % β/β

pyraclostrobin 12,8 % β/β

Βοηθητικές ουσίες: 61,02 % β/β

Μυκητοκτόνο μίγμα boscalid (ομάδα καρβοξαμικά) και pyraclostrobin (ομάδα QoI παρεμποδιστές), για την καταπολέμηση του φουζιλιάδιου και του Ωιδίου σε μήλα και του Φουζιλιάδιου και της καστανής κηλίδωσης σε αχλάδια με προληπτική και θεραπευτική δράση.



ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
- Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

UFI: 33MV-XRUW-VN01-ENUU

Κάτοχος της άδειας:
Sharda Cropchem España S.L.
Edificio Alayayas Business Center,
Carril Condominia nº 3, 12th Floor,
30006 Murcia – Ισπανία.
e-mail: regn@shardainit.com
shardainit@vsnl.com

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
SHARDA BALKAN ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠ.Ε.
Μοναστηρίου 9, 54627, Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310 521045
e-mail: athinasarakini@gmail.com



FARMA-CHEM SA

Διαμονή:

FARMA-CHEM SA

ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ - Γ' ΖΩΝΗ - Τ.Θ.1026

570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ: 2310 569.630 έως 3 - FAX: 2310 797.047

info@famachem.gr - www.famachem.gr

Πρώτες βοήθειες – Αντιδοτό:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν προκληθεί ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΣΤΙΝΟΗΣ: Κρατείστε τον παθόντα ήρεμο και μεταφέρατε τον στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε.

Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και μετά πιείτε άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Μην προκαλείτε εμετό αν δεν συμβουλευτείτε γιατρό. Μην προκαλείτε εμετό ή μην δώσετε τίποτα στο στόματος σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδύνατο.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Ακολουθήστε θεραπεία συμπτωματική.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

Δηλώσεις προφυλάξεως:

- Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν
- Πλυθείτε σχολαστικά με άφθονο νερό και σαπούνι μετά το χειρισμό.
- Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια
- Μαζέψτε τη χυμνή ποσότητα
- Διάθεση του περιεχομένου/περίεκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία
- Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
- Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς αφιέρωση αμέσως μία ζώνη προστασίας 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:


- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεστε σε αγρούς που έχει γίνει εφαρμογή μέχρις ότου στεγνώσουν το ψεκαστικό διάλυμα από την ψεκαζόμενη φυλλική επιφάνεια.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συστηματικές χρήσεις και δόσεις.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μεταπυλλεκτικές χρήσεις: Μηλιά, Αχλάδια: 7 ημέρες.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται στην αρχική κλειστή συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από θερμότητα και ηλιακό φως.

ΑΡ. ΠΑΡΤ/ΗΜ. ΠΑΡΑΓ/ΗΜ Α.Ε.: Βιλέτι επί της συσκευασίας



Καθαρό Βάρος: 500 γραμμ.