ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ | Γ' ΖΩΝΗ | Τ.Θ.1026
570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 569.630 έως 33
FAX: 2310 797.047
info@farmachem.gr
www.farmachem.gr

FARMA-CHEM SA

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ	
AXELTIS 50 WG	**ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ**

Μη διασυστηματικό μυκητοκτόνο, με προληπτική ή/και θεραπευτική δράση, καθώς και αξιόλογη διάρκεια δράσης (περίπου 15 ημέρες).
Δρα παρεμποδίζοντας τη βλάστηση των σπορίων , την ανάπτυξη του μυκηλίου καθώς και την παραγωγή σπορίων. Εμφανίζει διελασματική και τοπικά διεισδυτική δράση και η αποτελεσματικότητα του δεν επηρεάζεται από ενδεχόμενη βροχόπτωση, δύο ώρες μετά την εφαρμογή του.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Είναι εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG) με δραστική ουσία Kresoxim-methyl 50% β/β και βοηθητικές ουσίες: 45,05% β/β.

Κάτοχος της άδειας: BASF Ελλάς A.B.E.E.

Παρασκευαστής: BASF SE

Υπεύθυνος για την διάθεση στην αγορά: BASF Ελλάς A.B.E.E

Διανομέας: FARMA-CHEM SA

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γρ/ στρέμμα	γρ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Αμπέλι (επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο)	Ωίδιο (*Uncinula necator*) Μαύρη Σήψη (*Guignardia bidwellii*),	20	-	20 -100	Προληπτικοί ψεκασμοί, ξεκινώντας πριν από την άνθηση με μεσοδιάστημα 12-14 ημερών	3
Μηλιά Κυδωνιά	Φουζικλάδιο (*Venturia inaequalis*) Ωίδιο (*Podosphaera leucotricha*	20	-	20-120	Ψεκασμοί από το στάδιο της έκπτυξης των οφθαλμών έως την έναρξη της ωρίμανσης των καρπών με μεσοδιαστήματα 12-14 ημερών.	3
Αχλαδιά	Φουζικλάδιο (*Venturia pirina*) Στεμφύλιο (*Stemphyliu m versicarium*	20	-	20-120	Ψεκασμοί από το στάδιο της έκπτυξης των οφθαλμών έως την έναρξη της ωρίμανσης των καρπών με μεσοδιαστήματα 12-14 ημερών.	3
Ελιά (Βρώσιμη και ελαιοποιήσιμη)	Κυκλοκόνιο (*Spilocaea oleagina*)	12-20	-	40-100	Ψεκασμοί μέχρι την πλήρη ανάπτυξη των καρπών (BBCH 00-79) με μεσοδιαστήματα 10-60 ημερών.	2 *

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Εφόσον υπάρχει σύστημα αγροτικών προειδοποιήσεων, να ακολουθούνται οι γενικές συστάσεις.
2. * Η δεύτερη εφαρμογή εναντίον του κυκλοκόνιου στην ελιά μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον ο συνολικός αριθμός εφαρμογών για την καταπολέμηση του κυκλοκόνιου ανά καλλιεργητική περίοδο είναι τουλάχιστο 4.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Διαλύουμε το σκεύασμα σε λίγο νερό. Στη συνέχεια αδειάζουμε το μίγμα στο μισογεμισμένο με νερό βυτίο με συνεχή ανάδευση και απογεμίζουμε το βυτίο με νερό.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:

Συστήνεται ο καθαρισμός του ψεκαστήρα με νερό, αδειάζοντας πλήρως όλα τα εξαρτήματα από το ψεκαστικό υγρό και ξεπλένοντας όλα του τα εξαρτήματα 2-3 φορές, έως ότου ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος έχουν απομακρυνθεί.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Προϊόν : Καύση σε εγκεκριμένη για το σκοπό αυτό μονάδα, η οποία διαθέτει κατάλληλο κλίβανο αποτέφρωσης.
Συσκευασίες : Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα με κατάλληλο μηχανισμό (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία για διαχείριση τους ως επικίνδυνα απόβλητα. Συστήνεται η καύση τους σε κατάλληλους κλιβάνους , όπως και για το φυτοπροστατευτικό προϊόν.
Συνιστώμενη θερμοκρασία αποτέφρωσης : 11000 °C.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον τηρούνται οι οδηγίες της ετικέτας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

• **Διαχείριση ανθεκτικότητας:**
Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος εμφάνισης ανθεκτικότητας στα παθογόνα στόχους σε μηλοειδή και αμπέλι συνιστώνται προληπτικές επεμβάσεις συνεχόμενες (μέχρι 3) ή απλές (σε εναλλαγή ή σε μίγμα με μυκητοκτόνα που ανήκουν σε ομάδες διαφορετικές των στρομπιλουρινών (π.χ azoxystrobin) ή οξαζολιδινιδιονων (π.χ famoxadone) και δεν εμφανίζουν διασταύρωτη ανθεκτικότητα με αυτές).

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Αμπέλι	42
Μηλιά, Κυδωνιά	28
Αχλαδιά	28
Ελιά, (Ελαιοποιήσιμη Βρώσιμη)	30

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ‘Η ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:

Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή, πριν το ψεκαστικό διάλυμα στα φύλλα της καλλιέργειας στεγνώσει εντελώς. Για να εισέλθετε μετά από την εφαρμογή φορέστε προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

Το σκεύασμα διατηρείται για δύο (2) χρόνια , αν αποθηκευθεί στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε χώρο ξηρό δροσερό και καλά αεριζόμενο.

- ***Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.***

- ***<u>ΠΡΟΣΟΧΗ:</u> Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από κάθε χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.***