

Javise 50 WG

Εναιωρηματοποιησιμοι κόκκοι (WG)

Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος: Δραστική ουσία: Cyprodinil 50% β/β - Βοηθητικές ουσίες: 49% β/β
Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 61047/ 05.10.2021

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική και θεραπευτική δράση, για την καταπολέμηση του φουζικλάδιου των μηλοειδών, της *Monilia fructigena* των πυρηνοκάρπων και του βοτρυτή στο αμπέλι. Το cyprodinil παρουσιάζει αποπλαστική και διελασματική δράση.

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.**



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνια επιπτώσεις.
- Περιέχει cyprodinil. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις.
- Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις προφύλαξης:

- Φυλάσσετε κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Διάθεση των περιεχομένου/περιεκτή σύμψυκτα με την εθνική νομοθεσία.
- Φοράτε αλόωσιμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την ανάμειξη/ φόρτωση και κατά την εφαρμογή.
- Φοράτε αλόωσιμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την επανεπίδραση στην καλλιέργεια.
- Μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή την συσκευασία του. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιβάδωστες επιφάνειες και τους δρόμους).
- Για την προστασία των μικροοργανισμών του εδάφους, μην εφαρμόζεται σε εδάφη με pH<5.
- Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, αφήστε από τα επιφανειακά ύδατα:
- Στην καλλιέργεια της αμπέλου, μια φυτική ζώνη ανάστασης **10 μέτρων**.
- Στις καλλιέργειες της Μηλιάς, Αχλαδιάς, Ροδακιάς, Βερκοκιάς, μην αδικαστεί ζώνη προστασίας **30 μέτρων** συμπεριλαμβανομένης μίας φυτικής ζώνης ανάστασης **20 μέτρων**.

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

Γενικές πληροφορίες: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).

Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινήστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Κρατήστε τον ζεστό και ξεκούραστο. Εάν δεν επανέλθει η αναπνοή του παθόντα εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Καλέστε τον γιατρό αμέσως.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με το προϊόν. Πλύνετε καλά με άφθονο νερό. Εάν ο δερματικός ερεθισμός παραμείνει, καλέστε γιατρό. Πλύνετε καλά το ρούχο πριν τα ξανθοπορέσετε.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε καλά τα μάτια με άφθονο και καθαρό νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν απαιτείται.

Σε περιπτώσεις κατάποσης: Καλέστε αμέσως γιατρό (δείτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). Μην προκαλέσετε εμετό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συστηματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777.

ΑΡ. ΠΑΡΤ./ΗΜ. ΠΑΡΑΓ.: βλέπε επί της συσκευασίας



Περιεχόμενο: 500 γραμμ.

Κάτοχος της άδειας:
ASCENZA AGRO S. A.
Avenida do rio Tejo,
Herdade das Praias,
2910-440 Setúbal, Πορτογαλία
Τηλ.: +351 265 710 100
E-mail: info@ascenza.com

Υπεύθυνος για την διάθεση του προϊόντος στην αγορά:
AFCO A.E.
Δορυκλίου 10 - 12, Τ.Κ.: 115 21, Αθήνα
Τηλ.: +30 210-3641010 - FAX: +30 210-3613305
e-mail: info@afco.gr

Παρασκευαστής σκευάσματος: **ASCENZA AGRO S.A.**

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού /διαλύματος εφαρμογής: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό και προσθέστε την απαιτούμενη δόση του σκευάσματος αναδεδιόντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Το ψεκαστικό διάλυμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα σε 24 ώρες από την παρασκευή του αφού προηγηθεί ισχυρή ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τον ψεκαστικό εξοπλισμό. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο, ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαρτηθούν πλήρως ο αερός και όλα τα ίχνη του προϊόντος. Η προώθηση απορρυπαντικού θα βελτιώσει τις διαδικασίες καθαρισμού.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας (σουλκιά) αφού καταποραθούν προηγουμένως με τρίπτυμα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, ενσωματώνονται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: -

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική και θεραπευτική δράση, για την καταπολέμηση του φουζικλάδιου των μηλοειδών, της *Monilia fructigena* των πυρηνοκάρπων και του βοτρυτή στο αμπέλι. Το cyprodinil παρουσιάζει αποπλαστική και διελασματική δράση.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Πεδίο Εφαρμογής-Στόχος-Δόσεις-Τρόπος και χρόνος εφαρμογής-Μέγ. αριθμός εφαρμ/ ανά καλλιερ.περ. -Μεσοδίοστ. Εφαρμογών σε ημέρες:

Αμπέλι (ονοποθήσιμες και επιτραπέζιες ποικιλίες): Για *Βοτρυτή (Botrytis sp.)* με 75 γραμμ./ στρέμμα σε όλο ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρέμμα. Από την έναρξη της άνθησης έως το στάδιο αλλαγής χρώματος των ραγών (BBCH 60-83). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιερητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 1.

Μηλιά, Αχλαδιά: Για *Φουζικλάδιο (Venturia sp.)* με 50 γραμμ./στρέμμα σε όλο ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρέμμα. Από την έναρξη της ανάπτυξης του φυλλώματος έως πριν την έναρξη της άνθησης (BBCH 10-59). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιερητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 2/10-14.

Ροδακιά, Βερκοκιά: Για *Φαί Σφήνη (Monilia fructigena)* με 50 γραμμ./στρέμμα σε όλο ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρέμμα. Από την έναρξη της ανάπτυξης του φυλλώματος έως ότου ο καρπός να είναι ώριμος για κατανάλωση (BBCH 10-89). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιερητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 2/10-14.

Παρατηρήσεις:

Να προηγηθεί δοκιμαστική εφαρμογή στις ποικιλίες αμπέλου Κορνέλικη, σταριδά και Σουλκιάνα. Στις ποικιλίες αυτές δεν είναι αποδεχόμενη η απουσία φυτοεξοκρίτης.

Ειδικές συνθήκες γεωργικής, φυτοεργίας ή περιβαλλοντικής υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποσπαστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας

Το σκεύασμα περιέχει Cyprodinil, που ανήκει στην ομάδα 9 κατά FRAC.

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας του φουζικλάδιου στο cyprodinil, ο αριθμός των εφαρμογών περιορίζεται στις δύο ανά κύκλο καλλιέργειας.

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας ανιστάται οι εφαρμογές με JAVISE 50 WG να γίνονται σε ενδοκαλή με μοχλοκτόνα από άλλες ομάδες με διαφορετικό τρόπο δράσης από τις αντιστοιχούμενες.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσδεσης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνωσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

Στοιχεία φυτοεξοκρίτης, ευαισθησίας ποικιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν προκαλεί φυτοεξοκρίτητα όταν χρησιμοποιείται στις ανατομικές δόσεις και καλλιέργειες. **Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μεταλλευτικές χρήσεις:** Αμπέλι (ονοποθήσιμες και επιτραπέζιες ποικιλίες): 7 Ημέρες. Ροδακιά, Βερκοκιά: 7 Ημέρες. Μηλιά, Αχλαδιά: 60 Ημέρες.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό (<40°C) και καλά αεριζόμενο μακριά από άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

H FARMACHEM SA
εφαρμόζει πιστοποιημένο
σύστημα διαχείρισης ποιότητας.

Διανομή:

FARMA-CHEM SA

ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ - Γ' ΖΩΝΗ - Τ.Θ.1026

570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ.: 2310 569.630 έως 3 - FAX: 2310 797.047

info@farmachem.gr - www.farmachem.gr



FARMA-CHEM SA