

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασιμολογήστε φυλλώματα.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Ανακατέψτε κατά πινάκι τη χημική Γεώλιτο το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος σε ίσκη ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκατικό δοχείο αναδύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθίσματα ψεκασιμότητας: Άμεσως μετά την εφαρμογή οδεύστε τελείως το ψεκατικό βύτιο. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βύτιο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με νερό και απορριπτικολογήστε όλα τα υγρά υπολείματα και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. Πριν το επαναχρησιμοποίησε ξεπλύνετε το πάλι με άφθονο καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μπουκάλια (φιάλες, δεχεία) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται πρώτο ξεπλύσιμο (το νερό του ξεπλύματος το ρίχνουμε στο ψεκατικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστράφουν προηγούμενα με τρίψιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αποτινάσσονται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Δισυστηματικό μικητοκτόνο με προληπτική και θεραπευτική δράση για την αντιμετώπιση του φουζυκλάδιου των Μηλοειδών, του εξώσσκου, της κληνδρόσποριωσης και της ανθράκωσης των Πυρηνόκαρπων, καθώς και του κυκλοκόμου και γλαυοσπίριου της Ελιάς.

Πεδίο εφαρμογής/Στόχος/Δόσεις σκευάσματος/Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής:

ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά, Κιούνια) για Φουζυκλάδιο (*Venturia sp.*) με 170 κ.εκ. σκ / στρ. σε Όγκο ψεκ. Υγρού: 50 – 150 λίτρα/στρ. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ψεκασιμολογήστε με Ξεπλύνετε από τον διαχωρισμό των πρώτων φύλλων μέχρι πριν την έναρξη της άνθησης BBCH 10 – 59 Καλή από το τέλος της άνθησης μέχρι οι καρποί να έχουν φθάσει στο 90% του τελικού τους μεγέθους. BBCH 70 – 79. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 2/14.

Κερασιά για Κληνδρόσποριση (*Blumeria junci*), Ανθράκωση (*Gnomonia erythrostoma*) με 170 κ.εκ. σκ / στρ. σε Όγκο ψεκ. Υγρού: 50 – 150 λίτρα/στρ. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ψεκασιμολογήστε με Ξεπλύνετε από το τέλος της άνθησης μέχρι οι καρποί να έχουν φθάσει το 90 % του τελικού τους μεγέθους. BBCH 70-79. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 2/14.

Ροδιανά για Εξώσσκου (*Taphria oleaeformis*) με 170 κ.εκ. σκ / στρ. σε Όγκο ψεκ. Υγρού: 50 – 150 λίτρα/στρ. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ψεκασιμολογήστε με Ξεπλύνετε από την εκκλιση των πρώτων φύλλων μέχρι πριν την έναρξη της άνθησης. BBCH 10 – 59. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 2/14.

Ελιά (επιτραπέζιας και ελαιοληπτικής ποικιλίες) για Κυκλοκόμο (*Venturia oleaeformis*), Γλαυοσπίριο (*Colletotrichum gloeosporioides*) με 225 κ.εκ. σκ / στρ. σε Όγκο ψεκ. Υγρού: 100 λίτρα/στρ. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ψεκασιμολογήστε με Ξεπλύνετε από τον διαχωρισμό των πρώτων φύλλων μέχρι το τέλος της άνθησης (BBCH 11-69) και/ή το φθινόπωρο/χειμώνα από το στάδιο όπου οι καρποί έχουν φθάσει στο 90% του τελικού τους μεγέθους μέχρι το στάδιο της πλήρους ωριμότητας τους (BBCH 78-89). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 1.

Ελιά (επιτραπέζιας και ελαιοληπτικής ποικιλίες) για Κυκλοκόμο (*Venturia oleaeformis*), Γλαυοσπίριο (*Colletotrichum gloeosporioides*) με 170 κ.εκ. σκ / στρ. σε Όγκο ψεκ. Υγρού: 100 λίτρα/στρ. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ψεκασιμολογήστε με Ξεπλύνετε από τον διαχωρισμό των πρώτων φύλλων μέχρι το τέλος της άνθησης (BBCH 11-69) και/ή το φθινόπωρο/χειμώνα από το στάδιο όπου οι καρποί έχουν φθάσει στο 90% του τελικού τους μεγέθους μέχρι το στάδιο της πλήρους ωριμότητας τους (BBCH 78-89). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 2/14.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- 1. Η χρήση στην Κερασιά περιλαμβάνει και τη Βυσσινιά
- 2. Η χρήση στην Ροδιανά περιλαμβάνει και τη Νεκταρίνα
- 3. Την καλλιέργεια της ελιάς να πραγματοποιείται είτε μια (1) μόνο εφαρμογή με μέγιστη δόση 225 κ.εκ/ στρ. ή δύο (2) εφαρμογές με δόση 170 κ.εκ/ στρ. ανά εφαρμογή.

Ειδικές συνθήκες γενετικής, φυσιολογικές ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποικιστεί:
Να αποφευχθεί η εφαρμογή του σκευάσματος όταν επικρατούν πολύ υψηλές θερμοκρασίες και εξοχθετικές συνθήκες.
Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία dodine, η οποία ανήκει στην ομάδα U12 κατά FRAC. Προκειμένου να αποφευχθεί ή να επιβραδυνθεί η ανθεκτικότητα το σκεύασμα συνιστάται:
- να εφαρμόζεται προληπτικά εφόσον είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας,
- να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με μικητοκτόνα που δεν ανήκουν στην ίδια ομάδα (σε προγράμματα ψεκασιμολογίας οι πρώτες 1-2 εφαρμογές να πραγματοποιούνται με το σκεύασμα).

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- απορής ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: --
- απορής ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: --
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Ελιά:
Να μην εισέρχεται στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκατικό υγρό πάνω στα φύλλα.
Πυρηνόκαρπα:
- 10 ημέρες μετά τον ψεκασμό για εργασίες συντήρησης ή/και αραιώματος, και
- 5 ημέρες μετά τον ψεκασμό για εργασίες συγκομιδής.
Μηλοειδή:
1 ημέρα μετά τον ψεκασμό για εργασίες συντήρησης ή/και αραιώματος.



Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστικές ουσίες: dodine: 40 % β/ο - Βοηθητικές ουσίες: 59,7% β/β

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 61252 / 30.03.2026

Δισυστηματικό μικητοκτόνο με προληπτική και θεραπευτική δράση για την αντιμετώπιση του φουζυκλάδιου των Μηλοειδών, του εξώσσκου, της κληνδρόσποριωσης και της ανθράκωσης των Πυρηνόκαρπων, καθώς και του κυκλοκόμου και γλαυοσπίριου της Ελιάς.




ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.

UFI: A6U1-A0XS-W003-DYRK

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Επιβλαβές σε περίπτωση κατάπτωσης.
- Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
- Προκαλεί σοβαρή ορθοπαιδική βλάβη.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Περιέχει 1,2-Benzisothiazol-3-one(CAS 2634-33-5). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
- Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.



Κάτοχος της άδειας - Παρασκευαστής σκευάσματος - Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
FARMA-CHEM SA
ΒΙΛΠΕ ΣΙΝΔΟΥ - Γ ΣΤΑΘΗ - Τ.Θ.1026
570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ: 2310 569.630 έως 3 - FAX: 2310 797.047
info@farmachem.gr - www.farmachem.gr

Δηλώσεις Προφύλαξης

- Φυλάσσετε κλειδωμένα. Μακριά από παιδιά.
- Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μύδια σταθερές προστασίες για τα μάτια / πρόσωπο.

ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΜΕ ΜΗΔΙΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕΣΑ:

«Φοράτε ολόκληρο φόρμα εργασίας, γάντια και προστασία κατά την αντιμετώπιση/απόσυρση του σκευάσματος. Κατά την εφαρμογή του σκευάσματος, φοράτε ολόκληρο φόρμα εργασίας, γάντια και κουκούλα. Η χρήση γαντιών και κουκούλας δεν είναι υποχρεωτική στην περίπτωση χρήσης ψεκαστικού μέσου κλειστής καμπίνας κατά την εφαρμογή του σκευάσματος.»

ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΧΕΙΡΟΣ Η ΕΠΙΠΛΟΥΤΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ:

«Φοράτε ολόκληρο φόρμα εργασίας, γάντια και προστασία κατά την αντιμετώπιση/απόσυρση του σκευάσματος. Κατά την εφαρμογή του σκευάσματος φοράτε ολόκληρο φόρμα εργασίας, και ουσιαστικά επιπλέον η χρήση γαντιών.

Απαγορεύεται η εφαρμογή με ψεκαστικό μέσο χερός ή επιπλωτούς ψεκαστήρες σε δενδροειδείς καλλιέργειες που δεν μπορεί να αποφευχθεί η επαφή με το φύλλωμα κατά τη διάρκεια του ψεκασμού.»

ΕΠΑΝΕΙΣΧΟΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΨΕΚΑΣΜΟ:

Στις καλλιέργειες πυρηνόκαρπων η είσοδος επιτρέπεται 10 ημέρες μετά τον ψεκασμό για εργασίες συντήρησης ή/και αραιώματος και 5 ημέρες μετά τον ψεκασμό για εργασίες συγκομιδής.
Στις καλλιέργειες μηλοειδών η είσοδος επιτρέπεται 1 ημέρα μετά τον ψεκασμό για εργασίες συντήρησης ή/και αραιώματος.
Σε κάθε περίπτωση επανεξέτασης στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε μακριά παντελόνι, μακριά μπουκάλι και γάντια.

Για την προστασία των κατοίκων ή περιεχομένων:

- να φοριέται μάσκα/αφασία (ζώνη προστασίας 10 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροσπίου μείωσης της διασποράς ψεκαστικού νερούς κατά 50% στις καλλιέργειες Πυρηνόκαρπων)
- να χρησιμοποιείται ακροσπίο μείωσης της διασποράς ψεκαστικού νερούς κατά 50% στις καλλιέργειες Μηλοειδών.
- Διάθεση του περιεχομένου / περίεκτη ούραμνα με την εθνική νομοθεσία.
- ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλύνετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επανοικιακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιβάδιες, επιρρύσεις και τους δρόμους.
- Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφιρτήσει από το επανοικιακό ύδατο:
• στις καλλιέργειες Μηλοειδών και Πυρηνόκαρπων μια αφέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων ή 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροσπίου μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νερούς κατά 50 % ή χρησιμοποιείται ακροσπίο μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νερούς κατά 70 %.
- στις καλλιέργειες Ελιάς μια αφέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων ή χρησιμοποιείται ακροσπίο μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νερούς κατά 50%.

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτα:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν το επαναχρησιμοποίησε.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Καλέστε οφθαλμίατρο ή ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ: Μεταφέρετε τον πάθονα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στέγη που δεκακλιμαίνει την άντηση. Συμβουλευθείτε ένα γιατρό, συνάψετε την αναμνηστική.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΤΗΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε οφθαλμίατρο γιατρό.
ΑΝΤΙΔΟΤΑ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-773777.

Στοιχείο φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους. Το σκεύασμα δεν αναμένεται να είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στη ετικέτα του. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά είναι προκειμένου για μεταυλικτικές χρήσεις: Ελιά (επιτραπέζιας και ελαιοληπτικής ποικιλίες): 7 ημέρες, Κερασιά – Βυσσινιά: 14 Ημέρες, Μηλιά, Αχλαδιά, Κιούνια: 60 Ημέρες, Ροδιανά – Νεκταρίνα: 75 Ημέρες.
Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται στην αρχική αποθήκευση συσκευασίας του, σε χώρο ήλιο, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές, το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Περιεχόμενο: 1 Λίτρο

ΑΡ. ΠΑΡΤΗΜ. ΠΑΡΑΓ.: Βλέπε επί της συσκευασίας

