



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 30.03.2026
Αριθ. πρωτ.: 79847

Ταχ . Δ/νση:	Λ. Συγγρού 150	Προς:	ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ
Ταχ. Κώδικας:	176 71 - Αθήνα		(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας της εταιρείας
Πληροφορίες:	Κ. Τσαρνά		Τουτουζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. - «AGRIBIZ»
Τηλέφωνο:	210 9287188		Μιχαλακοπούλου 157, 115 27, Αθήνα)
e-mail:	ktsarna@minagric.gr		e-mail: info@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) JUDO (δ.ο. dodine 40% β/ο)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) Του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - α) (ΕΚ) με αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 34 αυτού.
 - β) (ΕΕ) 2026/372 της Επιτροπής της 20ής Φεβρουαρίου 2026 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών**dodine**.....
 - γ) (ΕΕ) με αριθ. 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 - δ) (ΕΕ) με αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
 - ε) (ΕΚ) με αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθ. 1907/2006.

στ) Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την αριθ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση» (Β' 2339/14.05.2025).
4. Την αριθ. 61244 άδεια διάθεσης στην αγορά του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) ACUSTIC (δ.ο. dodine 40% β/ο) η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. 50697/27.02.2026 απόφασή μας.
5. Την αριθ. 59785/10.03.2026 αίτηση καθώς και τα από 26.03.2026 συμπληρωματικά στοιχεία που κατέθεσε η ενδιαφερόμενη εταιρεία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) **JUDO (δ.ο. dodine 40% β/ο)** της εταιρείας **ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

61252

30.03.2026

30.06.2029

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα:
- 1.2.β Μορφή:

JUDO

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

dodine

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

98 % (β/β) min

Χημική ομάδα:

Γουανιδίνες

Παρασκευαστής της δ.ο.:

Indofil Industries Limited

Kalpataru Square, 4th floor, Kondivita Road,
Off. Andheri Kurla Road, Andheri (E),
Mumbai 400 059, Ινδία

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

Indofil Industries Limited

Plot No. Z-12/1
SEZ Dahej, Tal.Vagra
Dist. Bharuch-392 130 (Gujarat), Ινδία

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, όπως κατατέθηκαν στην αριθ. 3671/94510/01.04.24 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας για το πανομοιότυπο προϊόν, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ
Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου, ΤΘ 1026, Τ.Κ. 570 22
Τηλ.: 2310 569630-33
E-mail: registration@farmachem.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Τουτουζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. - «AGRIBIZ»
Μιχαλακοπούλου 157, 115 27, Αθήνα
Τηλ.: 210 7471000
E-mail: info@agribiz.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ
Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου, ΤΘ 1026, Τ.Κ. 570 22
Τηλ.: 2310 569630-33
E-mail: registration@farmachem.gr

Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ
Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου, ΤΘ 1026, Τ.Κ. 570 22
Τηλ.: 2310 569630-33
E-mail: registration@farmachem.gr

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

GALENIKA FITOFARMACIJA A.D.
Batajnicksi drum bb
11080 Zemun, Belgrade, Σερβία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. **GALENIKA FITOFARMACIJA A.D.**
Batajnicksi drum bb, 11080 Zemun, Belgrade, Σερβία
2. **ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ**
Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου, ΤΘ 1026, Τ.Κ. 570 22

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστικές ουσίες: dodine: 40 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 59,7% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος, όπως αυτή κατατέθηκε με την αριθ. 3671/94510/01.04.24 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας για το πανομοιότυπο προϊόν, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	1 λίτρο	Coex-HDPE-PA
2	Δοχείο	5 λίτρα	Coex-HDPE-PA

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:

Ανακινείστε καλά πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα:

Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. Πριν το ξαναχρησιμοποιήσετε ξεπλύνετε το πάλι με άφθονο καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική και θεραπευτική δράση για την αντιμετώπιση του φουζικλάδιου των Μηλοειδών, του εξώασκου, της κυλινδροσπορίωσης και της ανθράκωσης των Πυρηνόκαρπων, καθώς και του κυκλοκόνιου και γλοιοσπόριου της Ελιάς.

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες .
		κ.εκ. σκ. / στρ.	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
ΜΗΛΟΕΙΔΗ - Μηλιά (MABSD) - Αχλαδιά (PYUCO) - Κυδωνιά (CYDOB)	Φουζικλάδιο (<i>Venturia sp.</i> - VENTSP)	170	50 - 150	Ψεκασμοί φυλλώματος που ξεκινούν από τον διαχωρισμό των πρώτων φύλλων μέχρι πριν την έναρξη της άνθισης BBCH 10 – 59	2 / 14

				Και/ή Από το τέλος της άνθισης μέχρι οι καρποί να έχουν φτάσει στο 90% του τελικού τους μεγέθους. BBCH 70 - 79	
Κερασιά ¹ PRNAV	Κυλινδροσπορίωση (<i>Blumeriella jaarii</i> – BLUMJA) Ανθράκωση (<i>Gnomonia erythrostoma</i> – GNOMER)	170	50 - 150	Ψεκασμοί φυλλώματος που ξεκινούν από το τέλος της άνθισης μέχρι οι καρποί να έχουν φτάσει το 90 % του τελικού τους μεγέθους. BBCH 70-79	2 / 14
Ροδακινιά ² (PRNPS)	Εξώασκος (<i>Taphrina deformans</i> - TAPHDE)	170	50 - 150	Ψεκασμοί φυλλώματος που ξεκινούν από την έκπτυξη των πρώτων φύλλων μέχρι πριν την έναρξη της άνθισης. BBCH 10 - 59	2 / 14
Ελιά ^{3,4} (επιτραπέζιες και ελαιοποιήσιμες ποικιλίες) (OLVEU)	Κυκλοκόνιο (<i>Venturia oleaginea</i> - CYCLOL) Γλοισπόριο (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i> – COLLGL)	225	100	Ψεκασμοί φυλλώματος που ξεκινούν από τον διαχωρισμό των πρώτων φύλλων μέχρι το τέλος της άνθησης (BBCH 11-69) ή το φθινόπωρο/χειμώνα από το στάδιο όπου οι καρποί έχουν φτάσει στο 90% του τελικού τους μεγέθους μέχρι το στάδιο της πλήρους ωρίμανσης τους (BBCH 78-89).	1
		170	100	Ψεκασμοί φυλλώματος που ξεκινούν από τον διαχωρισμό των πρώτων φύλλων μέχρι το τέλος της άνθησης (BBCH 11-69) και/ή το φθινόπωρο/χειμώνα από το στάδιο όπου οι καρποί έχουν φτάσει στο 90% του τελικού τους μεγέθους μέχρι το στάδιο της πλήρους ωρίμανσης τους (BBCH 78-89).	2 / 14

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Η χρήση στην Κερασιά περιλαμβάνει και τη Βυσσινιά (PRNCE)
2. Η χρήση στην Ροδακινιά περιλαμβάνει και τη Νεκταρίνια (PRNPN)
3. Στην καλλιέργεια της ελιάς να πραγματοποιείται είτε μια (1) μόνο εφαρμογή με μέγιστη δόση 225 κ.εκ./ στρ. ή δύο (2) εφαρμογές με δόση 170 κ.εκ./ στρ. ανά εφαρμογή.

Οι κάτωθι χρήσεις θα χορηγηθούν σύμφωνα με την παρακάτω ΟΓΠ όταν καθοριστούν στον κανονισμό 396/2005 νέα MRLs. Ο κάτοχος της έγκρισης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια αρχή.

ΜΗΛΟΕΙΔΗ - Μηλιά (MABSD) - Αχλαδιά (PYUCO) - Κυδωνιά (CYDOB)	Φουζικλάδιο (<i>Venturia sp.</i> - VENTSP)	170	50 - 150	Ψεκασμοί φυλλώματος που ξεκινούν από τον διαχωρισμό των πρώτων φύλλων μέχρι οι καρποί να έχουν φτάσει στο 90% του τελικού τους μεγέθους. BBCH 10 - 79	2 / 14
Κερασιά ¹ PRNAV	Κυλινδροσπορίωση (<i>Blumeriella jaarii</i> – BLUMJA) Ανθράκωση (<i>Gnomonia erythrostoma</i> – GNOMER)	170	50 - 150	Ψεκασμοί φυλλώματος που ξεκινούν από την αρχή της άνθισης μέχρι οι καρποί να έχουν φτάσει το 90 % του τελικού τους μεγέθους. BBCH 60-79	2 / 14
Ροδακινιά ² (PRNPS)	Εξώασκος (<i>Taphrina deformans</i> - TAPHDE)	170	50 - 150	Ψεκασμοί φυλλώματος που ξεκινούν από την έκπτυξη των πρώτων φύλλων μέχρι το τέλος της άνθισης. BBCH 10 - 69	2 / 14

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Να αποφεύγεται η εφαρμογή του σκευάσματος όταν επικρατούν πολύ υψηλές θερμοκρασίες και ξηροθερμικές συνθήκες

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία dodine, η οποία ανήκει στην ομάδα U12 κατά FRAC. Προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας το σκεύασμα συνιστάται:

- να εφαρμόζεται προληπτικά εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας.
- να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν στην ίδια ομάδα (σε προγράμματα ψεκασμών οι πρώτες 1-2 εφαρμογές να πραγματοποιούνται με το σκεύασμα).

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας

μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

--

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

--

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Ελιά:

Να μην εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φύλλα.

Πυρηνόκαρπα:

- 10 ημέρες μετά τον ψεκασμό για εργασίες συντήρησης ή/και αραιώματος και

- 5 ημέρες μετά τον ψεκασμό για εργασίες συγκομιδής.

Μηλοειδή: 1 ημέρα μετά τον ψεκασμό για εργασίες συντήρησης ή/και αραιώματος.

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Το σκεύασμα δεν αναμένεται να είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

9 Εικονογράμματα κινδύνου/
Προειδοποιητική λέξη:

GHS05



GHS07



GHS09

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

10 Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUH208: Περιέχει 1,2-Benzisothiazol-3-one(CAS 2634-33-5). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11 Δηλώσεις προφύλαξης:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.

P264: Πλένετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕΣΑ:

«Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια και προσωπίδα κατά την ανάμιξη/φόρτωση του σκευάσματος. Κατά την εφαρμογή του σκευάσματος, φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια και κουκούλα. Η χρήση γαντιών και κουκούλας δεν είναι υποχρεωτική στην περίπτωση χρήσης ψεκαστικών μέσω κλειστής καμπίνας κατά την εφαρμογή του σκευάσματος.»

ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΧΕΙΡΟΣ Η ΕΠΙΝΩΤΙΟΥΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ:

«Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια και προσωπίδα κατά την ανάμιξη/φόρτωση του σκευάσματος. Κατά την εφαρμογή του σκευάσματος φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και συνιστάται επιπλέον η χρήση γαντιών.»

Απαγορεύεται η εφαρμογή με ψεκαστικά μέσα χειρός ή επινώτιους ψεκαστήρες σε δενδρώδεις καλλιέργειες που δεν μπορεί να αποφευχθεί η επαφή με το φύλλωμα κατά τη διάρκεια του ψεκασμού.»

ΕΠΑΝΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΨΕΚΑΣΜΟ:

Στις καλλιέργειες πυρηνοκάρπων η είσοδος επιτρέπεται **10 ημέρες** μετά τον ψεκασμό για εργασίες συντήρησης ή/και αραιώματος και **5 ημέρες** μετά τον ψεκασμό για εργασίες συγκομιδής.

Στις καλλιέργειες μηλοειδών η είσοδος επιτρέπεται **1 ημέρα** μετά τον ψεκασμό για εργασίες συντήρησης ή/και αραιώματος.

Σε κάθε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε μακρύ παντελόνι, μακρυμάνικο πουκάμισο και γάντια.

Για την προστασία των κατοίκων ή παρευρισκομένων:

- να αφήσετε μία απέκαστη ζώνη προστασίας **10 μέτρων** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς ψεκαστικού νέφους κατά **50%** στις καλλιέργειες Πυρηνοκάρπων
- να χρησιμοποιήσετε ακροφύσια μείωσης της διασποράς ψεκαστικού νέφους κατά **50%** στις καλλιέργειες Μηλοειδών.

P501: Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε από τα επιφανειακά ύδατα:

- στις καλλιέργειες Μηλοειδών και Πυρηνοκάρπων μια απέκαστη ζώνη προστασίας **20 μέτρων** ή **10 μέτρων** με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **50 %** ή χρησιμοποιείστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **70 %**.
- στις καλλιέργειες Ελιάς μια απέκαστη ζώνη προστασίας **10 μέτρων** ή χρησιμοποιήστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **50%**.

12 Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

P302+P352+P362+P364: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

P305+P351+P338+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Συμβουλευτείτε ένα γιατρό, αναλόγως των συμπτωμάτων.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργεια [Κωδικός προϊόντος με βάση το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 396/2005]	Ημέρες
Ελιά (επιτραπέζιες και ελαιοποιήσιμες ποικιλίες) (0161030, 0402010)	7
Κερασιά - Βυσσινιά (0140020)	14
Μηλιά (0130010), Αχλαδιά (0130020), Κυδωνιά (0130030)	60
Ροδακινιά - Νεκταρινιά (0140030)	75

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Να αποθηκεύεται στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές, το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευόμενων μελετών

Στην έκθεση αξιολόγησης που στηρίχτηκε η απόφαση του πανομοιότυπου προϊόντος, καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες βασίστηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης του πανομοιότυπου προϊόντος οφείλει να προσκομίσει στη ΣΕΑ τα ακόλουθα: -

B Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο

οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.

7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ