

Τρόπος εφαρμογής: Μεταφυτρωτικός ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού/διαλύματος εφαρμογής: Ανακατεύετε καλά την ψιλή πριν την χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος, αναδύοντας. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό με συνεχή ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Μετά τον ψεκασμό και για να μην προκληθούν ζημιές στις καλλιέργειες στις οποίες θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια το ψεκαστικό μέσο, αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βύθιο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομυρμακωθεί όλα τα ζην του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βύθιο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (κιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύσιμο (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενες με τριπλή, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. **Συνδυαστικότητα:** Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζξάνιοκτόνο, με διασυστηματική δράση, για την καταπολέμηση αγρωστωδών ζξάνιων. Σε βιοχημικό επίπεδο παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων (παρεμποδιστής του ενζύμου καρβοξυλάση του ακετυλο-συνενζύμου Α).

Πεδίο εφαρμογής/Στόχος/Δόσεις σκευάσματος/Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής:

Βαμβάκι για Πολυετή αγρωστώδη ζξάνια με 100-150 κ.εκ./στρ. **Βαμβάκι για Ετήσια αγρωστώδη ζξάνια** με 75-75 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. Υγρού: 20-40 λίτρα/στρ. **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Ψεκασμός από τα 2 έως τα 9 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας (BBCH 12-19).

Πατάτα για Πολυετή αγρωστώδη ζξάνια με 100-150 κ.εκ./στρ. **Πατάτα για Ετήσια αγρωστώδη ζξάνια** με 75 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. Υγρού: 20-40 λίτρα/στρ. **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Ψεκασμός από τα 2 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας, μέχρι να κλείσει το 30% της γραμμής (BBCH 12-33).

Ζαχαρότευτλα για Πολυετή αγρωστώδη ζξάνια με 100-150 κ.εκ./στρ. **Ζαχαρότευτλα για Ετήσια αγρωστώδη ζξάνια** με 75 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. Υγρού: 20-40 λίτρα/στρ. **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Ψεκασμός από τα 2 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας, μέχρι η ρίζα να φτάσει στο 50% της τελικής της διαμέτρου (BBCH 12-33).

Τομάτα (Υ) για Πολυετή αγρωστώδη ζξάνια με 100-150 κ.εκ./στρ. **Τομάτα (Υ) για Ετήσια αγρωστώδη ζξάνια** με 75 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. Υγρού: 20-40 λίτρα/στρ. **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Ψεκασμός από το στάδιο του σχηματισμού του 2^{ου} φύλλου στον κεντρικό βλαστό έως την εμφάνιση εννέα (9) περισσότερων πλευρικών βλαστών (BBCH 12-29).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο για όλες τις καλλιέργειες: 1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Μην εφαρμόζετε σε πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος ή υγρασία.
2. Η βέλτιστη στιγμή εφαρμογής στα ζξάνια αγρωστωδών είναι από το στάδιο των 3 φύλλων μέχρι τη βλάστηση νέου φυτού στη **ετήσια** και με μήκους μήκους 15-20 εκατοστών στη **πολυετή**. Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους τύπους εδαφών.

Ετήσια αγρωστώδη ζξάνια:

1. Αγριοβράβα (Avena sp.)
2. Αλεπουρά (Alopecurus myosuroides)
3. Μουρίτσια (Echinochloa sp.)
4. Σέτια (Setaria sp.)

Πολυετή αγρωστώδη ζξάνια:

1. Αγριοδί (Cynodon dactylon)
2. Βελούρας (Sorghum halepense)
3. Έλμος (Amaranthus repens)

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκεντρωθεί:

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία clethodim, η οποία ανήκει στην ομάδα 1 κατά HRAC.

Διαχείριση ανθεκτικότητας

Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζξάνων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικό μέτρο κλπ.) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζξάνιοκτονων άλλης ομάδας με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

• Αφιερώστε χρονικό διάστημα 7 ημερών μεταξύ της χρήσης του στο σκεύασμα και άλλων ζξάνιοκτονων.

• Μην ψεκάζετε σε περίπτωση που αναμένεται βροχόπτωση.

• Εφαρμόζεται όταν τα ζξάνια βρίσκονται σε ύψη ανάπτυξη. Μην το εφαρμόζεται όταν τα ζξάνια βρίσκονται σε συνθήκες στρες από ξηρασία ή χαμηλές θερμοκρασίες.

class

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: clethodim 24% β/ο - Βοηθητικές ουσίες: 73,88% β/β

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 70641/ 21.08.2026

Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζξάνιοκτόνο, με διασυστηματική δράση, για την καταπολέμηση αγρωστωδών ζξάνιων. Σε βιοχημικό επίπεδο παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων (παρεμποδιστής του ενζύμου καρβοξυλάση του ακετυλο-συνενζύμου Α).



UFI: SUYP-P1K5-XR03-HSD9

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
- Μπορεί να προκαλέσει υπηλμία ή ζάλη.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
- με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Παρεπόμενη έκθεση μπορεί να προκαλέσει εθρήνητα δέρματος ή σκόνη.
- Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Κάτοχος της άδειας:
Sharda Cropchem España S.L.
Edificio Alayales Business Center,
Camí Condomini nº 3, 12th
Floor, 30006 Murcia, Ισπανία
E-mail: regn@shardacnt.com

Παρασκευαστής σκευάσματος:
SHARDA CROPCHEM LIMITED

FARMA-CHEM SA

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
FARMA-CHEM SA

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Γ' Ζώνη Τ.Θ. 1026, 57022, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 569630
Email: info@farmachem.gr

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΤΗΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί ερυθρότητα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΛΑΒΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

Βγάλτε τα μολυμμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα προσεκτικά με άφθονο νερό για 15 λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους. Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόμα. Μην χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα. Μην προκαλέσετε εμετό.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210-7793777.

Δηλώσεις προφύλαξης:

Φυλάσσετε κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

Αποφύγετε να αναπνεύσετε αναθυμιάσεις/ σταγονίδια/ ενεργήματα.

Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ενδύματα, μέσα στήθους προστασίας για μάσητρούπωμα.

«Φοράτε ολόκληρο φόρμα εργασίας, γάντια και μπότες κατά την ανάμειξη, την φόρτωση και κατά την εφαρμογή.»

«Σε περίπτωση επανεξόδου στην καλλιέργεια φοράτε μακροχρόνιο ποικαμσο και μακριά παντελόνι, γάντια και μπότες. Συμπληρώστε τη χρήση γαντιών.»

Διάθεση του περιεχομένου/περιεχόμενου σε: την εθνική νομοθεσία.

• ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ. (Να μην πλύνετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λυθότροπες επενδύσεις και τους δρόμους). • Για να προστατεύσετε τους υδρόβιους οργανισμούς, αφήστε μια αέσκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα στις καλλιέργειες: Βαμβάκι, πατάτα, ζαχαρότευτλα και τομάτα. • Για να προστατέψετε τα **φύτα** μη στέχους να αφήσετε μια αέσκαστη ζώνη προστασίας από μη καλλιεργούμενη γη: 10 μέτρων από βαμβάκι, πατάτα, ζαχαρότευτλα και τομάτα.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- **απορής ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:** -

- **απορής ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:** Συσταται να περάσουν 4 εβδομάδες πριν από τη σπορά οποιαδήποτε καλλιέργειας αγρωστωδών μετά από μια καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το προϊόν.

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας οποιαδήποτε πλατυφυλλή καλλιέργεια μπορεί να φυτευτεί αμέσως.

- Για την καλλιέργεια σπινών, είναι αναγκαία μία περίοδος αναμονής 3 μηνών πριν τη σπορά.

- **της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:**

Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό στη φυλλώδη επιφάνεια. **Στοχάζει φυτοφάγους, ευαισθησία ποικιών και κάθε άλλης παρενέργειας στο φυτό ή τα προϊόντα τους:**

Δεν είναι φυτοφάγοι στις αναμειγμένες καλλιέργειες και δίκες, εφόσον ηρούονται οι οδηγίες χρήσεως που αναγράφονται στην ετικέτα.

Τελειώστε επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις: Βαμβάκι: 100 Ημέρες, Πατάτα, Ζαχαρότευτλα: 56 Ημέρες, Τομάτα: 30 Ημέρες.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Φυλάσσετε το προϊόν στην αρχική του συσκευασία σε ξηρό, δροσερό και καλά αεζόμενο χώρο.

Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δεκαοκτώ μήνες (18) μήνες από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΑΡ. ΠΑΡΤΗΜ. ΠΑΡΑΓ/ΗΜ ΛΗΣ: Βλέπε επί της συσκευασίας

H FARMA-CHEM SA
εφαρμόζει πιστοποιημένο
σύστημα διαχείρισης ποιότητας.



Περιεχόμενο: 1 Λίτρο

202009