Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός μεταφυτρωτικός ψεκασμός με τα συνήθη ψεκαστικά εδάφους, με 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα, πίεση μικρότερη των 2,5 atm και μπεκ τύπου σκούπας.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα. Αν δε γίνει αυτό ενδέχεται να προκληθούν ζημιές στις καλλιέργειες στις οποίες θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια το ψεκαστικό μέσο. Συνιστάται η χρήση αμμωνιακού διαλύματος 3% (1 λίτρο ανά εκατόλιτρο) μέχρις ότου απομακρυνθούν όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Τα στάδια καθαρισμού τα οποία πρέπει να ακολουθηθούν είναι τα εξής:

- Αδειάστε τελείως το βυτίο. Ξαναγεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό και κάντε το να περάσει μέσα από όλα τα μέρη του ψεκαστικού (αντλία, ψεκαστικό αυλό) και αδειάστε το ξανά.
- Ξαναγεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό στο οποίο προσθέστε μισό λίτρο αμμωνίας οικιακής χρήσης 3% ανά 100λιτρο. Κυκλοφορήστε το διάλυμα αυτό μέσω όλου του συστήματος 'ψεκάζοντας' υπό συνεχή ανάδευση, μέχρι να αδειάσει. Επαναλάβετε την ανωτέρω διαδικασία (προσθέτοντας πάλι αμμωνία) άλλη μία φορά και ακόμη μία φορά χωρίς αμμωνία.
- Χρησιμοποιήστε το ίδιο διάλυμα για το ξέπλυμα δύο φορές των φίλτρων και των μπεκ τα οποία στο τέλος ξεπλύνετέ τα με καθαρό νερό.

Συνδυαστικότητα: --

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Διασυστηματικό και μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο, για την καταπολέμηση ορισμένων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργειες αραβοσίτου.
Το nicosulfuron δρα παρεμποδίζοντας το ένζυμο ALS, συνθετάση του οξεγαλακτικού.

Πεδίο Εφαρμογής/ Στόχος/ Δόσεις σκευάσματος/ Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:

Αραβόσιτος για **Αγρωστώδη ζιζάνια** με 100 Κ.εκ/ Στρέμμα. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: 1-3 φύλλα. Για **Μουχρίτσα** *(Echinochloa crus -galli)* με 100-150 Κ.εκ/ Στρέμμα. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: 1-2 αδέλφια. Για **Σετάριες** *(Setaria spp)* με 100 Κ.εκ/ Στρέμμα. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: 2-4 φύλλα. Για **Βέλιουρα** *(Sorghum halepense)*

α. Από σπόρο με 100 Κ.εκ/ Στρέμμα. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Μέχρι 8 φύλλα.

β. Από ρίζωμα με 125-150 Κ.εκ/ Στρέμμα. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: 10-20 εκ. ύψος.

Για **Πλατύφυλλα ζιζάνια, Βλήτα** *(Amaranthus spp.)* με 100 Κ.εκ/ Στρέμμα. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: 2-4 φύλλα. Για **Τάτουλα** *(Datura strarmonium)* με 100-150 Κ.εκ/ Στρέμμα. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: 2-4 φύλλα.

Όγκος ψεκ. Υγρού: 20-40 λίτρα /στρέμμα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1.

Παρατηρήσεις:

1) Οι εφαρμογές γίνονται στα 2-8 φύλλα της καλλιέργειας του αραβόσιτου.

2) Όταν έχουμε σταδιακή εμφάνιση των ζιζανίων στο χρόνο, συνιστώνται 2 εφαρμογές σε μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες, ως εξής : 1η εφαρμογή με δόση 100 κ.εκ/στρέμμα και 2η εφαρμογή με δόση 50 κ.εκ/στρέμμα.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτούγειας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Να μην πραγματοποιείται ψεκασμός εάν αναμένεται βροχή στις επόμενες 6 ώρες.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία χρησιμοποιήθηκε το NICOSH 4 OD, στον ίδιο αγρό την ίδια περίοδο, μπορεί να ξαναστραφεί μόνο αραβόσιτος.

-σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Για σπορά χειμερινού σιταριού πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 4 μήνες και οποιασδήποτε άλλης καλλιέργειας την επόμενη άνοιξη (1 έτος μετά) από την εφαρμογή του NICOSH 4 OD και αφού προηγηθεί βαθιά άροση.

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην **οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:** Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

Nicosh 4 OD

OD-Ελαιώδες εναιώρημα

Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:
Nicosulfuron: 4 % β/ο - Βοηθητικές ουσίες: 95,52% β/β

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 70060/ 04.12.2013

Διασυστηματικό και μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο, για την καταπολέμηση ορισμένων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργειες αραβοσίτου.
Το nicosulfuron δρα παρεμποδίζοντας το ένζυμο ALS, συνθετάση του οξεγαλακτικού.



UFI: S6NH-70WS-R20Q-H5E6

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Κάτοχος της άδειας:
Sharda Cropchem España S.L.
Edificio Atalayas Business Center
Camil Condomina no 3, 12th Floor, 30006 Murcia - Ισπανία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
SHARDA BALKAN ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Μοναστηρίου 9,Τ.Κ. 54627, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 521045
E-mail: athinasarakini@gmail.com

Παρασκευαστής σκευάσματος:
SHARDA CROPCHEM LIMITED

FARMA-CHEM SA

Η FARMA-CHEM SA εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας.

Διανομές:
FARMA-CHEM SA
ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ - Γ' ΖΩΝΗ -
Τ.Θ.1026 - 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 569.630 έως 3 - FAX: 2310 797.047
info@farmachem.gr - www.farmachem.gr

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:
Εάν ζητήστε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με άφθονο νερό και σαπούνι.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετέ τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά και συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.
- Σε περίπτωση κατάποσης, τοποθετείστε τον ασθενή σε καλά αεριζόμενο χώρο και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.
- Σε περίπτωση εισπνοής μεταφέρετε τον ασθενή σε χώρο με καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Αντίδοτο Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ.Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-779377

Δηλώσεις προφύλαξης:
- Μακριά από παιδιά.
- Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.
- Αποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων/εκνεφώματα
- Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.
- Φυλάσσεται κλειδωμένο
- Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη. Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.
- Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
- Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε αμέσως ζώνη προστασίας 10 μέτρων, από τα επιφανειακά ύδατα.
- Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε αμέσως ζώνη προστασίας 5 μέτρων, από τη μη γεωργική γη.
- Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσης.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Το προϊόν να μη χρησιμοποιείται όταν ο αραβόσιτος βρίσκεται υπό stress υγρασίας σε θερμοκρασίες πάνω από 25°C και κάτω από 10°C. Κατά την 1η-2η εβδομάδα μετά την εφαρμογή είναι δυνατόν να παρατηρηθούν χλωρώσεις στα φύλλα του καλαμποκιού. Το φαινόμενο αυτό είναι συνάρτηση της χρησιμοποιούμενης δόσης, είναι δε παροδικό.
Δεν επηρεάζει την ανάπτυξη της καλλιέργειας ή τις αποδόσεις.
Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε γλυκό καλαμπόκι καθώς και σε καλαμπόκι που προορίζεται για σπορά.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν **πρόκειται για μεταουλλεκτικές χρήσεις:** Αραβόσιτος: -

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε δηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

Περιεχόμενο: 1 Λίτρο

ΑΡ. ΠΑΡΤ/ΗΜ. ΠΑΡΑΓ./ΗΜ ΛΗΞ.: Βλέπε επί της συσκευασίας

202611